


高雄市立凱旋醫院 重新開檔 藥品資料

中文名	金普薩凍晶注射劑 10 公絲	 黃色凍晶粉末，配製後為黃色溶液
商品名	Zyprexa inj. (10mg/2mL)	
學名	Olanzapine	
藥品代碼	IZY	
適應症	成人思覺失調症及成人雙極性 第 I 型躁症之激動症狀。	
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Zyprexa_inj.htm	
仿單	https://www.ksph.gov.tw/dfiles_pdf/Zyprexa_inj.pdf	
備註	1. 此藥品廠商無意願簽訂採購合約或參與藥品聯標，只能採用零星採購，依採購法規定每年採購金額上限為 10 萬元，因此每年最多採購 303 瓶，若採購額度及庫存用盡將暫時關檔。 2. 此藥品因原廠原物料供應不及現已缺貨，目前僅出貨 15 瓶給本院使用，若庫存用盡將暫時關檔。 3. Zyprexa inj.僅能使用注射用水配製，配製後為 10mg/2mL，配製後 1 小時內使用。 4. 仿單警語：不建議同時給予肌肉注射 olanzapine 和注射 benzodiazepine。如考慮給予病人注射 benzodiazepine，應於肌肉注射 olanzapine 至少 1 小時後給藥。若病人已注射 benzodiazepine，則應小心評估臨床狀況後，才能給予肌肉注射 olanzapine，且應嚴密監測病人是否有過度鎮靜和心臟呼吸功能低下。	

	5. 仿單警語：接受肌肉注射 olanzapine 的病人，應嚴密觀察低血壓狀況，包括姿勢性低血壓、徐緩性心律不整和/或換氣不足，尤其在注射後 4 小時，因臨床之需要得延長嚴密觀察時間。亦應記錄血壓、脈搏、呼吸速率和意識程度，若有明顯變化，應依需要給予適當治療。病人注射後，若發生眩暈或昏昏欲睡，應持續躺臥休息，直到檢查顯示沒有低血壓的狀況，包括姿勢性低血壓、徐緩性心律不整和/或換氣不足。
--	--