


高雄市立凱旋醫院 **替代** 藥品資料

	現有品項 (用盡後關檔)	不同成分 替代品項
中文名	愛脂婷錠 10/20 毫克	同抑脂膠囊 2/10 毫克
商品名	Agitin (10/20mg)	Tonvasca (2mg/10mg)
藥品代碼	OAGI	OTONV
學名	Ezetimibe 10mg Simvastatin 20mg	Ezetimibe 10mg Pitavastatin 2mg
適應症	1. 原發性高膽固醇血症。 2. 同型接合子家族性高膽固醇血症。 3. Ezetimibe 10mg併用 Simvastatin 40mg，適用於近十日之內因急性冠心症候群(acute coronary syndrome)而住院的患者，可減少主要心血管事件(major cardiovascular events)之發生。	原發性高膽固醇血症及混合型血脂異常。
仿單一 腎功能不全病人	中度腎功能不全病人無須調整劑量。 嚴重腎功能不全病人(肌酸酐廓清率 ≤ 30 mL/min)每日劑量超過 10/10 毫克時，應小心使用。	Tonvasca 在腎功能不全者的使用經驗尚未建立。 不建議中、重度腎功能不全病人及正接受血液透析的末期腎臟病使用本品。
仿單一 肝功能不全病人	輕度肝功能不全病人無需調整劑量(Child-Pugh 評分 5 或 6)。中度(Child-Pugh 評分 7-9)或重度(Child-Pugh 評分 >9)肝功能障礙病人，不建議使用。	不建議肝功能不全之病人使用 Tonvasca。

藥品外觀	 <p>白色長橢圓形錠劑，標記：SYN/079</p>	 <p>白色膠囊，標記：OP/75</p>
異動日期	<p>Agitin (10/20mg)已於3月20日暫時關檔，並保留部分餘藥供慢箋回院領藥使用。</p>	
異動原因	<p>依115年第一次藥事委員會決議，Agitin (10/20mg)用盡後由Tonvasca (2mg/10mg)替代。</p>	