

公費 Covid-19 抗病毒藥 Molnupiravir 因中央已停止供應，
已於 7 月 21 日關檔，替代藥品：Paxlovid、Xocova

中文名	公費 COVID-19 治療用口服抗病毒藥物 倍拉維 150 毫克/100 毫克膜衣錠
商品名	Paxlovid 150mg/100mg
學名	Nirmatrelvir 150mg、Ritonavir 100mg
藥品代碼	OPAX、OPAXR（各對應粉紅色、白色錠劑）
適應症	發病 5 天內，具重症風險因子 12 歲以上輕症新冠確診病人。
藥品外觀	 Nirmatrelvir：粉紅色橢圓形錠劑，標記：PFE/3CL Ritonavir：白色至灰白色膠囊狀錠劑，標記：H/R9
用量用法	OPAX 2# BID 5 天 OPAXR 1# BID 5 天 應於診斷及症狀發作後 5 天內儘快開始療程，青少年病人體重須達 40 公斤以上，方可使用。 飯後服用或空腹服用皆可。

	每日 2 次，每次服用 2 顆粉紅色錠劑(Nirmatrelvir 150mg)、1 顆白色錠劑(Ritonavir 100mg)，持續 5 天。 中度腎功能不全 ($30\text{mL/min} \leq \text{eGFR} < 60 \text{ mL/min}$): 每日 2 次，每次服用 1 顆粉紅色錠劑、1 顆白色錠劑，持續 5 天。 重度腎功能不全($\text{eGFR} < 30\text{mL/min}$ 或需要血液透析者): 每日 1 次，於每天大約同一時間服用。 若當天需血液透析，應在血液透析後服用。 第一日：服用 2 顆粉紅色錠劑、1 顆白色錠劑。 第二至五日：服用 1 顆粉紅色錠劑、1 顆白色錠劑。
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Paxlovid.htm
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Paxlovid.pdf
相關連結	1. 公費COVID-19 治療用口服抗病毒藥物領用方案 2. 藥物交互作用查詢
備註	1. 藥劑科 TOTO 槽有新版 COVID-19 口服抗病毒藥物使用評估表可供下載(115/7/22 更新)。 2. 請檢附處方箋、COVID-19 口服抗病毒藥物使用評估表，一併送交藥局領用。

中文名	公費 COVID-19 治療用口服抗病毒藥物 Xocova	
商品名	Xocova	
學名	Ensitrelvir 125mg	
藥品代碼	0XOC	
適應症	發病 3 天內、具重症風險因子 12 歲以上輕症新冠確診病人，且不適用其他 COVID-19 治療者。	
用量用法	第 1 天：每日服用 1 次，每次 3 錠， 第 2 至 5 天：每日服用 1 次，每次 1 錠	
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Xocova.htm	
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Xocova.pdf	
相關連結	1. 公費COVID-19 治療用口服抗病毒藥物領用方案 2. 藥物交互作用查詢	
備註	1. 藥劑科 TOTO 槽有新版 COVID-19 口服抗病毒藥物使用評估表可供下載(115/7/22 更新)。 2. 請於病歷註記無法使用 Paxlovid 之理由。 3. 請檢附處方箋、COVID-19 口服抗病毒藥物使用評估表，一併送交藥局領用。 4. 請將病人同意書留存於病歷。	