

高雄市立凱旋醫院新開檔藥品資料

中文名	公費 COVID-19 抗病毒藥物 - 韋如意	
商品名	Veklury	
學名	Remdesivir 100mg	
藥品代碼	IVEK 搭配注射用水及生理食鹽水： IAQ：Aqua Dest (H2O/20ml) IN0250：Norm-Saline 250ml (大塚-袋)	
適應症	適用於治療下列病人的新型冠狀病毒疾病(COVID-19，嚴重特殊傳染性肺炎)： 1. 發生肺炎並須給予氧氣治療(開始本品治療時須使用低或高流量氧氣或其他非侵入性呼吸器)的成人與 28 天大以上且體重至少 3 公斤之兒童。 2. 發病 7 天 內，不須氧氣治療但惡化成重度 COVID-19 風險較高的成人與 28 天大以上且體重至少 3 公斤之兒童。	
用量用法	IV 輸注，以本院常用輕症療程為例，療程為三天： 第 1 天 ： STAT Veklury 2 小瓶 Aqua Dest (H2O/20ml) 2 支 Norm-Saline 250ml (大塚-袋) 1 包	

	<p>第 2、3 天：QD</p> <p>Veklury 1 小瓶</p> <p>Aquar Dest (H2O/20ml) 1 支</p> <p>Norm-Saline 250ml (大塚-袋) 1 包</p> <p>輸注時間為 30 分鐘至 120 分鐘</p>
藥品網頁	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles/Veklury.htm
仿單	https://ksph.kcg.gov.tw/7/dfiles_pdf/Veklury.pdf
相關連結	公費COVID-19 抗病毒藥劑VEKLURY®領用方案
備註	<ol style="list-style-type: none"> 1. 藥劑科 TOTO 槽有輕症療程處方參考範例、調製及稀釋流程示意圖、COVID-19 病毒藥劑 VEKLURY®使用評估表可供下載。 2. 請於首日處方時，檢附處方箋、COVID-19 病毒藥劑 VEKLURY®使用評估表，一併送交藥局領用。 3. 在臨床適合的情況下，應於開始療程前及治療期間進行肝臟實驗室檢驗以及監測凝血酶原時間。 ALT$\geq$5 倍正常範圍上限的病人，建議不要開始使用。 ALT$>$10 倍正常範圍上限的病人，應考慮停止使用。 ALT 升高且伴有肝臟發炎的徵兆或症狀，應停止使用。 4. 在臨床適合的情況下，在輸注過程中應監視病人的反應，並應於輸注完成後觀察病人至少一小時，確認是否出現過敏徵

	<p>兆和症狀，如果出現具臨床意義之過敏反應的徵兆和症狀，應立即停止投藥。</p> <p>5. 目前疾管署提供的批號為 AT9349CD1，藥品包裝上標示效期為 2026/03，經衛福部核准展延至 2027/03，展延對照表放置於藥劑科 TOTO 槽可供確認。</p>
開檔時間	115 年 9 月 15 日