

高雄市立凱旋醫院

Kaohsiung Municipal

Kai-Syuan Psychiatric Hospital



105 藥品處方集
(Formulary)

高雄市立凱旋醫院 藥劑科

中華民國一零五年二月

目錄

再版序.....	1
本文.....	3
中樞神經系興奮劑(Central Nervous System Stimulant)	4
失智症用藥 (Antidementia)	7
肌肉鬆弛劑(Muscle Relaxants)	9
利尿劑(Diuretics).....	11
局部麻醉劑(Local Anesthetics)	12
尿道抗痙攣藥物.....	14
戒菸輔助劑(Smoking cessation Aid)	14
抗生素類(Antibiotic)	16
抗帕金森氏症製劑(Antiparkinsonism Drugs).....	17
抗狹心症藥物(Antianginal Drugs)	18
抗組織胺藥物(Antihistamines)	18
抗焦慮、鎮靜及安眠劑(Antianxiety.Hypnotic)	19
抗痛風用藥(Antigout Agent).....	26
抗感染劑(Anti-Infectives).....	27
抗精神病劑(Antipsychotic Drugs)	28
第一代抗精神病劑.....	28
第二代抗精神病劑.....	32
抗憂鬱劑(Antidepressants)	46
MAOI	46
NaSSA	46
NDRI	47
SNRIs	47
SSRIs	50
TCA	54
其他.....	55
抗膽鹼激素藥物(Anticholinergic drugs)	57
抗躁症劑(Antimanic).....	58
抗驚厥劑(Anticonvulsants)	59
其他(Miscellaneous).....	64
其他止痛劑及解熱劑(Analgesic).....	65
呼吸道用藥(Respiratory Tract Drugs)	66
非類固醇類抗發炎劑(NSAIDs)	68
胃腸用藥(G.I Agents).....	69
降血糖藥物(Antidiabetic Agents).....	73
降血壓藥(Antihypertensive Agents).....	75

高脂血症用藥(Antilipemic Agent)	77
暈動症用藥(Motion Sickness Agents).....	78
腦下垂體激素(Hypophysis hormone).....	78
腦代謝改善劑(Brain Metabolism Strengthening).....	79
補充液(Fluid Supplement).....	80
解毒劑(Antidotes)	83
電解質(Electrolytes)	85
維生素(Vitamins)	86
擬交感神經興奮藥物(Alpha-/Beta-Agonist)	88
類固醇(Steroids).....	89
附錄.....	91
附錄一：藥物品項（中文名）、代碼一覽表.....	92
附錄二：懷孕期藥物安全分類.....	96
附錄三：不可磨粉或剝半的藥品.....	98
附錄四：健保給付.....	100
第 1 節 神經系統藥物 Drugs acting on the nervous system	100
第 10 節 抗微生物劑 Antimicrobial agents	106
附錄五：本院使用服藥頻次.....	110
附錄六：藥物不良反應通報作業流程.....	112
附錄七：藥物交互作用.....	113
附錄八：檢驗數據參考值.....	118
附錄九：藥物不良反應評估表（Naranjo scale）	119
附錄十：可能影響 G-6-P-D 患者溶血之藥物.....	120
藥品索引.....	121

再版序

隨著國內藥物的日新月異，藥劑科編排 105 年處方集，編列本院之處方用藥，加註最新健保價、藥物外觀及中文名，對內發行，期對各醫護人員有所助益。

本書提供之用法用量、副作用多為一般常見的用法，若有特殊之事項仍以藥品專業書籍為主。

編排疏漏及不足，在所難免，您的指教將使處方集更為完善。

凱旋醫院藥劑科 陳彥宏主任
許筱晴、李欣雅藥師
以及全體藥師敬上

2015.02

使用說明

①	英文名： Concerta 27 管 3	學名： Methylphenidate	劑量： 27mg/TAB	中文名：專思 達	健保價：54
②	圓柱形灰色標記：alza27		C	嬌生	代碼： OCON27

③ → 適應症：

④ → 用法用量：

⑤ → 副作用：

⑥ → 禁忌：

⑦ → 注意事項：

① 商品名、成份、劑量、中文名、健保價

② 藥物外觀、孕婦用藥等級藥廠名稱、藥廠、藥物代碼

③ 此藥物的適應症

④ 藥物的一般用法用量

⑤ 藥物常見副作用

⑥ 此藥物的禁忌

⑦ 此藥應注意的事項

△對同成份二項以上併列，加註（原廠），後頁索引中，同時收列藥物商品名及成份名（**商品名加黑**）以便查詢。

△特殊標記：**管**-管制藥品分級；**急**-急救車

本文

中樞神經系興奮劑(Central Nervous System Stimulant)

英文名：Strattera	學名：Atomoxetine	劑量：40mg/CAP	中文名：思銳	健保價：84
藍膠囊標記：Lilly3229 40mg		C	禮來	代碼：OSTR4

適應症：注意力缺損/過動症 (ADHD)。

用法用量：

(1) 體重 70kg 以下的孩童或青少年：開始每日劑量為 0.5mg/kg，至少三日後，每日總劑量增加至 1.2mg/kg，最高劑量 1.4mg/kg 或 100mg。

(2) 體重超過 70kg 或成人：開始每日劑量為 40mg，至少三天後，每日總劑量增加至 80mg，最多可增加至 100mg。

副作用：消化不良、噁心、嘔吐、疲倦、食欲降低、暈眩及情緒不穩。

禁忌：

- (1) 對 atomoxetine 或本產品其他成份過敏的患者。
- (2) 不建議用於患有狹角性青光眼的病患。
- (3) 不應與 MAOI 合併使用，或在停用 MAOI 兩週內使用。

注意事項：

(1) 曾報導與 atomoxetine 相關的症狀有：焦慮、激躁、恐慌發作、失眠、易怒、敵意、侵略性、衝動、靜坐困難、輕躁症及躁症。

(2) 患有高血壓、心跳過快、心血管或腦血管疾病的病患須小心服用。

英文名：Concerta 27 管 3	學名： Methylphenidate	劑量：27mg/TAB	中文名：專思達	健保價：54
圓柱形灰色標記：alza27		C	嬌生	代碼：OCON27

適應症：過動兒症候群、發作性嗜睡症。

用法用量：

(1) 成人：一天 20~30mg，分 2~3 次服用，飯前 30~45 分鐘吃，如果病人無法入睡則改為白天吃（下午六點前）。極量為 60mg。

(2) 大於六歲小孩：開始劑量為 5mg，每天 1~2 次，每星期再增加 5~10mg。

副作用：神經質、失眠、小孩可能出現食慾下降、體重減輕、心跳過快。

禁忌：顯著的焦慮、緊張力、震顫、對此藥有高敏感、青光眼病人、有運動抽搐者或有家庭史。

注意事項：

- (1) 病人如有震顫的不良反應，需要時可停藥。
- (2) 不用於嚴重的憂鬱，授乳婦女及小於六歲小孩不適用。

英文名：Concerta 36 管 3	學名： Methylphenidate	劑量：36mg/TAB	中文名：專思達	健保價：63
圓柱形白色標記：alza36		C	嬌生	代碼：OCON36

適應症：過動兒症候群。

用法用量：

(1) 18~65 成人：起始劑量 18 或 36mg/day。

(2) 6~17 歲：起始劑量 18mg/day，13~17 歲青少年勿超過 2mg/kg/day。

(3) 每日最大劑量 54mg。早上空腹或早餐飯後服用，不可咀嚼、剝半或壓碎。

副作用：神經質、失眠、小孩可能出現食慾下降、體重減輕、心跳過快、頭痛。

禁忌：顯著的焦慮、緊張力、震顫、對此藥有高敏感、青光眼病人、有運動抽搐者或有家庭史。
使用 MAOI 者。

注意事項：

(1) 病人如有震顫的不良反應，需要時可停藥。

(2) 不用於嚴重的憂鬱，授乳婦女及小於六歲小孩不適用。

英文名：Ritalin LA 管 3	學名： Methylphenidate	劑量：20mg/CAP	中文名：利長能	健保價：35
白色膠囊標記：NVR R20		C	諾華	代碼：ORLA

適應症：6 歲至 12 歲孩童過動兒症候群。

用法用量：每天一次，起始劑量為 10mg，可以照耐受性及治療效果，每週增加 10mg，直至每日最大劑量 40mg。

副作用：神經質、失眠、小孩可能出現食慾下降、體重減輕、心跳過快。

禁忌：(1) 顯著的焦慮、緊張力、震顫、對此藥有高敏感、青光眼病人、有運動抽搐者或有家庭史。

注意事項：Ritalin LA 膠囊及膠囊內藥粒不可磨碎、咀嚼或切割藥粒。膠囊可整粒吞服，或將膠囊內藥粒灑在少量的食物上。(如蘋果泥，但不可加熱，避免破壞緩釋)

英文名：Ritalin 管 3	學名： Methylphenidate	劑量：10mg/TAB	中文名：利他能	健保價：2.67
橢圓形白色標記：CG		C	聯亞	代碼：ORIT

適應症：過動兒症候群、發作性嗜睡症。

用法用量：

(1) 成人：一天 20~30mg，分 2~3 次服用，飯前 30~45 分鐘吃，如果病人無法入睡則改為白天吃（下午六點前）。極量為 60mg。

(2) 大於六歲小孩：開始劑量為 5mg，每天 1~2 次，每星期再增加 5~10mg。

副作用：神經質、失眠、小孩可能出現食慾下降、體重減輕、心跳過快。

禁忌：顯著的焦慮、緊張力、震顫、對此藥有高敏感、青光眼病人、有運動抽搐者或有家庭史。

注意事項：

(1) 病人如有震顫的不良反應，需要時可停藥。

(2) 不用於嚴重的憂鬱，授乳婦女及小於六歲小孩不適用。

英文名： Levophed inj 急	學名： Norepinephrine	劑量： 4mg/4ml/AMP	中文名：力復非 他	健保價：145
			赫士睿	代碼：IAR

適應症：急性低血壓、心跳停止

用法用量：將 4mg=1Amp 之 Levophed 溶液加入 1000ml 5%葡萄糖溶液中，每 ml 稀釋液含 4mcg Levophed base，靜脈注射此液。使用 IV drip chamber 開始時每分鐘 2~3ml (8~12mcg levophed base)，觀察病患反應後，調整流速維持低的正常血壓。平均維持劑量為 0.5~1ml/min。

副作用：焦慮、短暫性頭痛、呼吸困難等。

禁忌：血容量少的低血壓病人不能用。

注意事項：應加在 5%葡萄糖水或 5%葡萄糖生理食鹽水溶液中使用。

失智症用藥 (Antidementic)

英文名： Hydergine	學名： Dihydroergotoxine Mesylates	劑量：1.5mg/TAB	中文名：喜得鎮	健保價：22
圓形白色標記：HYDERGINE 15 Δ			諾華	代碼：OHY

適應症：老人癡呆症的輔助治療劑。

用法用量：每次 1.5mg，每天三次，餐中服用。

副作用：鼻塞、頭痛、短暫性噁心及反胃（餐時服用可改善）。

禁忌：對此藥品成分過敏者。懷孕期間不建議使用。

注意事項：使用前須排除全身性疾患所造成之幻覺或癡呆，原發性神經病變，原發性心智障礙。

英文名：Aricept 10	學名：Donepezil	劑量：10mg/TAB	中文名：愛憶欣	健保價：76
圓形黃色標記：10 ARICEPT		C	衛采	代碼：OARI10

適應症：阿滋海默症。

用法用量：每日劑量 5mg，4~6 週後，再將劑量調整為每日 10mg。晚上睡前服用。單獨或與食物並服。

副作用：噁心、腹瀉、失眠、嘔吐、肌肉痙攣、頭痛、感染、疼痛、倦怠與食慾減退。

禁忌：對 doxepinil 或 piperidine 過敏者。

英文名：Ebixa(原 廠)	學名：Memantine	劑量：10mg/TAB	中文名：憶必佳	健保價：18
橢圓形白色雙面具剝痕		B	隆柏	代碼：OEB

適應症：治療中重度及重度阿滋海默症。

用法用量：第一週為一天一次 5mg，之後依醫師處方調整劑量。調整劑量時間至少間隔一週。

(1) 若調整為一天 10mg，則一天二次各 5mg。

(2) 若調整為一天 15mg，則早上 10mg、晚上 5mg

(3) 最大劑量每日 20mg。

副作用：幻覺、困惑、暈眩、頭痛、疲倦。

禁忌：對 Memantine hydrochloride 成分過敏者。

英文名：EVY F.C.	學名：Memantine	劑量：10mg/TAB	中文名：益美憶	健保價：16.5
橢圓形白色雙面標記：EVY 10		B	強生	代碼：OEYV

適應症：治療中重度及重度阿滋海默症。

用法用量：第一週為一天一次 5mg，之後依醫師處方調整劑量。調整劑量時間至少間隔一週。

(1) 若調整為一天 10mg，則一天二次各 5mg。

(2) 若調整為一天 15mg，則早上 10mg、晚上 5mg

(3) 最大劑量每日 20mg。

副作用：幻覺、困惑、暈眩、頭痛、疲倦。

禁忌：對 Memantine hydrochloride 成分過敏者。

肌肉鬆弛劑(Muscle Relaxants)

英文名：Soma	學名： Acetaminophen 250mg Chlorzoxazone 150mg Caffeine Anhydrous 20mg Thiamine disulfide 7.7mg	劑量：	中文名：舒肌痛	健保價：1.5
黑黃膠囊			生達	代碼：OSO

適應症：關節痛、肌肉痛、顏面神經痙攣 神經痛、關節炎、強直、疼痛等。

用法用量：通常成人每次服 1 粒，1 日 3 次，於飯後服用。

副作用：未適應此藥前會產生想睡的感覺、嗜眠眩暈、頭痛、不眠、心跳過速、顏面潮紅、突然起立或坐下時感到暈眩、噁心、嘔吐。

禁忌：對此藥品成分過敏者。

英文名：Musgud	學名： Cyclobenzaprine	劑量：10mg/TAB	中文名：瑪舒可	健保價：4.23
圓形白色標記：BP615		B	美時	代碼：OMUS

適應症：緩解急性骨骼肌肌肉之痙攣。

用法用量：每次服用 5~10mg，一天三次。最高一天 60mg。

副作用：嗜眠、口乾、眩暈。

禁忌：

- (1) 對 Cyclobenzaprine 過敏者。
- (2) 禁與 MAOIs 合併使用。
- (3) 心肌梗塞急性發作期，及患有心律不整、心臟阻滯或傳導障礙、充血性心臟衰竭等病患。
- (4) 甲狀腺機能過高者。

注意事項：服用本藥治療不建議超過三星期。

英文名：Relaxin Inj	學名：Succinyl Choline	劑量：50mg/Vial	中文名：能弛聖	自費價：130
		C	杏林新生	代碼：IRE

適應症：手術用於肌肉鬆弛。

用法用量：成人間歇性投與：靜脈注射每次 10~60mg，無法達到肌肉鬆弛時，適宜增量直至肌肉鬆弛。持續點滴法：使其溶於成為 0.1~0.2%之生理食鹽液或 5%葡萄糖液中，以 2.5mg/min 速度進行。嬰兒及小兒：靜脈注射 1mg/kg，不能靜脈注射時，2~3mg/kg 肌肉注射。

副作用：呼吸停止、全身肌強直、抽搐、脈搏不規律、高熱、酸中毒等症狀。

注意事項：

- (1) 本品勿與抗 Cholinesterase 劑併用。

- (2) 如體溫升高，可用冰枕、酒精擦拭。
- (3) 若使用後有心跳上升的現象，可注射 β - 阻斷劑
- (4) 中毒時，可用 6% 碳酸氫鈉注射液 100ml IV。

利尿劑(Diuretics)

英文名： Suopinchon 急	學名：Furosemide	劑量： 20mg/2ml/AMP	中文名：壽平腫	健保價：10
棕色瓶身標示：suopinchon inj	C	壽元	代碼：ISU	

適應症：利尿、高血壓、急性肺水腫。

用法用量：

(1) 成人初劑量每日為 1/2~1 至 2 錠，維持劑量每日 1/2~1 錠。

(2) 嬰幼兒推薦劑量為每日每公斤體重 2mg，但每日最大劑量不可超過 40mg。

副作用：體液電解質不平衡，低鉀、鈉、鎂，高尿酸 Glucose-tolerance 會下降。

禁忌：無尿症，腎代償失調，肝昏迷者。

注意事項：

(1) 若病人須長期治療，需隨時測試病患之血中 Creatinine 值，尿素、電解質。若以本品治療高血壓，需由醫師定期監測病患情況。

(2) 於懷孕期間除非絕對必要才可使用本品，且僅能短時間使用。會進入乳汁中且會抑制乳汁分泌，故使用本品期間應停止哺乳。

(3) 雖然本品甚少發生低血鉀症，但仍建議多吃富含鉀質之食物（如：瘦肉、馬鈴薯、香蕉、蕃茄、花椰菜、菠菜、乾果），在某種情況下，亦可與含鉀和保鉀製劑一起使用。

英文名：Fluitran	學名： Trichlormethiazide	劑量：2mg/TAB	中文名：服爾伊 得安	健保價：1.5
扁圓粉紅色標記：+字刻痕/S字	C	塩野義	代碼：OFLT	

適應症：利尿或降血壓。

用法用量：(1) 水腫：每日 1~4mg。(2) 高血壓：每日 2~4mg。

副作用：體液電解質不平衡，低鉀、鈉、鎂，高尿酸 Glucose-tolerance 會下降，光敏感。

禁忌：無尿症，腎代償失調，對 Thiazides 類過敏者，肝昏迷者。

注意事項：紅斑性狼瘡症，高過敏者，腎功能損傷。

局部麻醉劑(Local Anesthetics)

英文名：Lidocaine Inj 2% 急	學名：Lidocaine	劑量：20mg/ml， 5ml/AMP	中文名：利多卡 因	健保價：50
		C	利達	代碼：ILID5

適應症：心室性不整律之急性治療。

用法用量：靜脈一次給藥法：成人每次 50~100mg(1~2mg/kg)(2%注射液 2.5~5ml)以 1~2 分鐘的時間，緩慢靜脈注射。效果不彰時，可在 5 分鐘後給與相同劑量。維持效果可 10~20 分鐘追加相同劑量，但 1 小時內最高劑量為 300mg。

副作用：類似休克或中毒症狀、皮膚過敏、思睡、焦慮、興奮、視覺模糊、噁心、頭昏眼花、嘔吐、脊髓神經不安。

禁忌：(1)有嚴重刺激傳導障礙的患者(有引起心跳停止之虞者)禁用。(2)曾有因本藥或 Anilide 類局部麻醉劑而引起過敏者禁用。

注意事項：有輕度刺激傳導障礙者、有顯著的竇性心搏過慢的患者、低血容患者、休克患者、有心臟衰竭患者、嚴重肝功能或腎功能障礙患者及老年人請慎重給藥

英文名：Lidocaine Inj 2% 急	學名：Lidocaine	劑量：20mg/ml， 20mlVial	中文名：利都卡 因	自費價：57
		C	Astra	代碼：ILID

適應症：表面麻醉使用於下述情況之表面麻醉和潤滑內視鏡檢查，如胃鏡及氣管鏡直腸鏡及大腸鏡檢查。

用法用量：

(1)視需要，局部塗抹。與任何局部麻醉劑一樣，應使用最低有效劑量以避免不良作用及併發症。老年病患及小孩應該依據年齡及身體狀況給藥。

(2)用於氣管內插管之潤滑劑插管前，取 5ml 凝膠塗抹在插管外部，避免凝膠進入管腔內。

(3)靜脈 1 次給藥法：靜脈注射成人每次 50~100mg，以 1~2 分鐘緩慢注射。如果效果不好，則於 5 分鐘後再注射相同劑量，必要時每 10~20 分鐘注射一次，但每小時最高使用劑量為 300mg。

副作用：類似休克或中毒症狀、皮膚過敏、思睡、焦慮、興奮、視覺模糊、噁心、頭昏眼花、嘔吐、脊髓神經不安。

禁忌：對本藥其它成份有過敏病例之病患請勿使用。

注意事項：開放性傷口。

(1)口服使用可能會妨礙吞嚥，增加異物吸入之危險性。本藥由傷口及黏膜吸收量較多，尤其是支氣管，當病人黏膜受損或給藥部位受損時應謹慎投與。

(2)若給藥部位劑量過高，可能造成高血中濃度時，應謹慎投與在癲癇、心臟傳導障礙、心律緩慢、肝功能障礙及嚴重休克病患。

英文名：Lido	學名：Lidocaine	劑量：2%，30gm	中文名：利度凝	自費價：43
----------	--------------	------------	---------	--------

Jelly 急			膠	
		C	人人	代碼：ELID

適應症：表面麻醉，適用於下述情況之表面麻醉和潤滑：膀胱鏡、導管插入；內視鏡檢查，如胃鏡及氣管鏡；直腸鏡及大腸鏡檢查；氣管內插管。

用法用量：氣管內插管之潤滑：取 2ml 凝膠塗抹在插管外部，避免凝膠進入管腔內。

副作用：使用此品潤滑插管，可能有術後喉嚨痛發生。可能有過敏反應。

禁忌：對醯胺類(Amide)局麻劑或凝膠中其他成分有過敏者。

注意事項：

(1) 本藥由傷口及黏膜吸收量較多，尤其是支氣管，當病人黏膜受損或給藥部位受損時應謹慎投與。口咽部使用可能會妨礙吞嚥，增加異物吸入之危險性。

(2) 有使用第三類抗心律不整藥物(如 Amiodarone)，可能對心臟方面的影響有加成性，須監測心電圖。

(3) 具心臟傳導問題者、老人及健康狀況差者、晚期肝病或重度腎功能障礙者，可能會有藥物血漿濃度過高，需特別小心。

英文名：Citosol inj 急	學名：Thiamylal	劑量：500mg/Vial	中文名：治得舒	自費價：109
		C	杏林新生	代碼：ICI

適應症：靜脈麻醉、全身麻醉之誘導。

用法用量：溶解於 20 ml 注射用蒸餾水。

(1) 全身麻醉的導入：最初 2~4ml (2.5%溶液 50~100 mg) 注入時觀察患者全身狀態，抑制狀態，依此感受性而決定追加量，追加注入直到患者不能應答為止。

(2) 精神科的電擊療法時的麻醉：通常 12ml (2.5%溶液 300mg) 約 25~35 秒的速度注入，確定達到必要的麻醉深度後直接用電擊法進行。

副作用：

(1) 麻醉中：呼吸停止、呼吸抑制、舌根沉下、喉頭痙攣引起咳、打嗝等。

(2) 清醒時：噁心、嘔吐、頭痛、暈眩、倦怠、流淚、發抖、痙攣、亢奮、面色發紅、麻木感。

禁忌：對 Barbiturates 過敏、嚴重支氣管氣喘、休克及大量出血的循環不全、嚴重心機能不全者、急性、間歇性 Porphyrin 症者。

注意事項：

(1) 本劑的用法及注射速度應考慮患者體質、健康狀態等個人差異。

(2) 動脈內注射時，會引起動脈閉塞、末梢壞死等重症狀態，應絕對避免。

(3) 漏出靜脈外時，以 Procaine 等局部麻醉劑來浸潤，或以溫濕布進行適當的處理。

(4) 靜脈內給藥可能引起血栓性靜脈炎。

尿道抗痙攣藥物

英文名：Ditropan	學名：Oxybutynin	劑量：5mg/TAB	中文名：達多幫	健保價：2.75
橢圓形淡藍色標記：PBF129		B	寶齡富錦	代碼：ODIT

適應症：因膀胱神經之控制不適所伴隨排尿諸症之緩解。

用法用量：

(1) 成人：通常一天 2-3 次，每次 5mg，一天內不宜超過四次為限。

(2) 5 歲以上小孩：通常一天 2 次，每次 5mg 或 2.5mg，一天內不超過三次為宜。

副作用：口乾、出汗減少、尿量停留、視力模糊、心博加速、心跳加快、便秘、嗜睡等

禁忌：青光眼、胃腸道阻塞、重症肌無力、尿道阻塞、心臟血管不適引起的急性出血。

注意事項：服用本藥可能會引起昏睡、視覺模糊，從事冒險工作者、汽車駕駛者需特別留神。

戒菸輔助劑(Smoking cessation Aid)

英文名：Nicotinell 口嚼錠	學名：Nicotine	劑量：2mg/TAB	中文名：克菸	健保價：6
白色方形咀嚼錠		D	諾華	代碼：ONICO

適應症：戒菸輔助劑。

用法用量：用量因人而異，從 2mg 開始，每天 8~12 粒為宜。應至少使用三個月以上。應逐漸減低劑量。當每日用量少於 1~2 粒時，應停止治療。不宜使用超過一年。

(1) 將一錠置於口腔，緩慢的咀嚼，每嚼一次休息數秒。

(2) 咀嚼 10 次後，放在舌下或兩頰含著約 1~2mins。

(3) 再咀嚼 10 次，再次含著。

(4) 反覆上述步驟約 30 分鐘，習慣味道後，可依自己需求調整咀嚼速度。

副作用：頭暈、頭痛、噁心、腸胃不適、打嗝。初次使用偶有喉嚨刺激的感覺或唾液過多的現象。

禁忌：孕婦、授乳婦應避免使用。不可與香煙併用。

英文名：Smokfree 15	學名：Nicotine	劑量： 2.08mg/cm ²	中文名：淨菸 15	自費價：64
扁平方形膚色貼片		D	信東	代碼：TSM15

適應症：戒菸輔助劑。

用法用量：每天吸煙 20 支以上：每天貼一片。

副作用：初次使用偶有喉嚨刺激的感覺或唾液過多的現象。

禁忌：孕婦、授乳婦應避免使用。不可與香煙併用。

英文名：Smokfree 10	學名：Nicotine	劑量： 2.08mg/cm ²	中文名：淨菸 10	自費價：64
--------------------	-------------	-------------------------------	-----------	--------

扁平方形膚色貼片	D	信東	代碼：TSM10
----------	---	----	----------

適應症：戒菸輔助劑。

用法用量：每天吸煙 20 支以上：每天貼一片。

副作用：初次使用偶有喉嚨刺激的感覺或唾液過多的現象。

禁忌：孕婦、授乳婦應避免使用。不可與香煙併用。

英文名：Champix	學名：Varenicline	劑量：1mg/TAB	中文名：戒必適	自費價：65
淡藍色膠囊狀雙凸膜衣錠	C	輝瑞	代碼：OCH	

適應症：戒菸輔助劑。

用法用量：建議劑量如下表，先經過一週的劑量調整後，再改為每日兩次服用 1mg。

第 1~3 天：每日一次 0.5mg 第 4~7 天：每日兩次 0.5mg 第 8 天~治療結束，每日兩次 1mg

副作用：噁心、睡眠障礙、便秘、脹氣、嘔吐。

禁忌：對 Champix 過敏者。

注意事項：不建議用於 18 歲以下的患者。

抗生素類(Antibiotic)

英文名： Amoxicillin	學名：Amoxicillin	劑量：500mg/CAP	中文名：安莫西林	健保價：1.5
紅黃色膠囊標記：YSP/AXCs		B	永信	代碼：OAMO

適應症：葡萄球菌、鏈球菌、肺炎雙球菌、腦膜炎球菌及其他具有感受性細菌引起之感染症。

用法用量：口服 250mg~500mg 每 8 小時一次，最大劑量一天 4.5gm。飯前 30 分鐘或飯後服用。

副作用：噁心、嘔吐、腹瀉、紅斑、蕁麻疹。

禁忌：

- (1) 對 Penicillins 或 Cephalosporins 過敏者。
- (2) 口服 Penicillins 不宜用於嚴重肺炎、蓄膿、菌血症、腦膜炎、或敗血性關節炎。

注意事項：發生皮膚疹時應該停藥。

磺胺藥

英文名：Baktar	學名： Sulfamethoxazole 400mg， Trimethoprim 80mg	劑量：	中文名：撲菌特	健保價：2
圓形白色標記：780		C	塩野義	代碼：OBAK

適應症：

- (1) 葡萄狀球菌、鏈鎖球菌、肺炎雙球菌、大腸菌、赤痢菌及綠膿菌引起之感染症。
- (2) 選擇性治療和預防 AIDS 病人 Pneumocystis carinii 引起的肺炎。

用法用量：每次 2 錠，一天 2 次。

副作用：

- (1) 胃腸道不適、噁心、嘔吐、厭食及皮膚過敏反應。
- (2) 對 AIDS 病患和老年人可能發生血液方面的問題。

禁忌：

- (1) 對 Trimethoprim 或 sulfamethoxazole 成分過敏者
- (2) 由於 Folate 缺乏而引起的巨紅血球性貧血。
- (3) 缺乏 Glucose-6-phosphate dehydrogenase 患者禁用。

注意事項：可能出現 Stevens-Johnson 症候群（出疹、喉嚨痛、發燒、皮膚蒼白或黃疸）時，應立即停藥。

抗帕金森氏症製劑(Antiparkinsonism Drugs)

英文名： Bendopar 125	學名：L-dopa 100 mg, benserazide 25mg	劑量：125mg/CAP	中文名：賓渡帕	健保價：3.64
粉紅/藍膠囊標記：ST021 125		C	信東	代碼：OBE125

適應症：帕金森氏症。

用法用量：起始劑量 Levodopa 50mg+benserazide 12.5mg，口服 3~4 次。嚴密監督下劑量可每 2~3 天調整一次或每星期調整單一劑量。Levodopa 400~800mg + benserazide 100~200mg 可達適當效果，需分成 3 次或 3 次以上分次服用。需更高劑量者，則每月調整一次。

副作用：初期使用有食慾不振、噁心、嘔吐等應於進餐時或與少許食物或流質一併服用。在治療末期，不隨意運動可能會發生。這些副作用均與劑量有關，在劑量降低後會消失或減輕。

禁忌：不可與 MAOI 一起服用。於有心肌梗塞，冠狀動脈循環不良或心律不整病人，要週期性檢查心臟血管，包括心電圖。對患有青光眼之病人，應定期檢查眼內壓。心臟功能不全及嚴重內分泌疾病、腎臟肝臟病，精神病的患者，不宜使用。緊急手術時應避免使用 Cycloporpane 或 Halothane 麻醉。25 歲以下或懷孕之婦人亦不可使用。

注意事項：若需全身麻醉，則必須事先停藥 12~48 小時。長期治療須定期檢查血球數及肝功能檢查。

英文名：Madopar 250	學名：L-dopa 200 mg, benserazide 50mg	劑量：250mg/TAB	中文名：美道普	健保價：8.4
圓形淡淺玫瑰色標記：ROCHE		C	羅氏	代碼：OMA250

適應症：帕金森氏症。

用法用量：起始劑量 62.5mg 每天 3~4 次，每日 300~800mg 的 levodopa 劑量，分成 3~4 次服用。

副作用：L-dopa 單獨使用時之副作用有食慾喪失、噁心、嘔吐等應於進餐時或與少許食物或流質一併服用。在治療末期，不隨意運動可能會發生。這些副作用均與劑量有關，在劑量降低後會消失或減輕。

禁忌：不可與 MAOI 一起服用。於有心肌梗塞，冠狀動脈循環不良或心律不整病人，要週期性檢查心臟血管，包括心電圖。對患有青光眼之病人，應定期檢查眼內壓。心臟功能不全及嚴重內分泌疾病、腎臟肝臟病，精神病的患者，不宜使用。緊急手術時應避免使用 Cycloporpane 或 Halothane 麻醉。25 歲以下或懷孕之婦人亦不可使用。

注意事項：若需全身麻醉，則必須事先停藥 12~48 小時。長期治療須定期檢查血球數及肝功能檢查。

抗狹心症藥物(Antianginal Drugs)

英文名： Nitrostat 急	學名： Nitroglycerin	劑量：0.6mg/Subl	中文名：耐絞寧	健保價：2.92
圓形白色標記：N/6	C	輝瑞	代碼：ONIT	

適應症：心絞痛預防及治療。

用法用量：當急性心絞痛第一徵象出現前，迅速將一粒本品置於舌下或口腔頰中，使其溶化吸收。直到症狀獲得緩解前，每 5 分鐘間隔，重複服用一粒，至多給予三粒，若症狀無法改善，應立即就醫。預防使用通常在從事可能發生心絞痛活動前 5~10 分鐘服用。

副作用：頭痛、低血壓、噁心、嘔吐。

禁忌：

- (1) 具有早期心肌梗塞嚴重貧血者。
- (2) 對此藥過敏者

注意事項：

- (1) 以最低有效量來緩解心絞痛之發作，切忌以大量。
- (2) 本藥需由口腔及舌下服用，切忌吞服，如發生視力模糊或口乾現象即需停藥。
- (3) 過量的服用也會引起嚴重頭痛。

抗組織胺藥物(Antihistamines)

英文名： Diphenhydramine inj	學名： Diphenhydramine	劑量： 30mg/ml/AMP	中文名：鹽酸二 苯胺明	健保價：3
透明瓶標記：Diphenhydramine	B	台裕	代碼：IVE	

適應症：(1) 過敏性鼻炎。(2) 皮膚疾患(濕疹、皮膚炎) 枯草熱。(3) 急性鼻炎。(4) 血管神經性鼻炎。

用法用量：成人一日 2~3 次，每次 1ml(30mg)，皮下或肌肉注射，但必要時亦可行靜脈注射。靜脈注射劑量以 10~50mg，注射速率不宜超過 25mg/min。

副作用：倦怠感、神經過敏、頭痛、口渴、噁心、嘔吐與下痢等。

注意事項：懷孕婦女經評估後再使用。肌肉注射時應避開神經分布處。皮下或皮內注射可能造成組織壞死，應儘量避免。

抗焦慮、鎮靜及安眠劑(Antianxiety.Hypnotic)

英文名：Kinax 4	管	學名：Alprazolam	劑量：0.5mg/TAB	中文名：景安寧	健保價：2
橢圓粉紅標記：SK/201		D	景德	代碼：OKIN	

適應症：焦慮狀態。

用法用量：0.25~0.5mg，每日三次。每日最大劑量 4mg，分次投予。

副作用：思睡、頭昏眼花、抑鬱、噁心、眩暈、嘔吐、口乾等。

禁忌：(1) 對 BZD 過敏者。(2) 狹角性青光眼者禁用。

注意事項：

- (1) 重症肌無力。
- (2) 呼吸衰竭。
- (3) 嚴重睡眠呼吸中止症。
- (4) 嚴重肝功能不全。

英文名：Xanax 0.25	管 4	學名：Alprazolam	劑量： 0.25mg/TAB	中文名：贊安諾	健保價：2
白色橢圓形標記：UPJOHN,29		D	輝瑞	代碼：OXA25	

適應症：焦慮狀態。

用法用量：焦慮：起始劑量 0.25~0.5mg，一天三次。常用劑量 0.5~4mg 平分數次使用。

副作用：思睡、倦怠、失憶、運動失調、激動、神經質、抑鬱、眩暈、口乾、唾液分泌過多。

禁忌：(1) 已知對 Benzodiazepine 會高度過敏的病人。(2) 狹窄性青光眼，孕婦、受乳婦。

注意事項：(1) 具有 CNS 抑制的作用。(2) 會致胎兒畸形。

英文名：Xanax 0.5	管 4	學名：Alprazolam	劑量：0.5mg/TAB	中文名：贊安諾	健保價：2
橢圓形桃紅色標記：UPJOHN,55		D	輝瑞	代碼：OXA	

適應症：焦慮狀態。

用法用量：焦慮：起始劑量 0.25~0.5mg，一天三次。常用劑量 0.5~4mg 平分數次使用。

副作用：思睡、倦怠、失憶、運動失調、激動、神經質、抑鬱、眩暈、口乾、唾液分泌過多。

禁忌：(1) 已知對 Benzodiazepine 會高度過敏的病人。(2) 狹窄性青光眼，孕婦、受乳婦。

注意事項：(1) 具有 CNS 抑制的作用。(2) 會致胎兒畸形。

英文名：Bromazin 管 4	學名： Bromazepam	劑量：3mg/TAB	中文名：牟靜錠	健保價：1.58
圓形粉紅色標記：JCP3		D	強生	代碼：OBRO

適應症：焦慮症。

用法用量：成人每次 1.5~3mg，一天 3 次，嚴重者可 6~12mg/day 分 2~3 次使用。

副作用：思睡、頭昏眼花、抑鬱、眩暈、噁心。

禁忌：對 BZD 過敏者、狹窄性青光眼、孕婦、授乳婦、重症肌無力患者。

注意事項：(1) 具有抑制 CNS 的功效。(2) 會致畸胎。(3) 免造成藥物依賴，服藥物超過 4~5 個月。

英文名： Lendormin 管 4	學名：Brotizolam	劑量： 0.25mg/TAB	中文名：戀多眠	健保價：4.04
圓形白色標記：13A 13A		X	百靈佳	代碼：OLEN

適應症：失眠症。

用法用量：睡前空腹 0.25mg，年老者 0.125~0.25mg。

副作用：白天嗜睡、頭痛、眩暈、運動失調、複視，此現象治療一段時間會消失。較高劑量或與酒精併服，記憶力可能受損。

禁忌：重症肌無力、睡眠呼吸停止症候群、嚴重肝功能不全、兒童不宜。

注意事項：

- (1) 突然停藥會增加戒斷症狀或反彈現象，應採用漸減方式停藥。
- (2) Brotizolam 不應使用於飲酒過量或吸毒者。

英文名： Clonopam 2 管 4	學名： Clonazepam	劑量：2mg/TAB	中文名：克癩平	健保價：2.66
圓形白色標記：SK 2		D	景德	代碼：OCLO2

適應症：癲癇、恐慌症。

用法用量：

- (1) 癲癇：初劑量不超過 0.5mg，一天三次。極量為一天 20mg。維持劑量為一天 2-4mg。
- (2) 恐慌症：可每三天增加劑量一天兩次 0.125~0.25mg，每日最大劑量 1~4mg，分兩次服用。

副作用：

(1) 疲勞、鎮靜、憂鬱、頭暈、運動失調、激動、神經質、口乾、唾液分泌過多等，而現象多為短暫性的，當繼續治療或調整劑量時自然消失。

(2) 戒斷症狀：50%病人經過長時間治療，可能有短暫發作、痛苦、煩躁不安、自律失調。

禁忌：對 Clonazepam 過敏者。

注意事項：

- (1) 突然停藥會增加戒斷症狀或反彈現象，應採用漸減方式停藥。
- (2) Brotizolam 不應使用於飲酒過量或吸毒者。

英文名：Rivotril 0.5 (原廠) 管 4	學名： Clonazepam	劑量：0.5mg/TAB	中文名：利福全	健保價：1.5
圓形橙色標記：ROCHE 0.5		D	羅氏	代碼：ORIV05

適應症：癲癇。

用法用量：

- (1) 癲癇：初劑量不超過 0.5mg，一天三次。極量為一天 20mg。維持劑量為一天 4~8mg。
- (2) 恐慌症：每天 1~4mg，分兩次服用。

副作用：

(1) 疲勞、鎮靜、憂鬱、頭暈、運動失調、激動、神經質、口乾、唾液分泌過多等，而現象多為短暫性的，當繼續治療或調整劑量時自然消失。

(2) 戒斷症狀：50%病人經過長時間治療，可能有短暫發作、痛苦、煩躁不安、自律失調。

禁忌：對 benzodiazepines 過敏者、嚴重呼吸不足或嚴重肝功能受損的病人。

注意事項：不可突然停藥，長期使用可能會產生依賴性，急遽停藥會產生戒斷症狀。

英文名： Clonopam 0.5 管 4	學名： Clonazepam	劑量：0.5mg/TAB	中文名：克癲平	健保價：1.5
圓形橙色標記：SK 0.5		D	景德	代碼：OCL005

適應症：癲癇、恐慌症。

用法用量：

(1) 癲癇：初劑量不超過 0.5mg，一天三次。極量為一天 20mg。維持劑量為一天 1~4mg。

(2) 恐慌症：可每三天增加劑量一天兩次 0.125~0.25mg，每日最大劑量 1~4mg，分兩次服用。

副作用：

(1) 疲勞、鎮靜、憂鬱、頭暈、運動失調、激動、神經質、口乾、唾液分泌過多等，而現象多為短暫性的，當繼續治療或調整劑量時自然消失。

(2) 戒斷症狀：50%病人經過長時間治療，可能有短暫發作、痛苦、煩躁不安、自律失調。

禁忌：對 Clonazepam 過敏者。

注意事項：

(1) 突然停藥會增加戒斷症狀或反彈現象，應採用漸減方式停藥。

(2) Brotizolam 不應使用於飲酒過量或吸毒者。

英文名：Dupin Inj 急 管 4	學名：Diazepam	劑量：10mg/2ml	中文名：樂平	健保價：15
褐色瓶標記：樂平		D	中化	代碼：IDUP

適應症：焦慮狀態、失眠、肌肉痙攣、癲癇重積狀態

用法用量：

(1) 抗焦慮：IM 或 IV 最大量 10mg，需要時 4 小時後可重複投與。

(2) 癲癇發作：IV 或 IM(IV 佳)，初劑量 5~10mg。必要時每隔 10~15 分鐘重覆給藥，最高劑量 30mg。必要時，2~4 小時重覆給藥。

(3) 肌肉痙攣：IM 或緩慢靜脈注射 5~10mg，必要時，每 3~4 小時後可重覆投與。

(4) 酒精戒斷症狀：IM 或 IV 先給予 10mg，必要時，每 3~4 小時再投予 5~10mg。

副作用：(1) 嗜睡、鎮靜、運動失調。(2) 高劑量可能發生呼吸抑制和低血壓。(3) 當出現耐受性時，會發生反彈性焦慮及失眠。

禁忌：昏迷、急性肺功能不足、睡眠窒息、肌肉無力、肝或腎功能傷害、急性狹窄性青光眼。

注意事項：對任何一種 BZD 過敏者，亦可能對此藥過敏。服用本品可能出現夢遊行為。

英文名：Diapine	學名：Diazepam	劑量：2mg/TAB	中文名：大安源	健保價：2
-------------	-------------	------------	---------	-------

管 4				
圓形白色標記：2	D	強生	代碼：ODIA2	

適應症：焦慮狀態、失眠、肌肉痙攣。

用法用量：

- (1) 抗焦慮、安眠：每日 5~30mg 睡前或分次給與，一天 2~4 次。
- (2) 急性酒精戒斷：第一次 10mg，此後視需要一天 3~4 次，劑量以能維持鎮靜為原則。
- (3) 抗痙攣、骨骼肌鬆弛：2~10mg，一天 3~4 次。
- (4) 老人及體弱者：2~2.5mg，一天 1~2 次，視需要及耐受性逐漸增加劑量。

副作用：嗜睡、鎮靜、不安、便秘、眩暈、頭痛、噁心或嘔吐等。

注意事項：對任何一種 BZD 過敏者，亦可能對此藥過敏。懷孕前三個月使用可能有致畸胎之風險。

英文名：Eszo 管 4	學名：Estazolam	2mg/TAB	中文名：艾斯樂	健保價：2
圓形白色標記：ST	X	信東	代碼：OES	

適應症：失眠。

用法用量：睡前 1~2mg。應視患者之病情、年齡、疾患等酌情增減。

副作用：

- (1) 連續服用突然終止投與，則有瞻妄、痙攣等戒斷症狀。
- (2) 偶有嗜眠、精神恍惚、眩暈、步行失調、頭痛之症狀出現。

禁忌：懷孕者與對此藥品成分過敏者。重症肌無力者。

注意事項：避免從事汽車駕駛等危險的機械操作。衰弱患者、高齡者、心、肝、腎障礙者、腦器質障礙者等患者需慎重投與。

英文名：Flupine 管 4	學名：Fludiazepam	劑量：0.25mg/TAB	中文名：福安源	健保價：2.71
圓形白色標記：JCP / G38			強生	代碼：OFLUP

適應症：焦慮狀態、失眠、肌肉痙攣。

用法用量：成人每次服用一錠，每日服用三次，可依年齡、症狀適量增減。

副作用：思睡、頭昏眼花、眩暈、噁心。

禁忌：昏迷、急性肺功能不足、睡眠窒息、肌肉無力、肝或腎功能傷害、急性狹窄性青光眼、慢性精神病有畏懼的狀態、嚴重心臟病患者。

注意事項：

- (1) Phenothiazine 類、Barbiturate 等中樞神經抑制劑，有增強其作用之慮。請謹慎評估。
- (2) 避免與酒精併服。
- (3) 與其他 BZD 相比，懷孕初期使用，生出畸形兒比例高。

英文名：Dalmadorm 管 4	學名：Flurazepam	劑量：30mg/CAP	中文名：當眠多	健保價：5.3
黑白膠囊標記：VALEANT 30	C(AUS)	歐帕	代碼：ODAL	

適應症：失眠。

用法用量：睡前服用 15~60mg。一般成人劑量睡前服用 30mg，老年人及體弱者，開始劑量是 15mg。

副作用：思睡、眩暈、運動不能。

注意事項：本藥服用期間必需避免喝酒，此外服藥後也不適合開車或操作危險性機械。

英文名：Silence 1 管 4	學名：Lorazepam	劑量：1mg/TAB	中文名：悠然	健保價：2
圓形白色標記：A		D	永信	代碼：OSIL

適應症：焦慮狀態。

用法用量：每日平均劑量 2~4mg 分次使用，一般初劑量 1~3mg 分 2~3 次。若用於治療失眠，可於睡前一次給與全日劑量 2~4mg。手術前藥物療法，建議於手術前夜或術前 1~2 小時給與 2~4mg。

副作用：鎮靜、憂鬱、疲倦、噁心、眩暈、運動失調、口齒不清、虛弱、健忘、情緒激動、注射部位疼痛、流口水、口乾。

禁忌：對本品或其他 Benzodiazepine 衍生物過敏者。

注意事項：

- (1) 白天倦睡，通常 2~3 天會消失，但必要時依照個別需要，調整劑量，可以減少此現象。
- (2) 患者曾使用抗焦慮劑，可以較高劑量開始。
- (3) 如果失眠是主要的症狀，睡前的劑量可以增加。
- (4) 本品與 Neuroleptics 藥物合併使用時，後者可以減量。

英文名：Lorazin 管 4	學名：Lorazepam	劑量：0.5mg/TAB	中文名：樂力靜	健保價：1.5
圓形藍色剝半刻痕		D	強生	代碼：OLOZ

適應症：焦慮狀態。

用法用量：每日平均劑量 2~4mg 分次使用。一般初劑量 1~3mg 分 2~3 次。若用於治療失眠，可於睡前一次給與全日劑量 2~4mg。手術前藥物療法，建議於手術前夜或術前 1~2 小時給與 2~4mg。老人及體弱者，建議初劑量 1~2mg 分次服用，可依病人狀況及耐受性調整。

副作用：眩暈、思睡、虛弱、情緒不穩。

禁忌：對本品或其他 Benzodiazepine 衍生物過敏者。

注意事項：懷孕期間使用可能損害嬰兒。急性狹角性青光眼、嚴重呼吸功能不足或重肌無力症的病人時，須格外留意。可能出現夢遊行為。

英文名：Ativan 0.5 (原廠) 管 4	學名：Lorazepam	劑量：0.5mg/TAB	中文名：安定文	健保價：2
圓形藍色標記：0.5		D	輝瑞	代碼：OATV

適應症：焦慮狀態。

用法用量：每日平均劑量 2~4mg 分次使用，一般初劑量 1~3mg 分 2~3 次。若用於治療失眠，可於睡前一次給與全日劑量 2~4mg。手術前藥物療法，建議於手術前夜或術前 1~2 小時給與 2~4mg。

副作用：鎮靜、憂鬱、疲倦、噁心、眩暈、運動失調、口齒不清、虛弱、健忘、流口水、口乾。

禁忌：對本品或其他 Benzodiazepine 衍生物過敏者。

注意事項：

- (1) 白天倦睡，通常 2~3 天會消失，但必要時依照個別需要，調整劑量，可以減少此現象。
- (2) 患者曾使用抗焦慮劑，可以較高劑量開始。
- (3) 如果失眠是主要的症狀，睡前的劑量可以增加。
- (4) 本品與 Neuroleptics 藥物合併使用時，後者可以減量。

英文名：Calmday 管 4	學名： Nordazepam	劑量：5mg/TAB	中文名：康眠定	健保價：3.9
圓形橘色無標記		D	吉富	代碼：OCAL5

適應症：焦慮、緊張所引起的精神障礙。

用法用量：成人每天服用 2~3 次，每次 1 錠。

副作用：服用過量可能產生運動失調步伐呆滯。

禁忌：(1) 對本藥或賦型劑成分過敏者。(2) 重症肌無力、懷孕、哺乳期間禁用。

注意事項：白天服用本藥可能會降低反射運動。酒精會增加本藥效力，故應避免喝酒。

英文名：Alepam 管 4	學名：Oxazepam	劑量：15mg/TAB	中文名：安樂平	健保價：3.8
圓形淡黃色標記：G/OM 15		D	曼哈頓	代碼：OALE

適應症：焦慮、緊張、不安、精神激昂、酒精戒斷症狀。對於原發性精神病並無幫助，但可以輔佐抗鬱劑與其他的治療

用法用量：

- (1) 器質性疾病或情緒壓力引起的焦慮：15mg，一天 3~4 次。
- (2) 嚴重焦慮及惡化反應：15~30mg，一天 3~4 次。
- (3) 老年人的焦慮：7.5~15mg，一天 2~3 次。

副作用：鎮靜、倦怠、憂鬱、頭暈、運動不能、健忘、唾液過度分泌、口乾、昏眩、激動、神經質。

禁忌：重症肌無力、急性狹角性青光眼、休克、昏迷或酒精中毒。

注意事項：(1) 心理上依賴（成癮性）可能發生。(2) 突然停藥，大發作癲癇頻率及嚴重度可能增加。

英文名：Sotalon 管 4	學名：Zaleplon	劑量：10mg/CAP	中文名：舒得夢	健保價：3.83
深綠/淺綠膠囊標記：PM016,10mg		C	歐帕	代碼：OSOT

適應症：治療難以入睡的失眠病人，僅適用於嚴重，病人功能障礙或遭受極度壓力之失眠症患者，屬於較短效安眠藥。

用法用量：

- (1) 治療期盡量短暫，最長治療期最多兩個星期。
- (2) 每位病人每天服用的總劑量不應超過 10mg。

(3) 老人建議劑量：5mg。

副作用：中度頭痛、虛弱、嗜眠狀態及昏睡。

禁忌：(1) 18 歲以下小孩。(2) 嚴重肝功能不全、睡眠停止呼吸症候群、重症肌無力。

注意事項：(1) 懷孕與哺乳期間之使用應特別注意。

(2) 若於數星期內重複使用短效 benzodiazepine，可能會減少藥品的安眠效果。

英文名： Sleepman 劑量： 管 4	學名：Zolpidem	劑量：10mg/TAB	中文名：舒夢眠	健保價：2.51
長橢圓形白色標記：CM	C	中美	代碼：OSL	

適應症：失眠症。

用法用量：(1) 65 歲以下成人：睡前一錠。(2) 65 歲以上老人：睡前 1/2 錠。

副作用：暈眩、嗜睡、運動不能、頭痛、噁心、失憶、腹瀉、激動、神經質。

禁忌：對此藥品過敏者、嚴重呼吸功能不全、嚴重急慢性肝功能不全、睡眠呼吸中煮症候群、肌無力者。

注意事項：(1) 65 歲以上老人，一天勿超過一錠，需小心跌倒。(2) 短期間給藥治療。

英文名：Stilnox (原廠) 管 4	學名：Zolpidem	劑量：10mg/TAB	中文名：使蒂諾 斯	健保價：2.51
長橢圓形白色標記：Stilnox	C	安斯泰來	代碼：OSTI	

適應症：失眠症。

用法用量：女性與老人起始劑量 5mg。男性 5 或 10mg。

副作用：暈眩、嗜睡、運動不能、頭痛、噁心、失憶、腹瀉、

禁忌：對此藥品過敏者、嚴重呼吸功能不全、嚴重急慢性肝功能不全、睡眠呼吸中煮症候群、肌無力者。

注意事項：(1) 65 歲以上老人，一天勿超過一錠，需小心跌倒。(2) 短期間給藥治療。

英文名：Stilnox CR 管 4	學名：Zolpidem	劑量： 6.25mg/TAB	中文名：使蒂諾 斯長效錠	健保價：4.42
圓形暗紅色標記：ZMR	C	安斯泰來	代碼：OSTICR	

適應症：失眠症。

用法用量：長效錠 6.25mg 睡前使用，每日最大劑量 12.5mg。整粒吞服，不可折半、壓碎或咀嚼。

副作用：暈眩、嗜睡、運動不能、頭痛、噁心、失憶、腹瀉、激動、神經質。

禁忌：對此藥品過敏者、嚴重呼吸功能不全、嚴重急慢性肝功能不全、睡眠呼吸中煮症候群、肌無力者。

注意事項：短期間給藥治療。

英文名：Uniclone	學名：Zopiclone	劑量：5mg/TAB	中文名：優樂康	健保價：2.89
--------------	--------------	------------	---------	----------

管 4				
橢圓形白色標記：UN439	D	聯邦	代碼：OUNI	

適應症：失眠症。

用法用量：成人睡前 7.5mg，不可超過此劑量。老年人、肝腎功能受損或慢性呼吸功能不良者起始劑量 1/2 錠，隨後可增加至 1 錠。

副作用：苦味、暈眩、頭痛、嗜睡、消化不良、噁心、口乾、皮膚搔癢等。

禁忌：(1) 重症肌無力。(2) 呼吸衰竭。(3) 嚴重睡眠呼吸中止症。(4) 嚴重肝功能不全。

注意事項：

- (1) 停止使用本品前應逐漸降低劑量。
- (2) 此藥品可能出現夢遊行為。
- (3) 懷孕期不建議使用。懷孕後三個月或分娩服用，胎兒可能體溫過低、肌張力過低及呼吸抑制。

抗痛風用藥(Antigout Agent)

英文名： Allopurinol	學名：Allopurinol	劑量：100mg/TAB	中文名：安樂普 利諾	健保價：22
圓形白色標記：YUNG SHIN	C	永信	代碼：OALL	

適應症：痛風症、痛風性關節炎、尿酸結石、癌症或經化學治療產生之高尿酸血症。

用法用量：起始劑量：由每日 100mg 開始，每週增加 100mg 直至尿酸值降至所需濃度，但不可超過最高劑量 800mg/day。維持劑量：100~200mg，一天 2~3 次。

副作用：過敏反應（皮膚出疹、搔癢、發熱、噁心、肌肉疼痛）、畏寒、倦怠感、嘔吐、排尿困難或疼痛。

注意事項：(1) 每天至少要飲用 2000ml 的液體。(2) 建議病人限制食用某些高普林的食物。

抗感染劑(Anti-Infectives)

英文名： Erythromycin Oph Oint	學名： Erythromycin	劑量： 3.5gm/TUBE	中文名：紅黴素 眼藥膏	健保價：12.1
長條軟膏		C	景德	代碼：EER

適應症：結膜炎、角膜炎、淚囊炎、麥粒腫、眼瞼緣炎、角膜潰瘍、砂眼。預防新生兒之淋球菌、披衣菌感染。

用法用量：一日一至數次，視症狀點於眼患部。本藥須醫師處方使用。

英文名： Exelderm cream	學名： Sulconazole	劑量： 50mg/5gm/TUBE	中文名：優足達	健保價：37.5
長條軟膏		C	田邊	代碼：EEX

適應症：足癬（香港腳）、股癬、體癬、皮膚念珠菌症、花斑癬（汗斑）。

用法用量：一日 2~3 回、適量塗抹於患部。

副作用：皮膚有時可能出現局部搔癢感、刺激感、灼熱感、接觸性皮炎。

禁忌：(1) 曾對本品成分過敏者禁用。(2) 勿用於嚴重糜爛部位。

注意事項：(1) 本品有刺激性，在龜裂與糜爛部位應小心使用。(2) 早產兒及新生兒的安全性尚未確立。

英文名：B.C. Cream	學名： γ -Benzene hexachloride (Lindane)	劑量：10gm/TUBE	中文名：美西	健保價：100
長條軟膏		C	壽元	代碼：EBC

適應症：疥蟲、陰蝨、頭蝨及其從蟲卵之感染。

用法用量：先將患處以溫水洗淨，擦乾，以本品適量塗擦於患部，須經 8~12 小時後方可洗去。僅需使用一次，即可奏效。

副作用：刺激性皮膚炎、中樞神經系統興奮作用，症狀包含暈眩到癲癇發作。

禁忌：禁止使用於具有痲疹子之挪威疥(Norwegian scabies)、未受控制癲癇症(uncontrolled seizure disorder)及已知對本品有效成分(Lindane)或任一賦形劑過敏之患者。

注意事項： γ -Benzene hexachloride 經體內吸收後會引起痙攣，造成中樞神經系統之毒性，嬰兒、小孩及孕婦應小心使用為宜。

抗精神病劑(Antipsychotic Drugs)

第一代抗精神病劑

英文名： Winsumin	學名： Chlorpromazine	劑量：50mg/TAB	中文名：穩舒眠	健保價：1.5
圓形粉紅色無標記		C	強生	代碼：OWIN

適應症：躁病、精神病狀態、噁心、嘔吐、攻擊性與破壞性之行為障礙。

用法用量：起始劑量 10~50mg，1 天 2~6 次，最高一天 1000mg。

副作用：錐體外徑症狀(僵直、靜坐不能、震顫)、眩暈、口乾。

禁忌：曾對任一種 phenothiazine 產生過敏者，此藥亦會過敏。

注意事項：

- (1) 會排泄到乳汁，哺乳之婦女應小心評估。
- (2) 酒精中毒、骨髓抑制、心血管疾病、青光眼、肝功能障礙等使用此藥應小心考慮。
- (3) 口服後 1 小時內，不可服用制酸劑或瀉劑。
- (4) 開車、操作機器等需特別留意。
- (5) 投用此藥尿液可能變色。

英文名：Etumine	學名：Clotiapine	劑量：40mg/TAB	中文名：意妥明	健保價：6.8
圓形白色標記：2T WANDER			吉富	代碼：OET

適應症：精神病狀態。

用法用量：起始劑量 120~200mg，分成 2~3 次服藥。每日最大劑量 360mg，分次使用。

副作用：錐體外徑症狀(僵直、靜坐不能、震顫)、鎮靜、口乾、姿勢性低血壓。

禁忌：曾對任一種 clotiapine 產生過敏者，此藥亦會過敏。

注意事項：

- (1) 老年病人需留意血壓。
- (2) 狹角性青光眼用此藥應小心。
- (3) 只有在必要情況下，使能處方給予懷孕中及哺乳中病人。
- (4) 開車、操作機器等需特別留意。

英文名：Fluanxol 3	學名：Flupentixol 2HCl	劑量：3mg/TAB	中文名：福祿安	健保價：4.1
圓形土黃色標記：F1		C(AUS)	隆柏	代碼：OFL3

適應症：精神病狀態。

用法用量：起始劑量每日 3~15mg，分成 2~3 次投與，最高一天 40mg，維持劑量為每日 5~20mg。

副作用：錐體外徑症狀（可用抗帕金森氏劑治療，但不建議做為例行性之預防使用）、暈眩、失眠、口乾、疲勞。

禁忌：

- (1) 對 Flupentixol 或其賦形劑會有過敏反應之病人。
- (2) 循環性虛脫、任何原因（如酒精、巴比妥酸鹽或鴉片劑中毒）導致之中樞神經系統抑制、昏迷、惡血質、嗜鉻細胞瘤等。

注意事項：老年患者應投與最低量，肝功能受損者需小心投與，孩童不建議使用。

英文名：Fluanxol 5	學名：Flupentixol 2HCl	劑量：5mg/TAB	中文名：福祿安	健保價：25.3
橢圓形黃色標記：FK		C(AUS)	隆柏	代碼：OFL5

適應症：精神病狀態。

用法用量：起始劑量每日 3~15mg，分成 2~3 次投與，最高一天 40mg，維持劑量為每日 5~20mg。

副作用：錐體外徑症狀（可用抗帕金森氏劑治療，但不建議做為例行性之預防使用）、暈眩、失眠、口乾、疲勞。

禁忌：

- （1）對 Flupentixol 或其賦形劑會有過敏反應之病人。
- （2）循環性虛脫、任何原因（如酒精、巴比妥酸鹽或鴉片劑中毒）導致之中樞神經系統抑制、昏迷、惡血質、嗜鉻細胞瘤等。

注意事項：老年患者應投與最低量，肝功能受損者需小心投與，孩童不建議使用。

英文名：Fluanxol Inj	學名：Flupentixol decanoate	劑量：20mg/1ml	中文名：福祿安	健保價：247
透明瓶標記：Fluanxol		C	隆柏	代碼：IFL

適應症：精神病狀態。

用法用量：肌肉注射，維持劑量依據治療反應，間隔 2~4 週注射 20~40mg。

副作用：錐體外徑症狀（可用抗帕金森氏劑治療，但不建議做為例行性之預防使用）、沮喪、失眠、激躁。

禁忌：

- （1）對 Flupentixol 或其賦形劑會有過敏反應之病人。
- （2）循環性虛脫、任何原因（如酒精、巴比妥酸鹽或鴉片劑中毒）導致之中樞神經系統抑制、昏迷、惡血質、嗜鉻細胞瘤等。

注意事項：

- （1）注射用溶液：透明，無色到淺黃色的油質溶液，無懸浮微粒。
- （2）若治療劑量大於 2ml 應分兩劑於兩個部位注射。
- （3）老年患者應投與最低量，肝功能受損者需小心投與，孩童不建議使用。
- （4）口服錠劑改針劑治療：

每日口服劑量 x4=每隔兩週肌肉注射量。

每日口服劑量 x8=每隔四週肌肉注射量。

英文名：Binin-U 2	學名：Haloperidol	劑量：2mg/TAB	中文名：易寧優	健保價：1.5
圓形粉紅色標記：SWISS 2		C	瑞士	代碼：OBIU2

適應症：躁病、精神病狀態、噁心、嘔吐、攻擊性與破壞性之行為障礙、舞蹈病。

用法用量：0.5~2mg 每日 2~3 次，視病人症狀調整。每日維持劑量 4~20mg/day，最大劑量 100mg/day。

副作用：便秘、口乾、錐體外徑症狀、昏睡、靜坐不能、肌張力不全、視力模糊

禁忌：昏迷狀態者、對此藥品成分過敏者、嚴重心衰竭、巴金森氏症病患、孕婦或可能懷孕的婦女。

英文名：Binin-U 10	學名：Haloperidol	劑量：10mg/TAB	中文名：易寧優 錠	健保價：3.28
圓形水藍色標記：十字		C	瑞士	代碼：OBIU10

適應症：躁病、精神病狀態、噁心、嘔吐、攻擊性與破壞性之行為障礙、舞蹈病。

用法用量：0.5~2mg 每日 2~3 次，視病人症狀調整。每日維持劑量 4~20mg/day，最大劑量 100mg/day。

副作用：便秘、口乾、錐體外徑症狀、昏睡、靜坐不能、肌張力不全、視力模糊

禁忌：昏迷狀態者、對此藥品成分過敏者、嚴重心衰竭、巴金森氏症病患、孕婦或可能懷孕的婦女。

英文名： Haldomin	學名：Haloperidol	劑量： 200mg/100ml	中文名：煩樂平	健保價：125
		C	健康化學	代碼：OHAL

適應症：躁病、精神病狀態、噁心、嘔吐、攻擊性與破壞性之行為障礙、舞蹈病。

用法用量：每日 0.5~2.25mg，增加至每日維持劑量 3~6mg，依症狀調整。

副作用：錐體外徑症狀(僵直、靜坐不能、震顫)、遲發性的運動困難(舌下、面部、嘴或下巴不自主運動)、胃腸道不適。

禁忌：

- (1) 昏睡狀態者，已服用如 barbitals 等中樞神經抑制劑，並受其強烈影響者。
- (2) 嚴重心衰竭。
- (3) 巴金森氏症患者。
- (4) 對 butylphenone 衍生物過敏者。

注意事項：

- (1) 由肝代謝，肝病患者小心使用。
- (2) 甲狀腺亢進病人需小心 Haloperidol 毒性增加。
- (3) 抗帕金森氏症藥物可能導致眼壓上升。
- (4) 併用鋰鹽時會使藥物濃度增加，而增加錐體外徑症候群副作用，必須密切注意並且調整劑量。
- (5) 長期治療如併用酵素誘導劑如 carbamazepine、phenobarbital、抽煙等會造成 haldol 濃度下降。

英文名：Halopin	學名：Haloperidol	劑量： 0.75mg/TAB	中文名：安樂平	健保價：1.5
圓形白色無標記		C	強生	代碼：OHAL

適應症：躁病、精神病狀態、噁心、嘔吐、攻擊性與破壞性之行為障礙、舞蹈病。

用法用量：0.5~2mg 每日 2~3 次，視病人症狀調整。每日維持劑量 4~20mg/day，最大劑量 100mg/day。

副作用：便秘、口乾、錐體外徑症狀、昏睡、靜坐不能、肌張力不全、視力模糊

禁忌：昏迷狀態者、對此藥品成分過敏者、嚴重心衰竭、巴金森氏症病患、孕婦或可能懷孕的婦女。

注意事項：

英文名：Sopid	學名：Sulpiride	劑量：400mg/TAB	中文名：悠思坦	健保價：5.9
橢圓形白色標記：PM008			健亞	代碼：OSOP

適應症：精神病狀態、消化性潰瘍。

用法用量：(1) 精神分裂病：成人每日 300~600mg，分次口服。最高一天 1200mg。

(2) 消化性潰瘍：成人每日 150mg，分 3 次口服。

(3) 憂鬱病、憂鬱狀態：成人每日 300~600mg，分次口服。最高一天 600mg。

副作用：口渴、便秘、胃灼熱睡眠障礙、嗜睡、眩暈、無月經、乳汁分泌、男性女乳症、錐體外徑症狀、口渴、便秘、胃灼熱、靜坐不能。

禁忌：疑有嗜鉻性細胞瘤的患者，有可能引起血壓急遽上升。

注意事項：心血管疾病、低血壓、腎病變、高齡者應慎重給藥。

英文名：Susine	學名：Sulpiride	劑量：200mg/TAB	中文名：舒神	健保價：2.33
圓形白色標記：SSF			瑞士	代碼：OSUS

適應症：精神病狀態、消化性潰瘍。

用法用量：

(1) 精神分裂病：成人每日 300~600mg，分次口服。最高一天 1200mg。

(2) 消化性潰瘍：成人每日 150mg，分 3 次口服。

(3) 憂鬱病、憂鬱狀態：成人每日 150~300mg，分次口服。最高一天 600mg。

副作用：口渴、便秘、胃灼熱睡眠障礙、嗜睡、眩暈、無月經、乳汁分泌、男性女乳症、錐體外徑症狀。

禁忌：疑有嗜鉻性細胞瘤的患者，有可能引起血壓急遽上升。

注意事項：心血管疾病、低血壓、腎病變、高齡者應慎重給藥。

英文名：Dogmatyl	學名：Sulpiride	劑量：50mg/TAB	中文名：脫蒙治	健保價：1.66
圓形白色標記：D50			賽諾菲	代碼：ODO50

適應症：精神病狀態、消化性潰瘍。

用法用量：(1) 精神分裂病：成人每日 300~600mg，分次口服。最高一天 1200mg。

(2) 消化性潰瘍：成人每日 150mg，分 3 次口服。

(3) 憂鬱病、憂鬱狀態：成人每日 150~300mg，分次口服。最高一天 600mg。

副作用：口渴、便秘、胃灼熱睡眠障礙、嗜睡、眩暈、無月經、乳汁分泌、男性女乳症、錐體外徑症狀、口渴、便秘、胃灼熱、靜坐不能。

禁忌：疑有嗜鉻性細胞瘤的患者，有可能引起血壓急遽上升。

注意事項：心血管疾病、低血壓、腎病變、高齡者應慎重給藥。

英文名：Flurazin	學名： Trifluoperazine	劑量：5mg/TAB	中文名：富祿靜	健保價：1.5
圓扁形淺藍色 標記：JCP 5		C	強生	代碼：OFRA

適應症：精神病狀態、噁心、嘔吐、攻擊性與破壞性之行為障礙。

用法用量：1 次 1~5mg，1 天 2 次，最高一天 40mg。

副作用：錐體外徑症狀(僵直、靜坐不能、震顫)、眩暈、口乾。

禁忌：曾對任一種 phenothiazine 產生過敏者，此藥亦會過敏。

注意事項：

- (1) 會排泄到乳汁，哺乳之婦女應小心評估。
- (2) 酒精中毒、骨髓抑制、心血管疾病、青光眼、肝功能障礙等使用此藥應小心考慮。

第二代抗精神病劑

英文名：Solian 50 (原廠)	學名：Amisulpride	劑量：50mg/TAB	中文名：首立安	健保價：11.1
圓形白色標記：AMI50			賽諾菲	代碼：OSOL50

適應症：精神分裂症。

用法用量：

(1) 正性症狀：成人一天口服劑量 400~800mg，最高每天 1200mg。負性症狀：一天口服劑量 50~300mg。

(2) 400mg 以下可以一天給藥一次，若劑量高於 400mg 則應分成一天二次投與。

副作用：

- (1) 錐體外症狀、失眠、焦慮、激躁不安、體重增加。
- (2) 高劑量時出現鎮靜及嗜睡、中度的姿態性低血壓。

禁忌：

- (1) 嗜鉻性細胞瘤患者。
- (2) 會激發泌乳激素之腫瘤患者，例如腦下腺泌乳激素及乳癌。
- (3) 15 歲以下的兒童及授乳婦。

注意事項：極罕見有 QT 波延長現象及有乳糖不耐症患者應小心使用。

英文名：Superide	學名：Amisulpride	劑量：200mg/TAB	中文名：思必樂	健保價：25.9
圓形白色標記：SK 213			景德	代碼：OSUPE

適應症：精神分裂症。

用法用量：

(1) 正性症狀：成人一天口服劑量 400~800mg，最高每天 1200mg。負性症狀：一天口服劑量 50~300mg。

(2) 400mg 以下可以一天給藥一次，若劑量高於 400mg 則應分成一天二次投與。

副作用：

- (1) 錐體外症狀、失眠、焦慮、激躁不安、體重增加。
- (2) 高劑量時出現鎮靜及嗜睡、中度的姿態性低血壓。

禁忌：

- (1) 嗜鉻性細胞瘤患者。

(2) 會激發泌乳激素之腫瘤患者，例如腦下腺泌乳激素及乳癌。

(3) 15 歲以下的兒童及授乳婦。

注意事項：極罕見有 QT 波延長現象及有乳糖不耐症患者應小心使用。

英文名：Solian 200 (原廠)	學名：Amisulpride	劑量：200mg/TAB	中文名：首立安	健保價：30.7
圓形白色標記：AMI200			賽諾菲	代碼：OSOL

適應症：精神分裂症。

用法用量：

(1) 正性症狀：成人一天口服劑量 400~800mg，最高每天 1200mg。負性症狀：一天口服劑量 50~300mg。

(2) 400mg 以下可以一天給藥一次，若劑量高於 400mg 則應分成一天二次投與。

副作用：(1) 錐體外症狀、失眠、焦慮、激躁不安、體重增加。(2) 高劑量時出現鎮靜及嗜睡、中度的姿態性低血壓。

禁忌：

(1) 嗜鉻性細胞瘤患者。

(2) 會激發泌乳激素之腫瘤患者，例如腦下腺泌乳激素及乳癌。

(3) 15 歲以下的兒童及授乳婦。

注意事項：極罕見有 QT 波延長現象及有乳糖不耐症患者應小心使用。

英文名： Aripiprazole15	學名：Aripiprazole	劑量：15mg/TAB	中文名：阿立批 挫錠	健保價：69
圓形黃色標記：GBL/106		C	健亞	代碼：OAR15

適應症：成人和青少年(13 至 17 歲)的精神分裂症。

用法用量：精神分裂症：起始劑量每天一次 10~15mg，不需配合進餐服用。藥效達到穩定狀態需要 2 週。

副作用：噁心、嘔吐、便秘、頭痛、暈眩、靜坐不能、焦慮、失眠、焦躁不安。

禁忌：對 Aripiprazole 成分過敏者。

注意事項：

(1) 成人一般不須依年齡、性別、種族、腎或肝功能受損的狀態來調整劑量。

(2) 服用此藥的女性不要哺餵母乳。

(3) 須注意直立性低血壓及血糖過高。

英文名： Aripiprazole-Zydus	學名： Aripiprazole	劑量：10mg/TAB	中文名：安若寧	健保價：82
長型白色標記：ZE4		C	Cadila	代碼：OARZ10

適應症：成人和青少年 (13 至 17 歲)的精神分裂症。

用法用量：精神分裂症：起始劑量每天一次 10~15mg，不需配合進餐服用。藥效達到穩定狀態需要 2 週。

副作用：噁心、嘔吐、便秘、頭痛、暈眩、靜坐不能、焦慮、失眠、焦躁不安。

禁忌：對 Aripiprazole 成分過敏者。

注意事項：

- (1) 成人一般不須依年齡、性別、種族、腎或肝功能受損的狀態來調整劑量。
- (2) 服用此藥的女性不要哺餵母乳。
- (3) 須注意直立性低血壓及血糖過高。

英文名：Abilify 5 (原廠)	學名：Aripiprazole	劑量：5mg/TAB	中文名：安立復	健保價 44.8
橢圓形藍色標記：A-009 5		C	大塚	代碼：OAB5

適應症：成人和青少年(13 至 17 歲)的精神分裂症。成人和兒童(10 至 17 歲)的雙極性疾患之躁症發作及混合型發作，可單獨使用或做為鋰鹽或 Valproate 的輔助治療。第一型雙極性疾患維持治療之鋰鹽或 valproate 的輔助治療。重鬱症之輔助治療。兒童(6 至 17 歲)的自閉性疾患伴隨之急躁易怒。

用法用量：

- (1) 精神分裂症：起始劑量每天一次 10~15mg，不需配合進餐服用。藥效達到穩定狀態需要 2 週。
- (2) 雙極性疾患：起始劑量每天一次 15mg，搭配鋰鹽或 valproate 的輔助治療，起始劑量為 10~15mg/day。每日最高 30mg。10~17 歲兒童起始劑量為 2mg/day，2 日後調至 5mg，再 2 日後調至目標劑量 10mg。
- (3) 重鬱症之輔助治療：起始劑量每天一次 2~5mg，最高 15mg。
- (4) 6~17 歲兒童自閉性疾患之急躁易怒：同雙極性治療兒童劑量。

副作用：噁心、嘔吐、便秘、頭痛、暈眩、靜坐不能、焦慮、失眠、焦躁不安。

禁忌：對 Aripiprazole 成分過敏者。

注意事項：

- (1) 成人一般不須依年齡、性別、種族、腎或肝功能受損的狀態來調整劑量。
- (2) 服用此藥的女性不要哺餵母乳。
- (3) 須注意直立性低血壓及血糖過高。

英文名：Abilify 15 (原廠)	學名：Aripiprazole	劑量：15mg/TAB	中文名：安立復	健保價：83
圓形黃色標記：A-009 15		C	大塚	代碼：OAB15

適應症：成人和青少年(13 至 17 歲)的精神分裂症。成人和兒童(10 至 17 歲)的雙極性疾患之躁症發作及混合型發作，可單獨使用或做為鋰鹽或 Valproate 的輔助治療。第一型雙極性疾患維持治療之鋰鹽或 valproate 的輔助治療。重鬱症之輔助治療。兒童(6 至 17 歲)的自閉性疾患伴隨之急躁易怒。

用法用量：

- (1) 精神分裂症：起始劑量每天一次 10~15mg，不需配合進餐服用。藥效達到穩定狀態需要 2 週。
- (2) 雙極性疾患：起始劑量每天一次 15mg，搭配鋰鹽或 valproate 的輔助治療，起始劑量為 10~15mg/day。每日最高 30mg。10~17 歲兒童起始劑量為 2mg/day，2 日後調至 5mg，再 2 日

後調至目標劑量 10mg。

(3) 重鬱症之輔助治療：起始劑量每天一次 2~5mg，最高 15mg。

(4) 6~17 歲兒童自閉性疾患之急躁易怒：同雙極性治療兒童劑量。

副作用：噁心、嘔吐、便秘、頭痛、暈眩、靜坐不能、焦慮、失眠、焦躁不安。

禁忌：對 Aripiprazole 成分過敏者。

注意事項：

(1) 成人一般不須依年齡、性別、種族、腎或肝功能受損的狀態來調整劑量。

(2) 服用此藥的女性不要哺餵母乳。

(3) 須注意直立性低血壓及血糖過高。

英文名：Clozaril 100 (原廠)	學名：Clozapine	劑量：100mg/TAB	中文名：可致律	健保價：10.7
圓形黃色標記：ZA SANDOZ		B	諾華	代碼：OCZ100

適應症：

(1) 其他藥物治療失效的精神分裂症病患。

(2) 降低精神分裂症或情感性分裂症的復發性自殺行為。

(3) 帕金森氏症期間的精神疾病。

用法用量：

(1) 初次治療：起始劑量一天 1~2 次 12.5mg，第二天 1~2 次 25mg。14~21 天最高劑量為 300mg。

(2) 大部分病人對一天 300~450mg 有反應，最高劑量 900mg。

(3) 達到最佳治療效果，很多患者能以較低的劑量有效維持，可逐漸減少劑量。

(4) 治療至少須持續六個月，如果每日劑量不超過 200mg 時，可在傍晚一次投與。

副作用：鎮靜、心跳過快、便秘、流口水、顆粒性白血球缺乏、體重增加、姿勢性低血壓、抗膽鹼性作用、尿滯留、疲勞。

禁忌：

(1) 有嚴重顆粒性白血球缺乏症病史、骨髓功能受損者。

(2) 嚴重肝、腎或心臟疾患。

(3) 對 Clozapine 過敏及無法定期接受抽血檢查者。

注意事項：

(1) 每日超過 450mg 易誘發癲癇發作。

(2) 監測 WBC：前 18 週每週抽血一次，18 週後每月抽血一次。

(3) 須注意直立性低血壓及血糖過高。

英文名：Zapine	學名：Clozapine	劑量：100mg/TAB	中文名：來特平	健保價：8.9
圓形黃色標記：ST 364		B	信東	代碼：OZAP

適應症：其他藥物治療失效的精神分裂症病患。

用法用量：

(1) 初次治療：起始劑量一天 1~2 次 12.5mg，第二天 1~2 次 25mg。14~21 天最高劑量為 300mg。

(2) 大部分病人對一天 300~450mg 有反應，最高劑量 900mg。

(3) 達到最佳治療效果，很多患者能以較低的劑量有效維持，可逐漸減少劑量。

(4) 治療至少須持續六個月，如果每日劑量不超過 200mg 時，可在傍晚一次投與。

副作用：鎮靜、心跳過快、便秘、流口水、顆粒性白血球缺乏、體重增加、姿勢性低血壓、抗膽鹼性作用、尿滯留、疲勞。

禁忌：

- (1) 有嚴重顆粒性白血球缺乏症病史、骨髓功能受損者。
- (2) 嚴重肝、腎或心臟疾患。
- (3) 對 Clozapine 過敏及無法定期接受抽血檢查者。

注意事項：

- (1) 每日超過 450mg 易誘發癲癇發作。
- (2) 監測 WBC：前 18 週每週抽血一次，18 週後每月抽血一次。
- (3) 須注意直立性低血壓及血糖過高。

英文名：Mezapin	學名：Clozapine	劑量：25mg/TAB	中文名：可洛拉平	健保價：4.2
圓形黃色標記：C25		B	強生	代碼：OMEZ25

適應症：其他藥物治療失效的精神分裂症病患。

用法用量：

- (1) 初次治療：起始劑量一天 1~2 次 12.5mg，第二天 1~2 次 25mg。14~21 天最高劑量為 300mg。
- (2) 大部分病人對一天 300~450mg 有反應，最高劑量 900mg。
- (3) 達到最佳治療效果，很多患者能以較低的劑量有效維持，可逐漸減少劑量。
- (4) 治療至少須持續六個月，如果每日劑量不超過 200mg 時，可在傍晚一次投與。

副作用：鎮靜、心跳過快、便秘、流口水、顆粒性白血球缺乏、體重增加、姿勢性低血壓、抗膽鹼性作用、尿滯留、疲勞。

禁忌：

- (1) 有嚴重顆粒性白血球缺乏症病史、骨髓功能受損者。
- (2) 嚴重肝、腎或心臟疾患。
- (3) 對 Clozapine 過敏及無法定期接受抽血檢查者。

注意事項：

- (1) 每日超過 450mg 易誘發癲癇發作。
- (2) 監測 WBC：前 18 週每週抽血一次，18 週後每月抽血一次。
- (3) 須注意直立性低血壓及血糖過高。

英文名： Olanzapine-Waka □溶錠	學名：Olanzapine	劑量：10mg/TAB	中文名：歐蘭薩平	健保價：109
圓形黃色雙平面錠標記：—		C	Torrent	代碼：OOLW

適應症：精神分裂症及其他明顯有正性或負性之精神病、雙極性疾患之躁期發作、預防雙極性疾患之復發。

用法用量：

- (1) 精神分裂症：起始劑量每天一次，每次 10mg。

(2) 雙極性疾患及躁期發作：單一治療起始劑量每天一次，每次 15mg；合併治療之起始劑量為每天 10mg。

(3) 老年病患：65 歲以上起始劑量 5mg/day。

(4) 腎及/或肝功能不全之病患：起始劑量 5mg/day

(5) 可依病患之臨床狀況調整，劑量範圍為每天 5~20mg。給藥間隔不得小於 24 小時。

副作用：嗜睡、體重增加（10%）、頭暈、食慾亢進、手足水腫、姿態性低血壓、口乾及便秘（1~10%）。

禁忌：(1) 對 Olanzapine 內之任何成分已知會引起過敏反應者。(2) 狹角性青光眼疾患。

注意事項：口溶錠易碎，取出後應立即服用。可溶於水中或合適的飲料中(柳丁汁、蘋果汁、牛奶或咖啡)。

英文名：Nodoff	學名：Olanzapine	劑量：5mg/TAB	中文名：納得復	健保價：56
圓形白色標記：SW NOF		C	瑞士	代碼：ONOD

適應症：精神分裂症及其他明顯有正性或負性之精神病、雙極性疾患之躁期發作、預防雙極性疾患之復發。

用法用量：

(1) 精神分裂症：起始劑量每天一次，每次 10mg。

(2) 雙極性疾患及躁期發作：單一治療起始劑量每天一次，每次 15mg；合併治療之起始劑量為每天 10mg。

(3) 老年病患：65 歲以上起始劑量 5mg/day。

(4) 腎及/或肝功能不全之病患：起始劑量 5mg/day。

(5) 可依病患之臨床狀況調整，劑量範圍為每天 5~20mg。給藥間隔不得小於 24 小時。

副作用：嗜睡、體重增加（10%）、頭暈、食慾亢進、手足水腫、姿態性低血壓、口乾及便秘（1~10%）。

禁忌：(1) 對 Olanzapine 內之任何成分已知會引起過敏反應者。(2) 狹角性青光眼疾患。

注意事項：服用藥此藥物可能引起嗜睡及眩暈，故操作機械須格外小心。

英文名：Zydis 口 溶錠	學名：Olanzapine	劑量：10mg/TAB	中文名：津普速	健保價：131
圓形黃色		C	禮來	代碼：OZYZ

適應症：精神分裂症及其他明顯有正性及/或負性之精神病，雙極性疾患之躁期發作，預防雙極性疾患之復發。

用法用量：(1) 起始劑量每天一次，每次 10mg。可憑病患之臨床狀況調整，劑量範圍為每天 5~20mg。

(2) 老年病患：65 歲以上起始劑量 5mg/day。

(3) 腎及/或肝功能不全之病患：起始劑量 5mg/day

(4) 口溶錠可置於口中或者將它分散在水中服用。

副作用：嗜睡、體重增加（10%）、頭暈、食慾亢進、手足水腫、姿態性低血壓、口乾及便秘（1~10%）。

禁忌：(1) 對 Olanzapine 內之任何成分已知會引起過敏反應者。(2) 狹角性青光眼疾患。

注意事項：(1) 本品對光線敏感，應將藥錠保存於原包裝中，存放於乾燥處。(2) 口溶錠由包裝取出後應立刻服用。

英文名：Olzapine 10	學名：Olanzapine	10mg/TAB	中文名：雙復明	健保價：109
圓形白色無標記		C	意欣	代碼：OOL

適應症：精神分裂症及其他明顯有正性或負性之精神病、雙極性疾患之躁期發作、預防雙極性疾患之復發。

用法用量：

- (1) 起始劑量每天一次，每次 10mg。可憑病患之臨床狀況調整，劑量範圍為每天 5~20mg。
- (2) 老年病患：65 歲以上起始劑量 5mg/day。
- (3) 腎及/或肝功能不全之病患：起始劑量 5mg/day
- (4) 口溶錠可置於口中或者將它分散在水中服用。

副作用：嗜睡、體重增加 (10%)、頭暈、食慾亢進、手足水腫、姿態性低血壓、口乾及便秘 (1~10%)。

禁忌：(1) 對 Olanzapine 內之任何成分已知會引起過敏反應者。(2) 狹角性青光眼疾患。

注意事項：本品對光線敏感，應將藥錠保存於原包裝中，存放於乾燥處。

英文名：Olan 5 口溶錠	學名：Olanzapine	5mg/TAB	中文名：若寧	健保價：67
黃色圓形標記：5		C	中化	代碼：OOLA

適應症：精神分裂症及其他明顯有正性或負性之精神病、雙極性疾患之躁期發作、預防雙極性疾患之復發。

用法用量：

- (1) 起始劑量每天一次，每次 10mg。可憑病患之臨床狀況調整，劑量範圍為每天 5~20mg。
- (2) 老年病患：65 歲以上起始劑量 5mg/day。
- (3) 腎及/或肝功能不全之病患：起始劑量 5mg/day
- (4) 口溶錠可置於口中或者將它分散在水中服用。

副作用：嗜睡、體重增加 (10%)、頭暈、食慾亢進、手足水腫、姿態性低血壓、口乾及便秘 (1~10%)。

禁忌：(1) 對 Olanzapine 內之任何成分已知會引起過敏反應者。(2) 狹角性青光眼疾患。

注意事項：口溶錠由包裝取出後應立刻服用。

英文名：Zyprexa 5 (原廠)	學名：Olanzapine	5mg/TAB	中文名：金普薩	健保價：68
圓形白色標記：LILLY 4115		C	禮來	代碼：OZY

適應症：精神分裂症及其他明顯有正性或負性之精神病、雙極性疾患之躁期發作、預防雙極性疾患之復發。

用法用量：

- (1) 起始劑量每天一次，每次 10mg。可憑病患之臨床狀況調整，劑量範圍為每天 5~20mg。

- (2) 老年病患：65 歲以上起始劑量 5mg/day。
- (3) 腎及/或肝功能不全之病患：起始劑量 5mg/day
- (4) 口溶錠可置於口中或者將它分散在水中服用。

副作用：嗜睡、體重增加（10%）、頭暈、食慾亢進、手足水腫、姿態性低血壓、口乾及便秘（1~10%）。

禁忌：(1) 對 Olanzapine 內之任何成分已知會引起過敏反應者。(2) 狹角性青光眼疾患。

注意事項：本品對光線敏感，應將藥錠保存於原包裝中，存放於乾燥處。

英文名：Invega 6 (原廠)	學名： Paliperidone	6mg/TAB	中文名：思維佳	健保價：147
圓柱形黃色標記：PAL 6		C	嬌生	代碼：OIN6

適應症：精神分裂症。

用法用量：建議劑量為每日一次 3~12mg，在早晨投與，劑量高於 6mg/day 時必須經過臨床上的重新評估。最大劑量為 12mg/day。

副作用：顫動、上腹痛。

禁忌：對 paliperidone、risperidone 成份過敏者。

注意事項：(1) 會增加具有老年癡呆性精神病老年患者之死亡率。(2) 須注意直立性低血壓及血糖過高。

英文名：Invega 3 (原廠)	學名： Paliperidone	3mg/TAB	中文名：思維佳	健保價：82
圓柱形白色標記：PAL 3		C	嬌生	代碼：OIN3

適應症：精神分裂症。

用法用量：建議劑量為每日一次 3~12mg，在早晨投與，劑量高於 6mg/day 時必須經過臨床上的重新評估。最大劑量為 12mg/day。

副作用：顫動、上腹痛。

禁忌：對 paliperidone、risperidone 成份過敏者。

注意事項：(1) 會增加具有老年癡呆性精神病老年患者之死亡率。(2) 須注意直立性低血壓及血糖過高。

英文名：Seroquel 100 (原廠)	學名：Quetiapine	100mg/TAB	中文名：思樂康	健保價：29.1
圓形黃色標記：Seroquel100		C	ASTRA	代碼：OSEQ

適應症：精神分裂症、雙極性疾患之躁症發作。

用法用量：Day1 50mg，Day2 100mg，Day3 200mg，Day4 300mg。第四天後，劑量逐漸調整至每日 300~450mg 的一般有效劑量。每日劑量通常在 150~750mg。

副作用：嗜睡、眩暈、便秘、口乾、體重增加、姿態性低血壓。

禁忌：對 Quetiapine 成份過敏者。

注意事項：(1) 服用此藥的女性不要哺餵母乳。(2) 空腹與食物併服均可。(3) 須注意直立性低血壓及血糖過高。

英文名： Neuroquel 100	學名：Quetiapine	100mg/TAB	中文名：腦樂靜	健保價：25.9
圓形黃色標記：Neuroquel 100		C	強生	代碼：ONEU

適應症：精神分裂症、雙極性疾患之躁症發作。

用法用量：Day1 50mg，Day2 100mg，Day3 200mg，Day4 300mg。第四天後，劑量逐漸調整至每日 300~450mg 的一般有效劑量。每日劑量通常在 150~750mg。

副作用：嗜睡、眩暈、便秘、口乾、體重增加、姿態性低血壓。

禁忌：對 Quetiapine 成分過敏者。

注意事項：(1) 服用此藥的女性不要哺餵母乳。(2) 空腹與食物併服均可。(3) 須注意直立性低血壓及血糖過高。

英文名：Qeutialin 200	學名：Quetiapine	200mg/TAB	中文名：喜樂平	健保價：34.9
圓形白色標記：SK 211		C	景德	代碼：OQUT200

適應症：精神分裂症、雙極性疾患之躁症發作。

用法用量：Day1 50mg，Day2 100mg，Day3 200mg，Day4 300mg。第四天後，劑量逐漸調整至每日 300~450mg 的一般有效劑量。每日劑量通常在 150~750mg。

副作用：嗜睡、眩暈、便秘、口乾、體重增加、姿態性低血壓。

禁忌：對 Quetiapine 成分過敏者。

注意事項：(1) 服用此藥的女性不要哺餵母乳。(2) 空腹與食物併服均可。(3) 須注意直立性低血壓及血糖過高。

英文名： Apo-Quetiapine	學名：Quetiapine	劑量：300mg/TAB	中文名：安保思 樂	健保價：58
長橢圓形白色標記 APO/ QUE300		C	Apotex	代碼：OAQU

適應症：精神分裂症、雙極性疾患之躁症發作。

用法用量：Day1 50mg，Day2 100mg，Day3 200mg，Day4 300mg。第四天後，劑量逐漸調整至每日 300~450mg 的一般有效劑量。每日劑量通常在 150~750mg。

副作用：嗜睡、眩暈、便秘、口乾、體重增加、姿態性低血壓。

禁忌：對 Quetiapine 成分過敏者。

注意事項：(1) 服用此藥的女性不要哺餵母乳。(2) 空腹與食物併服均可。(3) 須注意直立性低血壓及血糖過高。

英文名：Quetialin 25	學名：Quetiapine	劑量：25mg/TAB	中文名：喜樂平	健保價：13.4
圓形磚紅標記：SK 210		C	景德	代碼：OQUT25

適應症：精神分裂症、雙極性疾患之躁症發作。

用法用量：Day1 50mg，Day2 100mg，Day3 200mg，Day4 300mg。第四天後，劑量逐漸調整至每日 300~450mg 的一般有效劑量。每日劑量通常在 150~750mg。

副作用：嗜睡、眩暈、便秘、口乾、體重增加、姿態性低血壓。

禁忌：對 Quetiapine 成分過敏者。

注意事項：(1) 服用此藥的女性不要哺餵母乳。(2) 空腹與食物併服均可。(3) 須注意直立性低血壓及血糖過高。

英文名：Seroquel XR 50 (原廠)	學名：Quetiapine	劑量：50mg/TAB	中文名：思樂康	健保價：25.8
長橢圓形棕紅色標記：XR50		C	ASTRA	代碼：OSEQ50

適應症：精神分裂症、雙極性疾患之鬱症發作、躁症發作或混合發作。

用法用量：精神分裂急性治療：起始劑量 300mg/day，調至 400~800mg/day。大於 800mg 安全性尚未臨床評估。雙極性鬱症：Day1 50mg、Day2 100mg、Day3 200mg、Day4 300mg 晚上服用。

雙極性躁症或混合發作：Day1 300mg、Day2 600mg、Day3 400~800mg 晚上服用。

副作用：嗜睡、眩暈、便秘、口乾、體重增加、姿態性低血壓。

禁忌：對 Quetiapine 成分過敏者。

注意事項：(1) 服用此藥的女性不要哺餵母乳。(2) 空腹與食物併服均可。(3) 須注意直立性低血壓及血糖過高。

英文名：Seroquel XR 200 (原廠)	學名：Quetiapine	劑量：200mg/TAB	中文名：思樂康	健保價：49.7
長橢圓形淡黃色標記：XR200		C	ASTRA	代碼：OSEX200

適應症：精神分裂症、雙極性疾患之鬱症發作、躁症發作或混合發作。

用法用量：精神分裂急性治療：起始劑量 300mg/day，調至 400~800mg/day。大於 800mg 安全性尚未臨床評估。雙極性鬱症：Day1 50mg、Day2 100mg、Day3 200mg、Day4 300mg 晚上服用。

雙極性躁症或混合發作：Day1 300mg、Day2 600mg、Day3 400~800mg 晚上服用。

副作用：嗜睡、眩暈、便秘、口乾、體重增加、姿態性低血壓。

禁忌：對 Quetiapine 成分過敏者。

注意事項：(1) 服用此藥的女性不要哺餵母乳。(2) 空腹與食物併服均可。(3) 須注意直立性低血壓及血糖過高。

英文名：Seroquel XR 300 (原廠)	學名：Quetiapine	劑量：300mg/TAB	中文名：思樂康	健保價：66
長橢圓形鵝黃色標記：XR300		C	ASTRA	代碼：OSEX300

適應症：精神分裂症、雙極性疾患之鬱症發作、躁症發作或混合發作。

用法用量：精神分裂急性治療：起始劑量 300mg/day，調至 400~800mg/day。大於 800mg 安全性尚未臨床評估。雙極性鬱症：Day1 50mg、Day2 100mg、Day3 200mg、Day4 300mg 晚上服用。

雙極性躁症或混合發作：Day1 300mg、Day2 600mg、Day3 400~800mg 晚上服用。

副作用：嗜睡、眩暈、便秘、口乾、體重增加、姿態性低血壓。

禁忌：對 Quetiapine 成分過敏者。

注意事項：(1) 服用此藥的女性不要哺餵母乳。(2) 空腹與食物併服均可。(3) 須注意直立性低血壓及血糖過高。

英文名：Spiterin	學名：Risperidone	劑量：1mg/TAB	中文名：思特寧	健保價：15.5
長型白色標記：SK 1		C	景德	代碼：OSPI

適應症：精神分裂症之相關症狀、雙極性疾患之躁症發作。

用法用量：精神分裂症：成人 2mg/day 開始，可在第二天增至 4mg，最佳劑量 4~6mg/day，劑量超過 10mg/day 可能導致錐體外徑症狀。劑量>16mg/day 安全性尚未評估。老人起始劑量 0.5mg bid。失智症混亂行為：0.25mg bid，可是症狀增加劑量。雙極性疾患之躁症：起始劑量 2~3mg/day，每日 1~6mg 彈性劑量可觀察到療效。

副作用：體重增加、便秘、噁心、口乾、靜坐不能、月經不調。

禁忌：對 Risperidone 成分過敏者。

注意事項：須注意直立性低血壓及血糖過高。

英文名：Risperdal 1 (原廠)	學名：Risperidone	劑量：1mg/TAB	中文名：理思必妥	健保價：15.5
長橢圓形白色標記：Ris1		C	嬌生	代碼：ORIS

適應症：精神分裂症之相關症狀、雙極性疾患之躁症發作、治療失智症病人具嚴重攻擊性或精神分裂症類似症狀。

用法用量：精神分裂症：成人 2mg/day 開始，可在第二天增至 4mg，最佳劑量 4~6mg/day，劑量超過 10mg/day 可能導致錐體外徑症狀。劑量>16mg/day 安全性尚未評估。老人起始劑量 0.5mg bid。失智症混亂行為：0.25mg bid，可是症狀增加劑量。雙極性疾患之躁症：起始劑量 2~3mg/day，每日 1~6mg 彈性劑量可觀察到療效。

副作用：體重增加、便秘、噁心、口乾、靜坐不能、月經不調。

禁忌：對 Risperidone 成分過敏者。

注意事項：須注意直立性低血壓及血糖過高。

英文名：Risperdal 2 (原廠)	學名：Risperidone	劑量：2mg/TAB	中文名：理思必妥	健保價：18.6
長橢圓形白色標記：Ris2		C	嬌生	代碼：ORIS2

適應症：精神分裂症之相關症狀、雙極性疾患之躁症發作、治療失智症病人具嚴重攻擊性或精神分裂症類似症狀。

用法用量：精神分裂症：成人 2mg/day 開始，可在第二天增至 4mg，最佳劑量 4~6mg/day，劑量超過 10mg/day 可能導致錐體外徑症狀。劑量>16mg/day 安全性尚未評估。老人起始劑量 0.5mg bid。失智症混亂行為：0.25mg bid，可是症狀增加劑量。雙極性疾患之躁症：起始劑量 2~3mg/day，每日 1~6mg 彈性劑量可觀察到療效。

副作用：體重增加、便秘、噁心、口乾、靜坐不能、月經不調。

禁忌：對 Risperidone 成分過敏者。

注意事項：須注意直立性低血壓及血糖過高。

英文名：	學名：Risperidone	劑量：2mg/TAB	中文名：鴻汶理	健保價：18.6
------	----------------	------------	---------	----------

Apa-Risdol 2			思得 2	
長橢圓形白色標記：Ris2 W.WIN	C		健亞	代碼：OR12

適應症：精神分裂症之相關症狀、雙極性疾患之躁症發作；治療失智症病人具嚴重攻擊性，或精神分裂症類似症狀。

用法用量：起始劑量 2mg/day，可在第二天增至 4mg，大部分病人最適劑量為 4~6mg/day，超過 10mg/day 時療效未必優於較低劑量且可能導致錐體外徑症狀。尚未評估>16mg/day 劑量的安全性，請勿超過此劑量。

副作用：失眠、躁動不安、焦慮、頭痛、體重增加。

禁忌：對 Risperidone 成分過敏者。

注意事項：須注意直立性低血壓及血糖過高。

英文名：Risperdal Oral Sol'n	學名：Risperidone	劑量：30mg/30ml	中文名：理思必 妥	健保價：790
白色瓶身標記：Risperdal	C		嬌生	代碼：ORISS

適應症：精神分裂症之相關症狀、雙極性疾患之躁症發作、治療失智症病人具嚴重攻擊性或精神分裂症類似症狀。

用法用量：精神分裂症：成人 2mg/day 開始，可在第二天增至 4mg，最佳劑量 4~6mg/day，劑量超過 10mg/day 可能導致錐體外徑症狀。劑量>16mg/day 安全性尚未評估。老人起始劑量 0.5mg bid。失智症混亂行為：0.25mg bid，可是症狀增加劑量。雙極性疾患之躁症：起始劑量 2~3mg/day，每日 1~6mg 彈性劑量可觀察到療效。

副作用：體重增加、便秘、噁心、口乾、靜坐不能、月經不調。

禁忌：對 Risperidone 成分過敏者。

注意事項：(1) 禁忌與茶併用。(2) 所附滴管刻度最小體積為 0.25ml，最大體積為 3ml，每 0.25ml 為一個刻度。開封後勿冷藏。

英文名： Apo-Risperidone Solution	學名： Risperidone	劑量： 30mg/30ml	中文名：安 保瑞 思得	健保價：675
棕色瓶身標記：Apo-Risperidone	C		APOTEX	代碼：OARS

適應症：精神分裂症之相關症狀、雙極性疾患之躁症發作、治療失智症病人具嚴重攻擊性或精神分裂症類似症狀。

用法用量：精神分裂症：成人 2mg/day 開始，可在第二天增至 4mg，最佳劑量 4~6mg/day，劑量超過 10mg/day 可能導致錐體外徑症狀。劑量>16mg/day 安全性尚未評估。老人起始劑量 0.5mg bid。失智症混亂行為：0.25mg bid，可是症狀增加劑量。雙極性疾患之躁症：起始劑量 2~3mg/day，每日 1~6mg 彈性劑量可觀察到療效。

副作用：體重增加、便秘、噁心、口乾、靜坐不能、月經不調。

禁忌：對 Risperidone 成分過敏者。

注意事項：(1) 禁忌與茶併用。(2) 所附滴管刻度最小體積為 0.25ml，最大體積為 3ml，每 0.25ml 為一個刻度。

英文名： Risperidal Consta 25 inj	學名：Risperidone	劑量：25mg/Syn	中文名：維思通	健保價：3260
透明針筒		C	嬌生	代碼：IRIS

適應症：急慢性精神分裂症之精神病及其他有明顯活性症狀和/或負性症狀的精神異常狀況。亦可減輕精神分裂產生之情感症狀。可合併鋰鹽及 Valproate 預防快速循環型雙極性疾患之復發。單獨使用於非快速循環型之第一型雙極性疾患病患維持治療，以預防狂躁或混合型復發。
用法用量：每兩週使用一次，使用適當之安全針注射深層三角肌或臀部肌肉。不可靜脈注射。最大劑量每兩週 50mg。

副作用：靜坐不能、顫抖、口乾等。

禁忌：對此藥品成分過敏者。

注意事項：含緩釋粉末及懸浮稀釋劑，稀釋後為透明、無色之水性溶液。

英文名： Risperidal Consta 37.5inj	學名：Risperidone	劑量：37.5mg/Syn	中文名：維思通	健保價：4355
透明針筒		C	嬌生	代碼：IRIS37

適應症：急慢性精神分裂症之精神病及其他有明顯活性症狀和/或負性症狀的精神異常狀況。亦可減輕精神分裂產生之情感症狀。可合併鋰鹽及 Valproate 預防快速循環型雙極性疾患之復發。單獨使用於非快速循環型之第一型雙極性疾患病患維持治療，以預防狂躁或混合型復發。
用法用量：每兩週使用一次，使用適當之安全針注射深層三角肌或臀部肌肉。不可靜脈注射。最大劑量每兩週 50mg。

副作用：靜坐不能、顫抖、口乾等。

禁忌：對此藥品成分過敏者。

注意事項：含緩釋粉末及懸浮稀釋劑，稀釋後為透明、無色之水性溶液。

英文名：Geodon	學名：Ziprasidone	劑量：60mg/TAB	中文名：哲思	健保價：45.6
白色膠囊標記：Pfizer ZDX60		C	輝瑞	代碼：OGEO

適應症：精神分裂症、雙極性疾患之躁症發作及在雙極性疾患躁症發作(Bipolar I disorder)之維持治療中作為鋰鹽或 valproate 的輔助療法。

用法用量：起始劑量 40mg 每天 2 次，隨餐服用。最高劑量 80mg 每天 2 次。

副作用：嗜睡、靜坐不能、頭昏、噁心。

禁忌：(1) 對 ziprasidone 或任何賦形劑過敏者。(2) QT 波延長者禁用。

注意事項：(1) 肝功能不全患者應考慮使用較低的劑量。(2) 須注意直立性低血壓及血糖過高。

英文名：Lodopin 25	學名：Zotepine	劑量：25mg/TAB	中文名：絡篤平	健保價：7.1
圓形白色標記：621		C	安斯泰來	代碼：OLO25

適應症：精神分裂症。

用法用量：一日 75~150mg，分次口服，最高劑量每日 450mg。

副作用：嗜睡、無力倦怠感、失眠、口渴、便秘、眩暈。

禁忌：(1)對於昏睡狀態的患者，有使昏睡狀態惡化的現象。(2)正在服用 adrenaline 的患者。
(3)對 Phenothiazine 類化合物有過敏症的患者。

注意事項：老年人易引起錐體外徑症狀，需慎重給藥。孕婦或可能懷孕婦女最好不要給藥，服用此藥的女性不要哺餵母乳。

英文名：Zonin	學名：Zotepine	劑量：50mg/TAB	中文名：柔靈平	健保價：11.4
圓形白色標記：50		C	瑞士	代碼：OZON

適應症：精神分裂症。

用法用量：一日 75~150mg，分次口服，最高劑量每日 450mg。

副作用：嗜睡、無力倦怠感、失眠、口渴、便秘、眩暈。

禁忌：(1)對於昏睡狀態的患者，有使昏睡狀態惡化的現象。(2)正在服用 adrenaline 的患者。
(3)對 Phenothiazine 類化合物有過敏症的患者。

注意事項：老年人易引起錐體外徑症狀，需慎重給藥。孕婦或可能懷孕婦女最好不要給藥，服用此藥的女性不要哺餵母乳。

英文名：Lodopin 50	學名：Zotepine	劑量：50mg/TAB	中文名：絡篤平	健保價：13.1
圓形白色標記：651		C	安斯泰來	代碼：OLO

適應症：精神分裂症。

用法用量：一日 75~150mg，分次口服，最高劑量每日 450mg。

副作用：嗜睡、無力倦怠感、失眠、口渴、便秘、眩暈。

禁忌：(1)對於昏睡狀態的患者，有使昏睡狀態惡化的現象。(2)正在服用 adrenaline 的患者。
(3)對 Phenothiazine 類化合物有過敏症的患者。

注意事項：老年人易引起錐體外徑症狀，需慎重給藥。孕婦或可能懷孕婦女最好不要給藥，服用此藥的女性不要哺餵母乳。

抗憂鬱劑(Antidepressants)

MAOI

英文名：Eutac	學名： Moclobemide	劑量：150mg/TAB	中文名：憂停	健保價：2.53
橢圓形淡黃橙色標記：ST,150			信東	代碼：OEUT

適應症：憂鬱症。

用法用量：

- (1) 憂鬱症：每日 300~600mg，分成 2~3 次服用。
- (2) 老年人及腎功能不佳的患者，服用本藥時劑量並不需特別調整。
- (3) 肝代謝功能嚴重不全的患者，減為標準劑量的 1/2 或 1/3，即可達一般正常血漿藥物濃度。

副作用：睡眠障礙、頭痛、躁動、焦慮、口乾、腹瀉、便秘、暈眩、噁心，嘔吐、極少的患者會產生意識混亂，停藥後現象很快會消失。

禁忌：與含有 tyramine 食物併用可能引起血壓升高、易誘導躁症及對本藥產生過敏反應、急性意識混亂狀態的病患。

注意事項：不建議用於兒童病患。

NaSSA

英文名：Mirtan	學名：Mirtazapine	劑量：30mg/TAB	中文名：邁坦	健保價：16.9
橢圓形紅棕色標記：UN411/UNION		C	保瑞	代碼：OMIR30

適應症：鬱症。

用法用量：起始劑量為每日 15mg。依臨床需要，每日劑量通常介於 15~45mg 之間，建議晚上服用。老年推薦劑量與成人相同。

副作用：體重增加、鎮靜、口乾、暈眩、便秘、低血壓、夜夢。

禁忌：(1) 對 Mirtazapine 成分產生過敏的病患。(2) 禁止同時使用 MAOI。

注意事項：避免從事需高警覺性和注意力集中的危險性工作。

英文名： Apa-Mirtazapine O.D.T.	學名： Mirtazapine	劑量：30mg/TAB	中文名：緩憂	健保價：21.2
圓形白色標記：APA 30		C	健亞	代碼：OAMIR

適應症：鬱症。

用法用量：起始劑量為每日 15 或 30mg。每日劑量通常介於 15~45mg 之間，建議晚上服用。老年推薦劑量與成人相同。最大劑量 45mg/day。

副作用：體重增加、鎮靜、口乾、暈眩、便秘、低血壓、夜夢。

禁忌：(1) 對 Mirtazapine 成分產生過敏的病患。(2) 禁止同時使用 MAOI。

注意事項：

- (1) 避免從事需高警覺性和注意力集中的危險性工作。
- (2) 哺乳婦女不建議使用。

(2) 須用乾手將藥錠取出置於舌上，可用或不用水一起吞下。

NDRI

英文名：Betetrim S.R.	學名：Bupropion	劑量：150mg/TAB	中文名：倍得舒	健保價：19.7
圓形深藕紫色標記：B47		C	瑞士	代碼：OBET

適應症：憂鬱症、治療尼古丁依賴性，作為戒煙之輔助。

用法用量：

(1) 憂鬱症：初期一天 150mg、最高一天 300mg。單次劑量不可超過 150mg，超過 150mg/day 時，須分兩次給藥。

(2) 戒煙：每日 150mg，服用三天，增加到 150mg 每日二次，最高一天 300mg。至少必須治療七週，如無明顯進步就需停藥。

副作用：口乾、便秘、噁心、厭食、流汗、紅疹、血壓升高、失眠、震顫、注意力障礙、頭痛、頭暈。

禁忌：(1) 對 Bupropion 成份過敏者。(2) 禁用於癲癇患者。(3) 不可與 MAOIs 同時使用。停用 MAOIs 後至少必須相隔 14 天才可使用 Wellbutrin。

注意事項：應整粒吞服，不可切、壓碎或嚼碎。

英文名： Wellbutrin XL	學名：Bupropion	劑量：150mg/TAB	中文名：威克倦	健保價：24
圓形白色標記：GS 5FV		C	GSK	代碼：OWEX

適應症：治療憂鬱症。

用法用量：憂鬱症：初期一天 150mg 每日一次，晨間服用、單次最高 300mg。連續兩次劑量之間至少需間隔 24 小時。

副作用：口乾、便秘、噁心、厭食、流汗、紅疹、血壓升高、失眠、震顫、注意力障礙、頭痛、頭暈。

禁忌：(1) 對 Bupropion 成份過敏者。(2) 禁用於癲癇患者。(3) 不可與 MAOIs 同時使用。停用 MAOIs 後至少必須相隔 14 天才可使用 Wellbutrin。

注意事項：整粒吞服，不可切、壓碎或嚼碎，因可能增加不良反應之風險。

SNRIs

英文名：Cymbalta 60 (原廠)	學名：Duloxetine	劑量：60mg/CAP	中文名：千憂解	健保價：47.3
藍白色膠囊標記：LILLY 9542		C	禮來	代碼：OCY

適應症：重鬱症、糖尿病周邊神經痛、廣泛性焦慮症。

用法用量：

(1) 重鬱症：最初 20mg 一天二次，最高一天 60mg，病情需要最多可達 120mg。

(2) 廣泛性焦慮症：最初 30mg 一天一次，最高一天 60mg。維持劑量 60~120mg/day。

(3) 糖尿病周邊神經痛：60mg/day 一天一次。

副作用：噁心、腹瀉、鎮靜、口乾、便秘、食欲降低、頭暈、失眠、出汗、尿滯留、性功能障

礙。

禁忌：

- (1) 對 Duloxetine 成份過敏者。
- (2) 不可與 MAOIs 同時使用。
- (3) 未控制之狹角性青光眼的病患應避免服用 Duloxetine
- (4) 少有肝毒性，應注意肝功能指數。

英文名：Cymbalta 30 (原廠)	學名：Duloxetine	劑量：30mg/CAP	中文名：千憂解	健保價：27
藍白色膠囊標記：LILLY 9543		C	禮來	代碼：OCYM

適應症：重鬱症、糖尿病周邊神經痛、廣泛性焦慮症。

用法用量：

- (1) 重鬱症：最初 30mg 一天二次，最高一天 60mg，病情需要最多可達 120mg。
- (2) 神經痛與肌肉纖維痛：最初 30mg 一天一次，最高一天 60mg。

副作用：噁心、腹瀉、鎮靜、口乾、便秘、食欲降低、頭暈、失眠、出汗、尿滯留、性功能障礙。

禁忌：

- (1) 對 Duloxetine 成份過敏者。
- (2) 不可與 MAOIs 同時使用。
- (3) 未控制之狹角性青光眼的病患應避免服用 Duloxetine
- (4) 少有肝毒性，應注意肝功能指數。

英文名：Duxetine 30	學名：Duloxetine	劑量：30mg/CAP	中文名：萬憂停	健保價：27
藍白色膠囊標記：CCP B77		C	中化	代碼：ODUX

適應症：重鬱症、糖尿病周邊神經痛、廣泛性焦慮症。

用法用量：重鬱症：最初 20mg 一天二次，最高一天 60mg，病情需要最多可達 120mg。糖尿病周邊神經痛：60mg/day 一天一次。

副作用：噁心、腹瀉、鎮靜、口乾、便秘、食欲降低、頭暈、失眠、出汗、尿滯留、性功能障礙。

禁忌：

- (1) 對 Duloxetine 成份過敏者。
- (2) 不可與 MAOIs 同時使用。
- (3) 未控制之狹角性青光眼的病患應避免服用 Duloxetine
- (4) 少有肝毒性，應注意肝功能指數。

英文名： Apa-Cymba 60	學名：Duloxetine	劑量：60mg/TAB	中文名：欣樂	健保價：41.9
藍綠膠囊無標記		C	鴻汶	代碼：OCYA

適應症：重鬱症、糖尿病周邊神經痛。

用法用量：(1) 重鬱症：起始劑量 40~60mg/day，急性治療目標劑量：40mg/day (20mg 一天 2 次)至 60mg/day (60mg 一天 1 次或 30mg 一天 2 次) 維持治療目標劑量：60mg/day。病情需要最多可達 120mg。(2) 糖尿病周邊神經痛：60mg/day 一天一次。

副作用：噁心、口乾、嗜睡、便秘、食慾降低、多汗。

禁忌：

- (1) 對 Duloxetine 成份過敏者。
- (2) 不可與 MAOIs 同時使用。
- (3) 未控制之狹角性青光眼的病患應避免服用 Duloxetine
- (4) 少有肝毒性，應注意肝功能指數。

英文名：Milpran	學名：Milnacipran	劑量：50mg/CAP	中文名：解鬱優	健保價：10.6
橘紅色膠囊標記：PM21		C	衛達	代碼：OMIL

適應症：重型憂鬱症。

用法用量：一天兩次，每次 50mg。

副作用：口乾、噁心、失眠、心悸、躁動、尿液滯留、ADH 分泌失調 (SIADH)、性功能障礙、頭疼、鎮靜、激動、下痢、便秘。

禁忌：(1) 對 Milnacipran 過敏者。(2) 懷孕及授乳期禁用。(3) 勿與 clonidine 及 MAOI 併用。

英文名：Efexor XR 75 (原廠)	學名：Venlafaxine	劑量：75mg/CAP	中文名：速悅	健保價：20
粉紅色膠囊標記：W75		C	輝瑞	代碼：OEFXR

適應症：鬱症、泛焦慮症、社交焦慮症、恐慌症。

用法用量：(1) 起始劑量為每一天 37.5mg，依臨床需要，每日劑量可增加至 75mg，調整時間不得低於四天。最高劑量可增加至每天 375mg，和食物一起吞服。

(2) 鬱症：75~225 mg。泛焦慮症：150~225 mg。

副作用：口乾、噁心、失眠、鎮靜、躁動、食慾減少、出汗、虛弱、ADH 分泌失調 (SIADH)、性功能障礙、頭疼、鎮靜、激動、低血鈉、下痢、高劑量引起血壓上升。

禁忌：(1) 已知會對 Venlafaxine 成分產生過敏的病患。(2) 同時服用單胺氧化酵素抑制劑 (MAOIs) 的病患。

注意事項：定期監測血壓。

英文名：Easyfor SR	學名：Venlafaxine	劑量：75mg/CAP	中文名：悅康	健保價：19.6
粉色膠囊標記：N.K.P. 476		C	南光	代碼：OEASY

適應症：鬱症、泛焦慮症、社交焦慮症、恐慌症。

用法用量：(1) 起始劑量為每一天 37.5mg，依臨床需要，每日劑量可增加至 75mg，調整時間不得低於四天。最高劑量可增加至每天 375mg，和食物一起吞服。

(2) 鬱症：75~225 mg。

泛焦慮症：150~225 mg。

副作用：口乾、噁心、失眠、鎮靜、躁動、食慾減少、出汗、虛弱、ADH 分泌失調 (SIADH)、

性功能障礙、頭疼、鎮靜、激動、低血鈉、下痢、高劑量引起血壓上升。

禁忌：(1)已知會對 Venlafaxine 成分產生過敏的病患。(2)同時服用單胺氧化酵素抑制劑(MAOIs)的病患。

注意事項：(1) 定期監測血壓。(2) 整顆吞服，不得剝半、咬碎、咀嚼或放入水中，可撥開膠囊，將內容物搭配開水一起吞服

英文名：Faxine	學名：Venlafaxine	劑量： 37.5mg/TAB	中文名：樂心	健保價：8.6
五角形膚色標記：37.5/MM		C	健亞	代碼：OFA

適應症：適用於治療憂鬱症(depression)，包括鬱症 (melancholia)。

用法用量：起始劑量為每一天 37.5mg，依臨床需要，每日劑量可增加至 75mg，調整時間不得低於四天。最高劑量可增加至每天 375mg，分三次給與，和食物一起吞服。

副作用：口乾、噁心、失眠、鎮靜、躁動、食慾減少、出汗、虛弱、ADH 分泌失調 (SIADH)、性功能障礙、頭疼、鎮靜、激動、低血鈉、下痢、高劑量引起血壓上升。

禁忌：(1)已知會對 Venlafaxine 成分產生過敏的病患。(2)同時服用單胺氧化酵素抑制劑(MAOIs)的病患。

注意事項：定期監測血壓。

SSRIs

英文名：Ultidep 20	學名：Citalopram	劑量：20mg/TAB	中文名：樂憂平	健保價：15.7
橢圓形白色標記：剝半刻痕		C	Cadila	代碼：OULT

適應症：鬱症之治療及預防復發、恐慌症。

用法用量：每日 20mg，最高劑量 60mg。超過 65 歲老年人：每日最高劑量 20mg。

副作用：頭痛、多汗、口乾、噁心、思睡等。

禁忌：(1) 先天性 QT 間隔延長症狀。(2) 與 MAOI 併服者。

注意事項：(1) 同時服用 Cimetidine 之患者，每日最大劑量 20mg。(2) 如需使用 MAOI 者，citalopram 停藥 7 天後才可投予。

英文名：Lepax	學名： Escitalopram	劑量：10mg/TAB	中文名：得緒安	健保價：21
橢圓形白色標記：LE		C	隆柏	代碼：OLEP

適應症：鬱症之治療及預防復發，恐慌症、社交焦慮症、泛焦慮症及強迫症之治療。

用法用量：成年人：一天一次，每次 10mg，最高劑量每日 20mg。超過 65 歲老年人：常用劑量減半投予。

副作用：口乾、噁心、失眠、多汗症、性功能失調、腸胃不適、震顫。

禁忌：

- (1) 對 Escitalopram 成分過敏者。
- (2) 不可與 MAOIs 併用。
- (3) 不可與 pimozide 併用。

(4) 先天性 QT 間隔延長症候群。

注意事項：與高劑量 cimetidine 同時服用，會造成本藥之血中濃度上升。

英文名： Escitalopram-Zydus	學名： Escitalopram	劑量：10mg/TAB	中文名：釋心憂	健保價：19.4
圓形白色標記：ZC 23		C	Cadila	代碼：OESZ

適應症：憂鬱症之治療及預防復發。

用法用量：成年人：一天一次，每次 10mg，最高劑量每日 20mg。超過 65 歲老年人：常用劑量減半投予。

副作用：口乾、噁心、失眠、多汗症、性功能失調、腸胃不適、震顫。

禁忌：

- (1) 對 Escitalopram 成分過敏者。
- (2) 不可與 MAOIs 併用。
- (3) 不可與 pimozone 併用。
- (4) 先天性 QT 間隔延長症候群。

注意事項：與高劑量 cimetidine 同時服用，會造成本藥之血中濃度上升。

英文名：Escipro	學名： Escitalopram	劑量：20mg/TAB	中文名：易適普	健保價：37.6
橢圓形白色標記：DT		C	鼎泰	代碼：OESC

適應症：憂鬱症之治療及預防復發。

用法用量：成年人：一天一次，每次 10mg，最高劑量每日 20mg。超過 65 歲老年人：常用劑量減半投予。

副作用：口乾、噁心、失眠、多汗症、性功能失調、腸胃不適、震顫。

禁忌：

- (1) 對 Escitalopram 成分過敏者。
- (2) 不可與 MAOIs 併用。
- (3) 不可與 pimozone 併用。

注意事項：與高劑量 cimetidine 同時服用，會造成本藥之血中濃度上升。

英文名：Kinxetin	學名：Fluoxetine	劑量：20mg/CAP	中文名：抗憂佳	健保價：2.77
綠白膠囊標記：KDM G-5359		C	景德	代碼：OKIX

適應症：抑鬱症、暴食症、強迫症。

用法用量：一天最高劑量為 80mg。

- (1) 憂鬱症：每日服用 20mg。
- (2) 暴食症：每日服用 60mg。
- (3) 強迫症：每日服用 20~60mg。

副作用：口乾，減少食慾、噁心、腹瀉、焦慮、激動、失眠、鎮靜、疲勞、頭痛、震顫、頭暈、性功能障礙及冒汗。

禁忌：(1) 不可與 MAOIs 併用。

注意事項：肝或腎功能損害，癲癇或有相關疾病病史、糖尿病、哺乳婦女小心使用。

英文名：Luvox(原廠)	學名：Fluvoxamine	劑量：50mg/TAB	中文名：無鬱寧	健保價：11.5
圓形白色標記：291		C	亞培	代碼：OLU

適應症：重度憂鬱症及強迫症。

用法用量：憂鬱症每日 100~200mg，最高 300mg/day。強迫症每日 100~300mg。每日劑量大於 150mg 建議分 2~3 次給予。

副作用：噁心、嘔吐、失眠、鎮靜、便秘、性功能失調、腸胃不適、口乾、精神激動、厭食、顫抖。副作用通常在治療期間兩週內逐漸消失。

禁忌：(1) 不可與 MAOIs 併用。(2) 不可與 thioridazine、pimozide 併用。

注意事項：(1) 服用此藥的女性不要哺餵母乳。(2) 肝功能不全者應以低劑量開始服用。

英文名：Lote	學名：Fluvoxamine	劑量：100mg/TAB	中文名：樂得	健保價：26.9
長橢圓形黃紅色標記：NK 403		C	南光	代碼：OLOT

適應症：情緒性症狀（持續性情緒低落、精神功能傷害及精神異常等）。

用法用量：憂鬱症每日 100~200mg、強迫症每日 100~300mg、社交焦慮症 100~300mg，初期建議劑量每日 100mg，最好在晚間投與，最高劑量每日 300mg，劑量超過 150mg 可分 2~3 次投予。

副作用：噁心、嘔吐、失眠、鎮靜、便秘、性功能失調、腸胃不適、口乾、精神激動、厭食、顫抖。副作用通常在治療期間兩週內逐漸消失。

禁忌：(1) 不可與 MAOIs 併用。(2) 不可與 thioridazine、pimozide 併用。

注意事項：(1) 服用此藥的女性不要哺餵母乳。(2) 肝功能不全者應以低劑量開始服用。

英文名：Seroxat(原廠)	學名：Paroxetine	劑量：20mg/TAB	中文名：克憂果	健保價：10.6
橢圓形白色標記：20			GSK	代碼：OSEX

適應症：各種類型鬱症及鬱症伴隨焦慮症之症狀治療及預防復發、強迫症之症狀治療、恐慌症之症狀治療及預防復發、社交恐懼症（社交焦慮症）之治療、泛焦慮症之症狀治療及預防復發(GAD)、創傷後壓力症候群之治療(PTSD)。

用法用量：

(1) 鬱症：建議劑量每日 20~50mg，逐漸增加劑量，每次增加 10mg，最高每日 50mg。

(2) 恐慌症：最初劑量每日 10mg，逐漸增加劑量，每次增加 10mg，最高每日 60mg。

(3) 社交恐懼症（社交焦慮症）：最初劑量每日 20 mg，逐漸增加劑量，每次增加 10mg，最高每日 60mg。

副作用：噁心、頭痛、鎮靜、流汗、震顫、無力、口乾、失眠和性功能障礙、頭暈、激動、下痢、便秘。

禁忌：(1) 對本品有過敏反應者。(2) 不可與 thioridazine、pimozide、tamoxifen 併用。

注意事項：(1) 懷孕及哺乳婦女不應使用。(2) 肝腎功能不佳建議劑量每日 20mg。

英文名：Xet	學名：Paroxetine	劑量：20mg/TAB	中文名：抗特慮	健保價：10.6
橢圓形白色標記：剝半刻痕			Cadila	代碼：OX

適應症：各種類型鬱症及鬱症伴隨焦慮症之症狀治療及預防復發、強迫症之症狀治療、恐慌症之症狀治療及預防復發、社交恐懼症（社交焦慮症）之治療、泛焦慮症之症狀治療及預防復發（GAD）、創傷後壓力症候群之治療(PTSD)。

用法用量：

- (1) 鬱症：建議劑量每日 20~50mg，逐漸增加劑量，每次增加 10mg，最高每日 50mg。
- (2) 恐慌症：最初劑量每日 10mg，逐漸增加劑量，每次增加 10mg，最高每日 60mg。
- (3) 社交恐懼症（社交焦慮症）：最初劑量每日 20 mg，逐漸增加劑量，每次增加 10mg，最高每日 60mg。

副作用：噁心、頭痛、鎮靜、流汗、震顫、無力、口乾、失眠和性功能障礙、頭暈、激動、下痢、便秘。

禁忌：(1) 對本品有過敏反應者。(2) 不可與 thioridazine 併用。(2) 不可與 MAOI 併用，或在 MAOI 停用兩週內使用。

英文名：Kinloft	學名：Sertraline	劑量：50mg/TAB	中文名：抗憂服	健保價：11.7
橢圓形白色標記：SK/200		C	景德	代碼：OKI

適應症：鬱症、強迫性、恐慌症、創傷後壓力症候群、社交恐懼症。

用法用量：常用劑量一天 50mg~200mg。

憂鬱和 OCD：一天最初劑量 50mg 至最大劑量 200mg

恐慌、PTSD、社交恐懼症：一天最初劑量 25mg 至最大劑量 200mg。

副作用：

- (1) 胃腸道：口乾，減少食慾、噁心、腹瀉、便秘。
- (2) 中樞神經系統：激動、失眠、鎮靜、疲勞、頭痛、震顫、頭暈。
- (3) 性功能障礙及冒汗、少有低血鈉（大部份發生於老人）。

禁忌：(1) 不可和 MAOI 併服。(2) 對 Sertraline 成分過敏的病人。(3) 不可與 thioridazine、pimozide 併用。

英文名：Zoloft(原廠)	學名：Sertraline	劑量：50mg/TAB	中文名：樂復得	健保價：11.7
長橢圓形白色標記：Pfizer ZLT50		C	輝瑞	代碼：OZO

適應症：鬱症、強迫症、恐慌症、創傷後壓力症候群(PTSD)及社交恐懼症及經前不悅症。

用法用量：常用劑量一天 50mg~200mg。

憂鬱和 OCD：一天最初劑量 50mg 至最大劑量 200mg

恐慌、PTSD、社交恐懼症：一天最初劑量 25mg 至最大劑量 200mg。

副作用：

- (1) 胃腸道：口乾，減少食慾、噁心、腹瀉、便秘。
- (2) 中樞神經系統：激動、失眠、鎮靜、疲勞、頭痛、震顫、頭暈。
- (3) 性功能障礙及冒汗、少有低血鈉（大部份發生於老人）。

禁忌：(1) 不可和 MAOI 併服。(2) 對 Sertraline 成分過敏的病人。(3) 不可與 thioridazine、pimozide 併用。

TCA

英文名：Clopran	學名： Clomipramine	劑量：25mg/TAB	中文名：可必安	健保價：2.7
圓形白色無標記		C	瑞士	代碼：OCL

適應症：憂鬱症。

用法用量：每日 50~100mg，分 1~3 次服用。

副作用：口渴、食慾減退、血壓下降、頻脈、排尿困難、眼內壓亢進、視調節障礙、便秘。

禁忌：(1) 青光眼患者。(2) 對三環類抗憂鬱劑過敏者。

注意事項：癲癇患者須小心使用。

英文名：Colian	學名：Doxepin	劑量：25mg/CAP	中文名：可立安	健保價：2.05
藍色膠囊無標記		C	強生	代碼：OCOL

適應症：焦慮狀態、憂鬱病。

用法用量：輕到中度每日可由 75mg 開始。正常劑量範圍 75~150mg/day，每次最大劑量 300mg。症狀輕微病人每日 25~50mg。本藥屬長效型藥物，一日劑量可一次投予或分次給藥，單次給藥最大劑量為 150mg，可在睡前給藥。150mg 只可作為持續治療劑量。

副作用：口乾、視力模糊、便秘、尿滯留、倦睡(持續治療後會消失)、噁心、嘔吐。

禁忌：(1) 對本藥品過敏者。(2) 青光眼或尿滯留患者，特別是老年人。

注意事項：(1) 本藥可能產生倦睡情形，如需操作危險機械或開車之患者需注意。(2) 正接受其他抗膽鹼藥物治療患者需注意小劑量調整劑量。

英文名：Tofranil	學名：Imipramine	劑量：25mg/TAB	中文名：妥富腦	健保價：22
圓形咖啡色無標記		D	聯亞	代碼：OTOF

適應症：憂鬱症、夜尿。

用法用量：

(1) 憂鬱症：初期 25mg，一天三次，逐漸增加劑量到 50mg，一天 3-4 次。維持劑量：一天 50~100mg。門診病患最大劑量 200mg/day，住院病患最大劑量 300mg/day。

(2) 兒童夜尿：>6 歲 25mg 睡前 1 小時服用。一週後無明顯療效：<12 歲每晚 50mg;>12 歲每晚 75mg。每日劑量不可超過 2.5mg/kg。

副作用：口乾、便秘、流汗、面潮紅、視力失調、視覺模糊。

禁忌：已知對三環抗憂鬱劑過敏者、心肌梗塞危急者。

注意事項：

- (1) 心血管功能不全、房室阻斷、心律不整的病人。
- (2) 有狹角性青光眼的病人。
- (3) 排尿異常的病人。
- (4) 痙攣閾值低的病人。

其他

英文名：Valdoxan (原廠)	學名： Agomelatine	劑量：25mg/TAB	中文名：煩多閃	健保價：37.3
橢圓形土黃色標記：藍色圖樣		B1(AUS)	施維雅	代碼：OVALD

適應症：成人重鬱症。

用法用量：每日 25mg 睡前服用，治療兩週後，若症狀沒有改善時，可增加至每天 50mg 睡前服用。

副作用：

- (1) 口乾、便秘、噁心、厭食、流汗。
- (2) 紅疹、血壓升高。
- (3) 失眠、震顫、注意力障礙、頭痛、頭暈。

禁忌：對此藥品成分過敏者、肝功能不全者，特別是肝硬化或肝轉胺酶指數超過 3 倍正常值者、不可併用 CYP1A2 強抑制劑者(如 fluvoxamine)

注意事項：不建議用於 18 歲以下。75 歲以上老人尚未有證據證明。

英文名：Deanxit (原廠)	學名：Flupentixol 0.5mg Melitracen 10mg	劑量：	中文名：得安緒	健保價：3.08
圓形粉紅色無標記		C(AUS)	隆柏	代碼：ODE

適應症：焦慮、憂鬱症。

用法用量：(1) 成人一日兩錠，早上及中午服用；如病情較重，早上劑量可增加為兩錠。(2) 老年病人：早上服一錠。

副作用：偶有不安和失眠。

禁忌：未治療的狹角性青光眼、急性酒精、巴比妥及鴉片類中毒。

注意事項：(1) 之前服用有鎮靜作用之精神安定劑，應慢慢減量。(2) 孕婦和授乳時不宜使用。

英文名：Denset	學名：Flupentixol 0.5mg Melitracen 10mg	劑量：	中文名：得原緒	健保價：3.08
圓形桃紅色無標記		C(AUS)	保瑞	代碼：ODEN

適應症：焦慮、憂鬱症。

用法用量：(1) 成人一日兩錠，早上及中午服用；如病情較重，早上劑量可增加為兩錠。(2) 老年病人：早上服一錠。

副作用：暫時性偶有不安和失眠。

禁忌：未治療的狹角性青光眼、急性酒精、巴比妥及鴉片類中毒。心肌梗塞恢復期。

注意事項：(1) 之前服用有鎮靜作用之精神安定劑，應慢慢減量。(2) 孕婦和授乳時不宜使用。

英文名：Trazone	學名：Trazodone	劑量：100mg/TAB	中文名：暢鬱舒	健保價：4.14
圓形白色十字刻痕		C	信東	代碼：OTZ

適應症：治療各種型態之抑鬱症。

用法用量：初期一天 150mg，每隔 3~4 天可增加 50mg，最高一天 300~400mg。嚴重憂鬱症：最高一天 600mg，分次投與。

副作用：

- (1) 常出現鎮靜、思睡和低血壓作用，通常持續治療後消失。
- (2) 頭暈、頭痛、噁心和嘔吐、倦怠、震顫、口乾、偶爾有心搏過慢（長期使用）、低血壓、便秘、視覺模糊、水腫、皮膚疹。
- (3) 過量：思睡、嘔吐、呼吸停止、痙攣、EKG 改變、曾有陰莖異常勃起的報告。

禁忌：對 Trazodone 過敏者禁用。嚴重肝功能障礙。

注意事項：

- (1) 建議病人陰莖異常勃起，超過一小時以上時須尋求醫療幫助。
- (2) 可能有低血壓狀況發生，併用降血壓藥物需調整劑量。
- (3) 嚴重憂鬱症患者可能會有自殺傾向。

英文名： Cirazodone	學名：Trazodone	劑量：50mg/TAB	中文名：杏緩妥	健保價： 1.93
圓形橘色標記：SP371		C	杏輝	代碼：OCIR

適應症：治療各種型態之抑鬱症。

用法用量：初期一天 150mg，每隔 3~4 天可增加 50mg，最高一天 300~400mg。嚴重憂鬱症：最高一天 600mg，分次投與。

副作用：

- (1) 常出現鎮靜、思睡和低血壓作用，通常持續治療後消失。
- (2) 頭暈、頭痛、噁心和嘔吐、倦怠、震顫、口乾、偶爾有心搏過慢（長期使用）、低血壓、便秘、視覺模糊、水腫、皮膚疹。
- (3) 過量：思睡、嘔吐、呼吸停止、痙攣、EKG 改變、曾有陰莖異常勃起的報告。

禁忌：對 Trazodone 過敏者禁用。嚴重肝功能障礙。

注意事項：

- (1) 建議病人陰莖異常勃起，超過一小時以上時須尋求醫療幫助。
- (2) 可能有低血壓狀況發生，併用降血壓藥物需調整劑量。
- (3) 嚴重憂鬱症患者可能會有自殺傾向。

抗膽鹼激素藥物(Anticholinergic drugs)

英文名：Atropine inj	學名：Atropine sulfate	劑量：1mg/ml/AMP	中文名：硫酸阿托品	健保價：15
		C	台裕	代碼：IATP

適應症：胃潰瘍、幽門痙攣、胃液、唾液分泌過多、神經過敏性夜間盜汗、減緩小腸張力及結腸運動、眼科放大瞳孔、副交感神經興奮劑之中毒，十二指腸潰瘍。

用法用量：皮下肌肉及靜脈注射，每次成人 0.25mg~1mg，每日 1~3 次。

副作用：口乾、視力模糊、心跳快速、心悸、尿路滯留、便秘等。

禁忌：白內障、前列腺肥大症、排尿障礙、心臟病、幽門狹窄症、麻痺性腸閉塞等患者，不可應用本劑。有過敏性者應立即中止用藥。

注意事項：本劑由胎盤可進入胎兒體內或母乳中亦有分泌，故妊娠及授乳之母應慎重應用本劑。

英文名：B.H.L. 5	學名：Trihexyphenidyl	劑量：5mg/TAB	中文名：顛立靜	健保價：1.5
圓形白色標記：BHL 5		C	中化	代碼：OBHL

適應症：帕金森氏症候群。

用法用量：

(1) 帕金森氏症：最初一天 1mg，之後每隔 3~5 天增加為 2mg，維持劑量一天 6~10mg，腦炎後帕金森氏症：一天 12~15mg。常用維持劑量 5~15mg/day 分 3~4 次。併用 Levodopa：一天 3~6mg，分 3 次服用。

(2) 治療因藥品引起的錐體外反應：開始劑量 1mg，在幾小時內視症狀來調整劑量。一般劑量：一天 5~15mg 分 3~4 次服用。

副作用：噁心、口乾、視覺模糊、緊張、嗜睡、尿滯留

禁忌：青光眼（尤其是閉角性青光眼）、腸阻塞、狹窄性消化道潰瘍、前列腺肥大。

注意事項：嚴重口乾，以致吞嚥或說話困難，喪失食慾或體重減輕，應降低劑量或調整。

抗躁症劑(Antimanic)

英文名：Lilitin	學名：Lithium carbonate	劑量：300mg/TAB	中文名：鋰利靜	健保價：1.23
圓形白色標記：YH LI		D	利達	代碼：OLIL

適應症：躁病、預防躁鬱症。

用法用量：急性：每日劑量 900~1800mg，分次給藥。有效血中濃度：1.0~1.5mEq/L。長期：血中濃度 0.6~1.2mEq/L，一般劑量為 900~1200mg/day，分次給予。

副作用：噁心、嘔吐、多尿、口渴、顫抖、運動失調、耳鳴。副作用的發生及嚴重度通常與血中鋰濃度及個人敏感度有關。

- (1) 血中鋰濃度在 1.5mEq/L 以下時極少發生副作用。
- (2) 1.5~2.5mEq/L 時發生輕度至中度中毒反應：腹瀉嘔吐、倦睡及肌肉無力。
- (3) 2.0~2.5mEq/L 時發生中度至重度中毒反應：眩暈運動失調、視野模糊、耳鳴及多尿。
- (4) 大於 3.0mEq/L：造成多重器官的臨床症狀。

禁忌：嚴重心、腎臟疾病、脫水、鈉的排空、痴呆、懷孕期間及老年人不使用。

注意事項：

- (1) 至少每兩個月監測血中濃度：1.0~1.5mEq/L。
- (2) 急性躁症開始治療時可能發生手部輕微震顫、多尿症及輕微口渴，開始治療的幾天會有暫時及輕微的噁心及身體不適，繼續治療或暫時降低劑量均可使這些副作用消除，若持續則可能須停止鋰治療。
- (3) Thiazides 和一些 NSAIDs 將增加鋰鹽的血中濃度。

抗驚厥劑(Anticonvulsants)

英文名：Tegol	學名： Carbamazepine	劑量：200mg/TAB	中文名：癲妥	健保價： 2.79
圓形白色標記：YS TEG		D	優生	代碼：OTEG

適應症：癲癇症、雙極性疾患、腎原性尿崩症、三叉神經痛。

用法用量：

- (1) 癲癇：成人及 12 歲以上兒童的起始劑量 200mg，一天兩次。維持劑量 800~1200mg。
- (2) 三叉神經痛：每日起始劑量 200mg~400mg，每 12 小時增加 100mg，直至疼痛緩解，然後慢慢減量至足以克服疼痛做為維持劑量。
- (3) 腎原性尿崩症：成人平均劑量 200mg 每天 2~3 次。
- (4) 雙極性疾患：每天 400~1600mg，一般是每天 400~600mg 分 2~3 次投與。

副作用：

- (1) 治療初期：頭昏眼花、嗜睡、嘔吐、噁心、頭痛、腹瀉、運動失調、良性白血球減少(短暫)。
- (2) 一般紅斑性麻疹或更嚴重時，須取消治療。例如：光敏感性反應、蕁麻疹、Stevens-Johnson 症狀產生的紅斑。

禁忌：對 Carbamazepine 過敏者，心臟房室阻斷的病人。有骨髓抑制病史的病患請勿使用。勿和 MAOI 一起使用。

注意事項：有嚴重心臟疾病或肝腎功能異常及老年人，需注意劑量調整。

英文名：Carbatin	學名：Gabapentin	劑量：300mg/CAP	中文名：康立定	健保價： 8.3
黃色膠囊標記：N.K.P. 485		C	南光	代碼：OCAB

適應症：治療成人及三歲以上兒童局部癲癇發作之輔助療法。帶狀疱疹後神經痛。

用法用量：起始劑量每日三次，每次 300mg，有效劑量為每日 900~1800mg。

副作用：嗜眠、暈眩、運動失調、倦怠及眼球震顫。

禁忌：對 Gabapentin 過敏者。

注意事項：若要停藥或添加某一替換的抗癲癇藥品時，應在至少一週之中逐漸進行。

英文名：Lamictal 50 (原廠)	學名：Lamotrigine	劑量：50mg/TAB	中文名：樂命達	健保價： 16.7
圓形乳黃色標記：50 GSEE1		C	GSK	代碼：OLAMI

適應症：癲癇(泛發性強直陣攣性發作及簡單性或複雜性局部發作)、雙極性疾患之鬱期治療、雙極性疾患之鬱期、Type I 型之維持治療。

用法用量：

- (1) 躁鬱症單獨治療：初期一天一次 25mg，持續兩週。接著一天一次 50mg，持續兩週。隨後增加劑量，每 1~2 週增加 50~100mg。一般維持劑量 100~200mg/day，分成每日 1 或 2 次服用。
- (2) 躁鬱症併 Valproate：初期隔天一次 25mg，持續兩週。接著一天 25mg，持續兩週。隨後增加劑量，每 1~2 週增加 25~50mg。一般維持劑量 100~200mg/day，分成每日 1 或 2 次服用。

副作用：皮膚疹、噁心、視力模糊、昏眩、頭痛、疲勞。

禁忌：對此藥品成分過敏者。

注意事項：(1) 小孩及肝、腎功能不全之病人避免使用。(2) 服用 Lamotrigine 不宜開車或從事危險性的工作。

英文名：Lamictal 100 (原廠)	學名：Lamotrigine	劑量：100mg/TAB	中文名：樂命達	健保價：26.2
圓形乳黃色標記：100 GSEE5		C	GSK	代碼：OLAL

適應症：癲癇(泛發性強直陣攣性發作及簡單性或複雜性局部發作)、雙極性疾患之鬱期治療、雙極性疾患之鬱期、Type I 型之維持治療。

(1) 躁鬱症單獨治療：初期一天一次 25mg，持續兩週。接著一天一次 50mg，持續兩週。隨後增加劑量，每 1~2 週增加 50~100mg。一般維持劑量 100~200mg/day，分成每日 1 或 2 次服用。

(2) 躁鬱症併 Valproate：初期隔天一次 25mg，持續兩週。接著一天 25mg，持續兩週。隨後增加劑量，每 1~2 週增加 25~50mg。一般維持劑量 100~200mg/day，分成每日 1 或 2 次服用。

副作用：皮膚疹、噁心、視力模糊、昏眩、頭痛、疲勞。

禁忌：對此藥品成分過敏者。

注意事項：(1) 小孩及肝、腎功能不全之病人避免使用。(2) 服用 Lamotrigine 不宜開車或從事危險性的工作。

英文名：Dilantin (原廠)	學名：Phenytoin	劑量：100mg/CAP	中文名：癲能停	健保價：1.5
橘白膠囊標記：PD100		D	輝瑞	代碼：ODPH

適應症：大發作及局部發作形癲癇，預防及治療神經外科手術所引起之癲癇發作。

用法用量：初劑量 100mg，一天三次。一般維持劑量 100mg，每日 2~3 次。

副作用：毛髮增多、失眠、便秘、肌肉顫抖、噁心、頭痛等，較嚴重的話，可能會有流鼻血、行動笨拙、牙齦增生等。

禁忌：特別對 Hydantoins 系化合物過敏症之患者不要使用此藥。

注意事項：需與食物或牛奶同時服用或餐後立即服用以減少胃腸刺激。孕婦不宜，也不要親自哺乳。

英文名：L.A.	學名：Phenytoin 50mg Phenobarbital 20mg	劑量：	中文名：樂安	健保價：1.5
圓形白色標記：△		D	強生	代碼：OLA

適應症：真性癲癇(尤其是癲癇大發作)、症候性癲癇、乍克森氏癲癇、精神分裂的發作、其他痙攣性之發作。

用法用量：一天三次飯後，一次一粒。極量為一天 6 粒。

副作用：鎮靜、眼球顫動、運動失調、齒齦增生、SLE、肝炎、軟骨症、週邊神經病變。

禁忌：(1) 紫斑病史。(2) 對 hydantoin 類或 barbituric acid 類藥品過敏者。

注意事項：(1) 腎、心疾病患者排泄較慢，有可能中毒。(2) 長期服用會有齒齦肥厚，可併用維他命 C 預防。

英文名：Depakin Oral Sol'n (原廠)	學名：Valproic acid	劑量：200mg/ml，40ml/BOT	中文名：帝拔癲	健保價：271
咖啡色棕瓶		D	賽諾菲	代碼：ODPS

適應症：癲癇之大發作、小發作、混合型及顳葉癲癇、躁症及偏頭痛。

用法用量：

(1) 癲癇：起始劑量 10~15mg/kg/day，每星期增加 5~10mg/kg 直到癲癇發作控制為止，一般劑量 30mg/kg/day。

(2) 躁症：建議以 600mg/day 開始給藥，再以 200mg/day 每三天逐步增加至病情被控制為止，一般劑量為 1000mg/day~ 2000mg/day，最高劑量 2500mg/day。

副作用：鎮靜、體重增加、顫抖、頭痛、運動失調、胃腸不適（噁心、嘔吐、食慾不振）較為常見、掉髮。

血液方面：曾有血小板減少、抑制血小板凝集、貧血等情形。肝機能障礙（必要時須停用）。

禁忌：對 valproate、divalproate、valpromide 或本藥其他成分過敏者。急性肝炎患者、慢性肝炎患者。

注意事項：

(1) 在治療前、增加劑量時及每兩個月應進行肝功能檢查，凝血狀態的測定（出血時間、Quick's test、凝血因子、血小板數、血小板凝集的控制）。

(2) 必須定期檢測腎功能和血中 ammonia 濃度。

(3) 治療最初的六個月內做藥物血中濃度監測。

(4) 本品容易潮解，應貯存於專用瓶罐中，保持乾燥。

英文名：Depakin 200 (原廠)	學名：Valproic acid	劑量：200mg/TAB	中文名：帝拔癲	健保價：3.43
圓形白色無標記		D	賽諾菲	代碼：ODP200

適應症：癲癇之大發作、小發作、混合型及顳葉癲癇、躁症及偏頭痛。

用法用量：

(1) 癲癇：起始劑量 10~15mg/kg/day，每星期增加 5~10mg/kg 直到癲癇發作控制為止，一般劑量 30mg/kg/day。不可咬碎。

(2) 躁症：建議以 600mg/day 開始給藥，再以 200mg/day 每三天逐步增加至病情被控制為止，一般劑量為 1000mg/day~ 2000mg/day，最高劑量 2500mg/day。

副作用：鎮靜、體重增加、顫抖、頭痛、運動失調、胃腸不適（噁心、嘔吐、食慾不振）較為常見、掉髮。

血液方面：曾有血小板減少、抑制血小板凝集、貧血等情形。肝機能障礙（必要時須停用）。

禁忌：對 valproate、divalproate、valpromide 或本藥其他成分過敏者。急性肝炎患者、慢性肝炎患者。

注意事項：

- (1) 在治療前、增加劑量時及每兩個月應進行肝功能檢查，凝血狀態的測定(出血時間、Quick's test、凝血因子、血小板數、血小板凝集的控制)。
- (2) 必須定期檢測腎功能和血中 ammonia 濃度。
- (3) 治療最初的六個月內做藥物血中濃度監測。
- (4) 本品容易潮解，應貯存於專用瓶罐中，保持乾燥。

英文名：Depakin 500 (原廠)	學名：Valproic acid	劑量：500mg/TAB	中文名：帝拔癲	健保價：8.2
長橢圓形白色無標記		D	賽諾菲	代碼：ODP

適應症：癲癇之大發作、小發作、混合型及顳葉癲癇、躁症及偏頭痛。

用法用量：

- (1) 癲癇：起始劑量 10~15mg/kg/day，每星期增加 5~10mg/kg 直到癲癇發作控制為止，一般劑量 30mg/kg/day。不得咬碎或壓碎錠劑。
- (2) 躁症：建議以 600mg/day 開始給藥，再以 200mg/day 每三天逐步增加至病情被控制為止，一般劑量為 1000mg/day~ 2000mg/day，最高劑量 2500mg/day。

副作用：鎮靜、體重增加、顫抖、頭痛、運動失調、胃腸不適(噁心、嘔吐、食慾不振)較為常見、掉髮。

血液方面：曾有血小板減少、抑制血小板凝集、貧血等情形。肝機能障礙(必要時須停用)。

禁忌：對 valproate、divalproate、valpromide 或本藥其他成分過敏者。急性肝炎患者、慢性肝炎患者。

注意事項：

- (1) 在治療前、增加劑量時及每兩個月應進行肝功能檢查，凝血狀態的測定(出血時間、Quick's test、凝血因子、血小板數、血小板凝集的控制)。
- (2) 必須定期檢測腎功能和血中 ammonia 濃度。
- (3) 治療最初的六個月內做藥物血中濃度監測。
- (4) 本品容易潮解，應貯存於專用瓶罐中，保持乾燥。

英文名：Convulex 300	學名：Valproic acid	劑量：300mg/CAP	中文名：康癲能	健保價：88
橘紅色軟膠囊標記：300		D	吉富	代碼：OCO300

適應症：癲癇之大發作、小發作、混合型及顳葉癲癇。躁症或急性躁期之躁鬱症之治療。偏頭痛之預防。

用法用量：

- (1) 癲癇：起始劑量 15mg/kg/day，每星期增加 5~10mg/kg 直到癲癇發作控制為止，一般劑量 30mg/kg/day。不得咀嚼。
- (2) 躁症：建議以 500~1000mg/day 分成數次服用。可增加劑量至一天 1500mg。(3) 偏頭痛：300mg 開始給藥，再逐漸增加劑量，一般在劑量 500~1000mg/day。

副作用：鎮靜、體重增加、顫抖、頭痛、運動失調、胃腸不適(噁心、嘔吐、食慾不振)較為常見、掉髮。

血液方面：曾有血小板減少、抑制血小板凝集、貧血等情形。肝機能障礙（必要時須停用）。

禁忌：對 Valproic acid 過敏，肝或胰臟功能障礙患者。

注意事項：

(1) 在治療前、增加劑量時及每兩個月應進行肝功能檢查，凝血狀態的測定(出血時間、Quick's test、凝血因子、血小板數、血小板凝集的控制)。

(2) 必須定期檢測腎功能和血中 ammonia 濃度。

(3) 治療最初的六個月內做藥物血中濃度監測。

英文名：Dipachro S.R.	學名：Valproic acid	劑量：500mg/TAB	中文名：帝帕克	健保價：99
長橢圓形白色無標記(較霧面)		D	信東	代碼：ODI

適應症：癲癇之大發作、小發作、混合型及顳葉癲癇、躁症及偏頭痛。

用法用量：

(1) 癲癇：起始劑量 10~15mg/kg/day，每星期增加 5~10mg/kg 直到癲癇發作控制為止，一般劑量 30mg/kg/day。不得咀嚼。

(2) 躁症：建議以 600mg/day 開始給藥，再以 200mg/day 每三天逐步增加至病情被控制為止，一般劑量為 1000mg/day~ 2000mg/day，最高劑量 2500mg/day。

副作用：鎮靜、體重增加、顫抖、頭痛、運動失調、胃腸不適（噁心、嘔吐、食慾不振）較為常見、掉髮。

血液方面：曾有血小板減少、抑制血小板凝集、貧血等情形。肝機能障礙（必要時須停用）。

禁忌：對 Valproic acid 過敏，肝或胰臟功能障礙患者。

注意事項：

(1) 在治療前、增加劑量時及每兩個月應進行肝功能檢查，凝血狀態的測定(出血時間、Quick's test、凝血因子、血小板數、血小板凝集的控制)。

(2) 必須定期檢測腎功能和血中 ammonia 濃度。

(3) 治療最初的六個月內做藥物血中濃度監測。

其他(Miscellaneous)

英文名： Progesterone inj	學名： Progesterone	劑量： 25mg/ml/AMP	中文名：黃體素	健保價：15
		B	台裕	代碼：IPGT

適應症：無月經、機能性子宮出血、迫切性流早產、習慣性流早產、月經困難、黃體機能不全所致之不孕症。

用法用量：一日 10~50mg，分一次或二次肌肉注射。

副作用：浮腫或體重增加等症狀時，並應作減量投藥或停止投藥等適當之處置。噁心、嘔吐、下痢、頭痛、欲睡或倦怠感等。

禁忌：重篤之肝障害或肝疾患者，應禁用本劑。

注意事項：(1) 不可靜脈注射。(2) 肌肉注射時，儘量避免同一部位反覆行之。(3) 神經密集之部位，儘量避免注射。

英文名： Resonium A 急	學名： Sodium Polystyrene Sulphonate 454gm	劑量： 100mg/gm 453.6gm/BOT	中文名：凱鉀力 寧	健保價：925
黃色粉末			賽諾菲	代碼：ORE

適應症：高血鉀症及由尿少症和由急性腎壞死(如腎小管病變、腎血色素蛋白尿性病變、猝變性腎病、壓碎性腎病)所引起的尿閉症、高鉀血症。

用法用量：建議劑量僅為大約劑量，應根據病人定期的血中電解質濃度監測來決定精確的給藥劑量。

成人(包括老年人)：a)口服：常用劑量為 1 天 3~4 次，每次 15gm。以少量的水或糖漿(有矯味作用)將本藥泡製成懸浮液。b)經由直腸給藥：因嘔吐而致口服給藥困難的病人，可以直腸給藥。可將 30gm 以 100ml 的 2% methylcellulose 450BP (中等黏度)和 100ml 的水泡製成懸浮液，以每日滯留灌腸法(daily retention enema)給藥。

副作用：鈉滯留、低血鉀症、低血鈣症和胃腸刺激、厭食、噁心、嘔吐、便秘和偶而腹瀉。

禁忌：(1) 血中鉀離子濃度低於 5 mmol/litre 者。(2) 已知對 polystyrene sulfonate 樹脂過敏的患者。(3) 腸阻塞疾病的患者(obstructive bowel disease)。

注意事項：(1) Resonium A 僅供口服給藥或經由直腸給藥。(2) 除非醫師評估治療效益遠大於危險性，否則不建議使用於懷孕與哺乳期。

其他止痛劑及解熱劑(Analgesic)

英文名： Depyretin	學名： Acetamionphen	劑量：500mg/TAB	中文名：得百利 寧	健保價：0.61
長橢圓形黃色標記：VPC/867		C	信東	代碼：ODEP

適應症：退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。

用法用量：發燒或需要時使用，若症狀持續，每隔 4~6 小時服用，每次 1~2 錠。24 小時內不可超過 4 次。每日不可超過 4gm。

副作用：紅疹、便秘、噁心、嘔吐、肝毒性。

禁忌：G-6PD 缺乏者禁用。

注意事項：慢性酒精中毒者會增加肝毒性。

英文名：Tramed 管 4	學名：Tramadol	劑量：50mg/CAP	中文名：特美痛	健保價：3.88
深綠/淺黃長圓柱形標記：TMD		C	瑞士	代碼：OTRD

適應症：中度至嚴重的急、慢性疼痛。為一種強效的止痛劑。

用法用量：口服：單次劑量 50~100mg，極量每天 400mg。

副作用：發汗、暈眩、嘔吐、口乾、疲勞。

禁忌：

- (1) 對此成分過敏者。
- (2) 急性酒精、安眠藥、止痛劑或其他中樞神經作用藥物中毒者。
- (3) 不能用於成癮性麻醉藥品戒斷現象的治療。
- (4) 對鴉片類藥品產生依賴性、不明原因引起之意識模糊、呼吸中樞或呼吸功能性的障礙、腦內壓增加等情況患者需加強照護。

注意事項：

- (1) 對於使用鴉片類藥品會產生加強反應的病人需特別注意。
- (2) 肝腎功能不全者，須延長給藥間隔。

呼吸道用藥(Respiratory Tract Drugs)

英文名： Ambroxol	學名：Ambroxol	劑量：30mg/TAB	中文名：安嗽	健保價： 1.5
六角形白色標記：SP 139 剝半刻痕			杏輝	代碼：OAMR

適應症：祛痰。

用法用量：一天三次，每次 30mg。每日最大劑量 120mg。

副作用：(1) 消化器：胃部不快感，胃部膨脹感，胃痛，腹部膨滿感，下痢，軟便。(2) 過敏症：發疹，蕁麻疹樣紅斑。

禁忌：對 Ambroxol 過敏者。乳糖不耐症患者進用本藥。於懷孕的首三個月並不推薦服用。

英文名： Asiphylline inj _急	學名： Aminophylline	劑量： 250mg/ml/AMP	中文名：心安寧	健保價： 15
		C	信東	代碼：IAS

適應症：心因性、支氣管氣喘及支氣管痙攣。

用法用量：急性發作：起始劑量 IV 6mg/kg 輸注時間需大於 20 分鐘。維持劑量：成人、非抽菸者：0.7mg/kg/hr 給 12 小時，然後 0.5mg/kg/hr；抽菸者：1mg/kg/hr 給 12 小時，0.8mg/kg/hr。ardiac&Liver diseases：0.2mg/kg/hr。

副作用：皮疹、蕁麻疹、排尿增加、肌肉抽搐、心跳急速或不規則、不安、胃痛、無法入眠、異常呼吸急促等應予以醫療照應。

禁忌：(1) 曾對 Xanthine 類藥物過敏反應。(2) 消化性潰瘍與進行性胃炎者可能不宜使用。(3) 對 Ethylenediamine 過敏。

注意事項：年老病患或有酒精中毒、充血性心衰竭、肝腎功能受損之病人，應使用較低劑量。

英文名： Medicon	學名： Dextromethorphan	劑量：15mg/TAB	中文名：滅咳康	健保價： 0.92
圓形白色標記：15		A(AUS)	塩野義	代碼：OMED

適應症：鎮咳。

用法用量：通常一日 3~4 次服用，一次 1 錠。

副作用：暈眩、胃腸不適、思睡。

禁忌：服用 MAO 抑制劑的病人。

注意事項：有高燒、出疹、持續性頭痛、及持續一星期上之咳嗽、或有復發現象。吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺炎引起之咳嗽不建議使用。懷孕中投藥安全性尚未建立。

英文名：Secorine syrup	學名：Each ml contains： Methylphedrine 1 Chlorpheniramine	劑量：120ml/BTL	中文名：息咳寧	健保價： 24.7
-----------------------	---	--------------	---------	-----------

	0.1 Guaiacol Glycolate 5(mg/ml)			
粉色液體			晟德	代碼：OSECO

適應症：緩解感冒之各種症狀（流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咳嗽、喀痰）。

用法用量：一日三次，成人每次 20ml，12 歲以上適用成人劑量。9~12 歲每次 10ml。

注意事項：開車、操作危險機械者請勿使用。

非類固醇類抗發炎劑(NSAIDs)

英文名：Bokey	學名： Acetylsalicylic acid	劑量：100mg/CAP	中文名：伯基	健保價：22
橘白膠囊標記：YSP		D	永信	代碼：OBO

適應症：預防心肌梗塞，預防心栓性栓塞症。

用法用量：每日 1 粒。

副作用：暈眩、嘔吐、偶有腸胃不適，可能引起雷氏症候群。

禁忌：對此藥品成分過敏者、嚴重肝腎疾患、血友病或其他出血性疾患、糜爛性胃炎或消化性潰瘍患者。懷孕末期之孕婦避免使用。

注意事項：正使用抗凝血劑治療的病人，或曾使用此成分發生氣喘者要小心使用。

英文名：Voltaren SR	學名：Diclofenac sodium	劑量：100mg/TAB	中文名：服他寧	健保價：2.97
圓形粉紅色標記：CG/CGC		C	諾華	代碼：OVOL

適應症：緩解發炎及因發炎反應引起之疼痛。

用法用量：起始劑量每日 100~150mg，症狀較輕或長期治療時，每日 75~100mg，夜間或早晨症狀較明顯患者，建議傍晚服用。

副作用：腸胃道副作用、頭暈、水腫、搔癢、紅疹及耳鳴。

禁忌：

- (1) 曾有 Aspirin 過敏、氣喘之病史者，對本劑過敏者。
- (2) 肝腎功能不良、消化性潰瘍患者。
- (3) 懷孕第三期禁用。

注意事項：長期治療慢性關節炎時，須定期尿液、血液檢查及肝功能檢查。

英文名：Ponstal	學名：Mefenamic acid	劑量：250mg/CAP	中文名：痛疏達	健保價：1.5
綠黃膠囊標記：SP 002		C	杏輝	代碼：OPOS

適應症：解除急慢性之輕、中度疼痛、包括頭痛、牙痛、耳痛、月經痛、外傷性、關節炎性及肌肉性疼痛、手術後及產後之疼痛

用法用量：成人每次二錠(500mg)，每天服用三次。

副作用：腸胃不適等。

禁忌：(1) 對 Aspirin 或 NSAID 過敏者。(2) 胃腸炎、潰瘍或嚴重肝腎障礙病患勿用。

注意事項：(1) 病人有皮疹發生，須立即停藥。(2) 肝、腎功能不佳之病患。

胃腸用藥(G.I Agents)

英文名： Lederscon	學名：Al(OH) ₃ ， Mg(OH) ₂	劑量：100mg/TAB	中文名：立達賜 康	自費價：2.4
圓形黃色無標記			輝瑞	代碼：OLED

適應症：緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

用法用量：一天 4 次，餐後及睡前或需要時服用，應嚼碎後吞服。

副作用：便秘、腹瀉，偶有噁心、嘔吐。

注意事項：本藥與口服四環素一起服用時，會抑制四環素吸收。腎衰竭病還長期服用含鋁胃藥可能加重透析引起之骨軟化症、腦病變或低血磷症，需謹慎小心使用。

英文名：Dulcolax	學名：Bisacodyl	劑量：5mg/TAB	中文名：樂可舒	健保價：22
圓形黃色無標記		B	百靈佳	代碼：ODU

適應症：暫時緩解便秘，診斷及手術前清腸。

用法用量：通常成人用量為睡前服用 1~2 錠。

副作用：腹部絞痛或不適、頭重腳輕、過敏反應：搔癢、蕁麻疹、盜汗、胸悶腹痛。

禁忌：有腹痛、痙攣性便秘、潰瘍性結腸炎等急性症狀者不可使用本藥。

注意事項：服用時若有腹痛現象時，應視情況減少服用劑量，並作適當處置。腸溶錠勿與牛奶或制酸劑一起服用，避免腸溶衣過早被溶解。

英文名：Kascoal	學名： Dimethicone	劑量：40mg/TAB	中文名：加斯克 兒	健保價：0.43
圓形白色無標記			永信	代碼：OKAS

適應症：解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

用法用量：一天 3~4 次，或需要時使用，成人每次 2 錠。

副作用：軟便、胃部不適感、腹瀉、嘔吐、噁心、胃部重壓感、食慾不振等，偶有頭痛。

英文名： Buscopan	學名：Hyoscine	劑量：10mg/TAB	中文名：補斯可 伴	健保價：22
圓形白色無標記		C	百靈佳	代碼：OBUN

適應症：胃腸痙攣及運動亢進、膽管痙攣及其運動障礙、尿路痙攣、女性生殖器之痙攣症狀。

用法用量：每天 3~5 次，每次 1~2 錠。

副作用：(1) 眼睛偶爾會發生調節障礙。(2) 偶爾心悸亢進、排尿障礙、口渴、便秘偶有腹部膨滿感、頭重感、頭痛等症狀。(3) 若有發疹等現象，應立即停藥。

禁忌：重症肌無力、巨結腸症、對本藥過敏患者。

注意事項：

- (1) 只有在嚴密觀察下，懷孕前 3 個月的婦女才可使用。
- (2) 使用本藥後，開車和操作機械時應小心。
- (3) 心律不整、前列腺肥大症、甲狀腺機能亢進，應謹慎用藥。

英文名：Duphalac	學名：Lactulose	劑量：667mg/ml, 300ml/BOT	中文名：亞培杜 化液	健保價：164
白色瓶裝		B	亞培	代碼：ODUP

適應症：患病期慢性便秘、門系肝腦病變、肝昏迷前期、肝昏迷

用法用量：

(1) 慢性便秘：起始劑量 10~45ml；維持劑量 10~25ml。每日最好於早餐時一次服用，服用後約 48 小時才能發揮臨床作用。

(2) 肝昏迷前期及肝昏迷：初劑量 30~50ml 每日三次。維持劑量調整至患者每日 2~3 次軟便。糞便 pH 5.0~5.5。

副作用：腹瀉、胃腸脹氣、腹痛、噁心、嘔吐。

禁忌：

- (1) 半乳糖血症。
- (2) 腸胃道阻塞、消化道穿孔、消化道穿孔之潛在風險者。
- (3) 對此藥品成分過敏者。

注意事項：(1) 本品含乳糖，患有乳糖不耐症患者需小心。

(2) 使用於治療便秘劑量通常不會對糖尿病患者造成問題。

(3) 長期使用未經調整劑量和濫用，可能導致腹瀉和電解質不平衡。

英文名：Imolex	學名：Loperamide	劑量：2mg/CAP	中文名：依莫瀉	健保價：1.5
綠灰膠囊標記：SP 071		B	杏輝	代碼：OIMX

適應症：治療急慢性腹瀉。

用法用量：

(1) 急性腹瀉：初劑量 4mg，如出現稀糞改用 2mg，極量一天 16mg，一般劑量一天 6~8mg。

(2) 慢性腹瀉：初劑量一天 4~8mg，分次服用如果沒有改善，可增至一天 16mg。

副作用：反胃、口乾、頭昏眼花、疲勞和過敏反應。

禁忌：(1) 2 歲以下之嬰兒。(2) 不得使用於廣效抗生素引起之急性潰瘍性結腸炎。

注意事項：(1) 只限症狀治療，若有其他原因引起腹瀉，應對病因做根本處理。(2) 極高之首度代謝作用，肝功能不良患者應小心監測中樞神經中毒之徵象。

英文名：MgO	學名：Magnesium oxide	劑量：250mg/TAB	中文名：氧化鎂	健保價：0.17
圓形白色標記：HT / 126		D	景德	代碼：OMGO

適應症：緩解胃部不適或灼熱感、胃酸過多、消化不良、暫時緩解便秘。

用法用量：一日 3~4 次，每次 1~2 錠，飯後一小時及睡前或需要時服用。

副作用：(1) 服用本劑可能引起腹痛、腹瀉、過敏。(2) 長期使用會造成電解質不平衡與水分缺乏。

禁忌：禁用於胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心之患者。

注意事項：

(1) 瀉劑不應長期使用，一但正常排便即應停藥。

(2) 腎疾病患者不得超過 600mg。

(3) 孕婦與哺乳者、未滿三個月嬰兒需經醫師評估使用。

英文名： Trancolon	學名： Mepenzolate	劑量：7.5mg/TAB	中文名：特良高 朗	健保價：2
圓形粉紅色標記：434		B	安斯泰來	代碼：OTRN

適應症：激躁大腸症候群。

用法用量：成人一次 2 粒，一天三次。

副作用：頭痛、眩暈、噁心、嘔吐。

禁忌：青光眼、前列腺肥大造成排尿困難、嚴重心臟病或麻痺性腸阻塞之患者。

注意事項：對甲狀腺機能亢進、充血性心衰竭、心律不整、患者應慎重給藥。懷孕婦女其治療上有益性超過危險性時，才可給藥。

英文名： Prometin	學名： Metoclopramide	劑量：5mg/TAB	中文名：補樂美 淨	健保價：2
圓形白色無標記		B	安斯泰來	代碼：OPRM

適應症：預防嘔吐、逆流性消化性食道炎、糖尿病引起之胃腸蠕動異常。

用法用量：口服 10~30mg/day(2~6 錠)，分 2~3 次於飯前服用。

副作用：不安、思睡、疲勞、幻覺、急性張力障礙反應、遲發性運動困難。

禁忌：對此藥品過敏者、疑有嗜鉻細胞瘤患者、有消化道出血穿孔或器質性阻塞的患者。

注意事項：小兒容易出現錐體外徑症狀，所以給藥時不可過量，特別脫水及發燒時，更要注意。

英文名： Primperan inj	學名： Metoclopramide	劑量： 10mg/2ml/AMP	中文名：腹寧朗	健保價：15
咖啡色棕瓶		B	賽諾菲	代碼：IPRI

適應症：預防嘔吐，逆流性消化性食道炎，糖尿病引起之胃腸蠕動異常。

用法用量：急性症候群的治療。成人：注射 1AMP，必要時可重複給藥。

副作用：錐體外症狀、遲發性運動障礙、腹瀉、脹氣。

禁忌：(1) 對 metoclopramide 或藥物中的其他成分過敏者。(2) 胃腸道出血、機械性阻塞或胃腸道穿孔者。(3) 嗜鉻細胞瘤的者。(4) 曾因使用此藥出現遲發性運動障礙(tardive dyskinesia) 的者。

注意事項：(1) 靜脈注射投予時，注射速度應緩慢且注射時間至少 3 分鐘以上。(2) 本藥物不建議使用於癲癇患者（會增加癲癇的發作頻率及強度）。(3) 腎或肝功能不全的患者，建議降低其使用劑量。

英文名：Mucaine	學名： Oxethazaine 5mg Al(OH) ₃ 126mg MgCO ₃ 87.5mg	劑量：250mg/TAB	中文名：胃卡因	健保價：2
-------------	---	--------------	---------	-------

圓形白色標記：WYETH		輝瑞	代碼：OMU
--------------	--	----	--------

適應症：胃酸過多引起之胃痛及胃灼熱。

用法用量：一天 4 次，每次 2~4 錠，飯前 15 分鐘和睡前服用，不可超過建議劑量。本藥不可咀嚼，請以開水吞服。

副作用：頭昏眼花、視力模糊、思睡、腹瀉、便秘、過敏反應。

禁忌：不可給予對本品過敏的病人，另外只有成年人方可使用。

注意事項：

(1) 輕微或中度腎功能不全者，使用含有鎂的制酸劑時，會導致高鎂血症發生之危險性增加，所以使用時應小心監測。

(2) 使用於慢性腎功能不全者，可能會導致高鋁血症的發生、長期或大量投與含鋁之制酸劑，可能會引起低磷酸血症，特別是磷攝取不足之病人。

英文名：Through	學名：Sennoside A+B	劑量：12mg/TAB	中文名：便通樂	健保價：1.12
圓形咖啡色剝半刻痕		C	中美	代碼：OTHR

適應症：緩解便秘。

用法用量：每天 1 次，每次 1~2 粒。

副作用：

禁忌：疑有急性腸胃不適、痙攣性便秘患者、有重症的硬結便患者、電解質失調患者避免大量投予。

注意事項：服用時若有腹痛現象時，應視情況減少服用劑量。

降血糖藥物(Antidiabetic Agents)

英文名：Diabitin	學名： Glibenclamide	劑量：5mg/TAB	中文名：血糖平	健保價：2
方形白色標記：387		C	榮民	代碼：ODIA

適應症：非胰島素依賴型糖尿病。空腹時的血糖超過 130mg/100ml，飯後一小時超過 180mg/100ml，飯後二小時超過 150mg/100ml，則必須服用本藥。

用法用量：每日口服最大劑量以不超過 20mg 為原則，實際情形則視情況由醫師決定，若每天劑量大於 10mg 時需分次給藥，建議空腹服用。

副作用：低血糖(極度飢餓感、心悸、發抖、冒冷汗 不尋常的虛弱及疲倦)、過敏反應、體重增加。

禁忌：

- (1) 嚴重肝臟機能障礙患者禁用
- (2) 糖尿病酮酸中毒者，應給予 insuline 治療。
- (3) 孕婦及可能懷孕婦女禁用。
- (4) 對 glyburide 成分過敏者。

注意事項：

(1) 切勿服用過量或飲食不當、運動過度、飲酒，另外重症腎功能不良者也要多加注意用藥劑量。

(2) 嚴重肝病和腎上腺皮質功能不全，可導致血糖過低。

英文名：Humulin R _急	學名：Insulin Human Regular	劑量：100 IU/ML, 10ml/BOT	中文名：優泌林 常規型	健保價：295
		B/C	禮來	代碼：IIN

適應症：糖尿病。

用法用量：依病人個別狀況調整。

副作用：低血糖。

禁忌：低血糖或對此藥成分過敏者。

英文名：Uformin	學名：Metformin	劑量：500mg/TAB	中文名：克糖錠	健保價：2
長型白色標記：MF 1		B	十全	代碼：OUFO

適應症：糖尿病

用法用量：每天 2~3 次，每次 500mg，可增至 1g 每日三次。每日最大劑量 3g。餐中或餐後服用。

副作用：腸胃不適，如噁心、嘔吐、下痢等。

禁忌：(1) 酸中毒者，有乳酸中毒的危險性。(2) 腎衰竭、肺栓塞、嚴重肝壞死、胰臟炎、酗酒者不宜服用。(3) 腎絲球過濾率(eGFR)<30ml/min/1.73m² 禁用。

注意事項：

- (1) 需注射顯影劑患者應先停用 Metformin。

- (2) Metformin 有導致代謝性酸中毒之風險，需注意。
- (3) 處方此藥品，需定期監測腎功能。

降血壓藥(Antihypertensive Agents)

英文名：Tenolol	學名：Atenolol	劑量：100mg/TAB	中文名：定樂平	健保價：2
圓形白色標記：04/04		D	瑞安	代碼：OTEO

適應症：高血壓、狹心症。

用法用量：

(1) 高血壓：本劑每天口服 50mg 至 100mg，每日服用一次，其藥效在服用後一或二星期即可呈現。

(2) 狹心症：每日口服 100mg，一次或分數次服用即有良好的反應，增加劑量不能相對增加療效。

副作用：四肢冰冷、肌肉疲勞、和心跳徐緩。

禁忌：(1) 有二度或三度心臟傳導阻斷之病人。(2) 心臟休克之病人。

注意事項：(1) 可能掩飾低血糖症所導致的心搏過速。(2) 可小心地使用於患有慢性呼吸道阻礙的病人，然而也可能會增加氣喘病人的呼吸阻礙。

英文名：Catapres	學名：Clonidine	劑量： 0.075mg/TAB	中文名：降保適	健保價：2.11
圓形白色標記：1C		C	百靈佳	代碼：OCAT

適應症：高血壓。

用法用量：高血壓患者起始劑量 0.075~0.150mg，一天兩次，2-4 週可視情況逐漸增加。治療劑量：0.3mg，一天三次。

副作用：嗜睡、口乾、頭痛、便秘、發疹、心搏徐緩。

禁忌：不可使用於患有心臟病變症候症的病人。

注意事項：開始及終止治療時必須逐漸進行。

英文名：Felpin	學名：Felodipine	劑量：5mg/TAB	中文名：菲可平	健保價：3.29
圓形橘紅色標記：5/ST376		C	信東	代碼：OFEL

適應症：高血壓、心絞痛。

用法用量：一天一次，每日劑量由 5mg 開始，視個人狀況調整，維持劑量為 5~10mg 一天一次。

副作用：潮紅、頭痛、心悸、疲倦、腳踝腫脹，牙齦增生。

禁忌：對此藥品成分過敏者。

注意事項：

(1) 錠劑必需和水服用，絕對不能剝半或咬碎服用。

(2) 可能有低血壓情況發生。

(3) 可能有周邊水腫情形發生。

(4) 本品對大多數患者單獨治療即可得到良好的效果。同時與 β -阻斷劑併用時，治療初期二者的劑量要適度調整，且要隨時監視其心跳速度。

英文名：Alat	學名：Nifedipine	劑量：10mg/CAP	中文名：心福	健保價：2
----------	---------------	-------------	--------	-------

橘色膠囊標記：ALAT	C	永信	代碼：OALA
-------------	---	----	---------

適應症：高血壓、狹心症。

用法用量：10~20mg，一天三次。每日最高劑量 180mg。

副作用：(1) 頭昏眼花、臉紅、頭痛、低血壓、足踝水腫。(2) 過量時心跳徐緩和低血壓的現象。

禁忌：(1) 對 Nifedipine 敏感者。(2) 懷孕及授乳期禁用。(3) 不可用於心臟血管性休克的病人。

注意事項：低血壓、心血儲量不足。

英文名：Inderal	學名：Propranolol	劑量：10mg/TAB	中文名：恩特來	健保價：2
圓形紅色標記：INDERAL 10	C	Astra	代碼：OIN	

適應症：狹心症、不整律（上心室不整律、心室性心博過速）、原發性及腎性高血壓、偏頭痛、控制原發性震顫、控制焦慮性心博過速、甲狀腺毒症的輔助劑、親鉻細胞瘤。

用法用量：

- (1) 焦慮症：10mg。可漸加至 40mg，一天 2~3 次。
- (2) 靜坐不能：40mg，一天 3~4 次。
- (3) 預防偏頭痛：20mg，一天 4 次。至多可調整至一天 240mg。
- (4) 高血壓：40mg 早晚服用二次，一天最多可達 640mg。
- (5) 心絞痛：10~20mg，一天 3~4 次。
- (6) 心律不整：10~30mg，一天 3~4 次。
- (7) 甲狀腺毒症：10~40mg，一天 3~4 次。

副作用：眩暈、失眠、疲倦、胃不舒服、嘔吐、腹瀉、便秘、四肢冰冷等都是短暫性。有報告指出 β 型阻斷劑，可能會有皮膚疹和乾眼症

禁忌：支氣管氣喘、心臟性休克、心臟阻斷、顯著的心臟衰竭、心竇性心博徐緩禁用。

注意事項：本藥宜與食物共服。

英文名：Diovan	學名：Valsartan	劑量：160mg/TAB	中文名：得安穩	健保價：12.7
凸長圓形土黃色標記：DX/DX NVR	D	諾華	代碼：ODIO	

適應症：高血壓、心臟衰竭。

用法用量：一天一次，每次口服 80mg，若需要，每天可增加至 160mg，最大劑量每天 320mg。

副作用：血管水腫、背痛、胸痛、暈眩、咳嗽、腹瀉、上呼吸道感染。

禁忌：已知對 Diovan 中任何成份過敏者及孕婦。

注意事項：

- (1) 膽道阻塞患者之藥物清除率會降低，須審慎使用。
- (2) 腎動脈狹窄之病人，應監測血清肌酸酐值或血中尿素氮值。
- (3) 過量時會導致低血壓症狀，並且可能產生意識昏迷、循環衰竭及/或休克。若剛服用，應立即施與催吐；若非剛服用，一般建議靜脈輸注生理食鹽水。

高血脂用藥(Antilipemic Agent)

英文名：Gemd	學名：Gemfibrozil	劑量：300mg/CAP	中文名：脂福	健保價：2
紅白膠囊標記：G300		C	永信	代碼：OGEMD

適應症：高脂血症。

用法用量：每天兩次，一次 2 粒。

副作用：腹痛、腹瀉、消化不良、關節痛、肌肉痙攣痛、肌痛、眩暈。

禁忌：肝腎功能不全、原發性膽硬化、膽囊疾病及對本藥品過敏者。

注意事項：(1) 可能增加膽固醇排泄於膽汁中，造成膽結石。(2) 與抗凝血劑併用，抗凝血劑需減量。(3) 孕婦、授乳婦使用安全性尚未建立。

英文名：Crestor	學名： Rosuvastatin	劑量：300mg/CAP	中文名：冠脂妥	健保價：23.7
扁圓形粉紅標記：ZD4522/10		X	Astra	代碼：OCR

適應症：高膽固醇血症、高三酸甘油酯血症。

用法用量：起始劑量是 10mg 口服，每日一次，需要時，可於 4 週後將劑量調高至 20mg。每日最高維持劑量 20mg。服藥時間早晚不拘，餐前餐後皆可服用。

副作用：頭痛、頭暈、便秘、噁心、腹痛、肌痛、罕見肌病及橫紋肌溶解、衰弱無力。

禁忌：對 Rosuvastatin 或本藥任何賦形劑過敏之患者。

嚴重腎功能不全患者(肌酸酐廓清率 < 30ml/min)。

注意事項：此類藥品併用 fibrates、niacin、cyclosporin 等藥品時易增加肌肉病變或橫紋肌溶解之副作用。除非利大於弊，否則不建議併用。若併用時，請醫師留意患者是否產生肌肉無力、疼痛等現象並監測其 CK(creatine kinase)，以避免發生急性腎衰竭。

暈動症用藥(Motion Sickness Agents)

英文名： Diphenidol	學名：Diphenidol	劑量：25mg/TAB	中文名：敵芬	健保價：1.5
圓型亮橘色無標記			永信	代碼：ODIP2

適應症：因內耳障害引起之眩暈（即前庭性、中樞性眩暈、包括頭部外傷、腦動脈硬化、高血壓等所引起之眩暈）美尼爾氏症候群。

用法用量：成人每日3次飯後服用，每次1~2錠。

副作用：嗜睡、過度興奮、腸胃不適、口乾、視覺模糊。

禁忌：對本藥品過敏者。無尿者。

注意事項：(1) 青光眼、胃腸道及生殖泌尿道阻塞者應審慎用之。(2) 孕婦、授乳婦安全性尚未建立。(3) 如出現幻覺、定向力障礙及精神混亂則需停藥。

腦下垂體激素(Hypophysis hormone)

英文名： Syntocriptine	學名： Bromocriptine	劑量：2.5mg/TAB	中文名：比洛達	健保價：6.9
圓形白色標記：剝半刻痕		B	MEDOCHEMIE	代碼：OSCR

適應症：抑制乳汁分泌、激乳素分泌腺瘤、激乳素引致之月經不規則、帕金森氏症。

用法用量：初劑量為0.5粒，2~3天後於睡前服用1粒，可每2~3天增加0.5粒至每次服用1粒，每天二次。若須再加大劑量，須依照上述增加劑量之方法。

(1) 抑制泌乳：分娩日服用1粒，第2~14天，每天2次，每次1粒。

(2) 壓制泌乳：第一天1粒，第2~14天，每天2次，每次1粒。

(3) 生殖腺功能不足、激乳素分泌腺瘤、乳溢、不孕：最終劑量為每天3粒，分次服用。但最多曾使用至每天12粒。沒有激乳素過多之病人每天二次，每天1粒。

(4) 周期性良性乳房疾病、周期性乳腺痛、周期性月經障礙：最終劑量為每天二次，每次1粒。

(5) 先端肥大症：最終劑量每天8~24粒。

(6) 帕金森氏症：每天4~32粒，分次服用。

副作用：噁心、姿勢性低血壓、眩暈、頭痛、嘔吐及便秘。

禁忌：對Bromocriptine 或其他麥再鹼過敏者，以及於懷孕期、分娩後或產褥期具血壓偏高狀態者，不應使用本藥。

腦代謝改善劑(Brain Metabolism Strengthening)

英文名：Flunazon	學名：Flunarizine	劑量：5mg/CAP	中文名：復腦通	健保價：2
灰白膠囊標記：N.K.P. 193			南光	代碼：OFLN

適應症：噁心、眩暈、迷路障礙、暈動病、末梢血管循環障礙。

用法用量：偏頭痛：起始劑量一天 10mg 睡前一次，常用劑量 5~10mg 一天一次。周邊血管疾病：10~20mg 一天一次。眩暈：20mg，一天三次。

副作用：嗜睡和疲倦、運動遲頓、靜坐不能、震顫、抑鬱、體重增加等。

禁忌：對此藥過敏者、目前有帕金森氏症者、有錐體外徑異常症狀者。

注意事項：服藥期間如發生疲倦且逐漸嚴重，需停用此藥。長期使用如有錐體外症狀或抑鬱等症狀者，需回診評估停藥。

英文名：Syntam	學名：Piracetam	劑量：2400mg/ 包	中文名：郝智	健保價：8.5
白色粉末			健喬信元	代碼：OSYN

適應症：(1) 對腦血管障礙及老化所引起之智力障礙可能有效。

(2) 皮質性陣發性抽搐輔助療法。

用法用量：治療腦血管障礙及老化所引起智力障礙：長期治療時的每日劑量為 1.2~2.4gm。再治療初期，每日劑量最高可達 4.8 gm。

副作用：眩暈、頭痛、腹痛、嘔心、嘔吐、皮膚炎。

禁忌：對此藥品成分或對 pyrrolidone 衍生物過敏者。

英文名：Noopol	學名：Piracetam	劑量： 1200mg/TAB	中文名：腦寶	健保價：2.67
長橢圓形橘色標記：NK 417			南光	代碼：ONOP

適應症：

(1) 對腦血管障礙及老化所引起之智力障礙可能有效。

(2) 皮質性陣發性抽搐輔助療法。

用法用量：

(1) 治療腦血管障礙及老化所引起智力障礙：長期治療時的每日劑量為 1.2~2.4gm。治療初期，每日劑量最高可達 4.8 gm。

(2) 皮質性陣發性抽搐：起始劑量每天 7.2gm，每 3~4 天增加 4.8gm/day，最高增至 24gm/day，分 2~3 次給藥。

副作用：眩暈、頭痛、胃痛、嘔心、嘔吐、皮膚炎。

禁忌：嚴重腎功能不全，ClCr < 20ml/min 者。

注意事項：欲降低劑量或停止治療時，為避免突然復發，以每天 1.2gm 速度減量。

補充溶液(Fluid Supplement)

英文名：Liquor Ringer	學名： Each ml： Sodium Chloride 8.6mg Calcium chloride 0.33mg Potassium chloride 0.3mg	劑量：500ml/BOT	中文名：林格氏注射液	健保價：25
			台裕	代碼：IRIG

適應症：循環血液量及組織間液減少時，細胞外液之補給及補正。

用法用量：成人每次 250~1000ml 靜脈點滴注射，投藥速度以每小時 300~500ml 為宜(即每分鐘約 80~130 滴為度)。

注意事項：

- (1) 腎疾患及腎臟功能不全之患者、心臟功能不全及高張性脫水之患者、閉塞性尿路疾患而致尿量減少之患者，應慎重投藥。
- (2) 大量急速投藥，其副作用有：腦浮腫、肺水腫、末梢性水腫或酸中毒等現象。
- (3) 本品含鈣，與抗凝血劑檸檬酸鹽併用時應注意。
- (4) 使用時，不可與磷酸鹽或碳酸鹽製劑配合，以免發生沉澱。

英文名：Vitagen 50% 急	學名：Glucose	劑量： 50%/20ml/AMP	中文名：美達研 50%	健保價：15
塑膠安瓶		C	信東	代碼：IGW50

適應症：

- (1) 碳水化合物及液體流失時之補充。
- (2) 25-50%Glucose 可降低腦脊隨壓和腦水腫，用於震顫性瞻妄或急性酒精中毒。
- (3) 腹瀉、低血糖。

用法用量：

- (1) 可口服補給營養。
- (2) 靜脈內點滴投與之速度為 0.5gm/kg/小時。
- (3) 5%Glucose (和血液等滲透壓)，靜脈糖質補充速度 0.5~8.5gm/kg/小時。

副作用：(1) 口服高濃度液，可能引起嘔吐、下痢。(2) 電解質流失、高血糖症及脫水。

禁忌：糖尿病患者、尿崩症、腎不全患者。

注意事項：高張注射液可能引起血栓靜脈炎。

英文名：Vitagen 20% 急	學名：Glucose	劑量： 20%/20ml/AMP	中文名：美達研 20%	健保價：15
塑膠安瓶		C	信東	代碼：IGW20

適應症：

- (1) 碳水化合物及液體流失時之補充。
- (2) 25-50%Glucose 可降低腦脊隨壓和腦水腫，用於震顫性瞻妄或急性酒精中毒。
- (3) 腹瀉、低血糖。

用法用量：(1) 可口服補給營養。

- (2) 靜脈內點滴投與之速度為 0.5gm/kg/小時。
- (3) 5%Glucose (和血液等滲透壓)，靜脈糖質補充速度 0.5~8.5gm/kg/小時。

副作用：(1) 口服高濃度液，可能引起嘔吐、下痢。

- (2) 電解質流失、高血糖症及脫水。

禁忌：糖尿病患者、尿崩症、腎不全患者。

注意事項：高張注射液可能引起血栓靜脈炎。

英文名：Vitagen 10%	學名：Glucose	劑量： 10%/500ml/BTL	中文名：美達研 10%	健保價：25
透明塑膠瓶		C	信東	代碼：IG10

適應症：營養補助劑。

用法用量：(1) 可口服補給營養。

- (2) 靜脈內點滴投與之速度為 0.5gm/kg/小時。
- (3) 5%Glucose (和血液等滲透壓)，靜脈糖質補充速度 0.5~8.5gm/kg/小時。

副作用：(1) 口服高濃度液，可能引起嘔吐、下痢。(2) 電解質流失、高血糖症及脫水。

禁忌：糖尿病患者、尿崩症、腎不全患者。

注意事項：高張注射液可能引起血栓靜脈炎。

英文名：Gitose 5%	學名：Glucose	劑量： 5%/500ml/BTL	中文名：吉多士 5%	健保價：25.1
		C	南光	代碼：IGIT

適應症：急性傳染病患之水分補給、體液之增量。

英文名：Rolikan inj _急	學名：Each ml: Sodium Bicarbonate 70mg	劑量：20ml/AMP	中文名：樂麗康	健保價：15
			信東	代碼：IRO

適應症：酸性中毒疾患、濕疹、蕁麻疹等皮膚疾患、胰島素休克之緩和、孕吐暈車、大腸菌性尿路疾患、結核性膀胱炎、防止由葡萄糖注射液等引起之體液酸化。

用法用量：每次 1~5g 皮下或靜脈注射。

注意事項：(1) 與鈣離子混合會有沉澱現象。(2) 皮下注射應避開神經部位。

英文名：Normal Saline 20	學名：Sodium chloride	劑量： 0.9%/20ml/VIAL	中文名：生理食 鹽水	自費價：4.5
-------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------

		信東	代碼：INOS20
--	--	----	-----------

適應症：水分補給

用法用量：每次 20~1000ml 皮下、靜脈內注射或點滴靜注。適量作為注射劑之溶解稀釋用。

副作用：鬱血性心不全、浮腫。

禁忌：高血壓、心衰竭、腎功能不良、癲癇症。

注意事項：心臟、循環系統機能障礙及腎障礙患者請小心投與。

英文名：Sodium Chloride inj 0.9	學名：Sodium chloride 0.9g/100ml	劑量：500ml/BOT	中文名：氯化鈉點滴	健保價：25
			台裕	代碼：ISOD

適應症：手術或其他疾患之水分及電解質之補給。

用法用量：成人每次 250~1000ml 靜脈點滴注射，投藥速度以每小時 300 ~ 500ml 為宜(即每分鐘約 80~130 滴為度)。

副作用：大量急速投藥，其副作用有：血清電解質異常、鬱血性心不全、浮腫或酸中毒等現象。

注意事項：心臟、循環系統機能障礙患者及腎疾患者，宜慎重投藥。

英文名：Water for Injection	學名：Water for Injection	劑量：20ml/AMP	中文名：注射用水	自費價：4.5
			信東	代碼：IAQ

適應症：粉末注射藥之溶解劑。

注意事項：(1) 本品用當注射藥品之溶劑或供醫療器械之潤洗，禁止直接注射人體。(2) 本品須於使用之前開啟，且僅限使用一次，倘有餘液應丟棄，不得留存再用。

解毒劑(Antidotes)

英文名：Desud Plus 舌下錠	學名：Buprenorphine/ Naloxone	劑量：8mg/TAB	中文名：解佳益	健保價：130
六角形黃色標記：24 LP		C	美時	代碼：ODES

適應症：鴉片類成癮的治療。

用法用量：前導期使用單方 Buprenorphine 接複方快速調整目標維持劑量，目標劑量 4-16mg/day。以 2~4mg 增減進行劑量調整。

副作用：頭痛、疼痛、腹痛、低血壓、戒斷症候群、便秘、噁心、失眠、出汗。

禁忌：(1) 對 Buprenorphine 及 Naloxone 成分過敏者。(2) 不可與類鴉片止痛劑併用。

注意事項：老年或肝功能損傷的病患應小心使用。

英文名：Suboxone 2	學名：Buprenorphine/ Naloxone	劑量：2mg/TAB	中文名：舒倍生	健保價：45
六角形白色標記：+ / N2		C	Reckitt	代碼：OSUB

適應症：鴉片類成癮的治療。

用法用量：初期投予 2~4mg，未出現戒斷症狀則可給予 8~16mg/day。

副作用：頭痛、疼痛、腹痛、戒斷症候群、便秘、噁心、失眠。

禁忌：(1) 對 Buprenorphine 及 Naloxone 成分過敏者。(2) 不可與類鴉片止痛劑併用。

注意事項：老年或肝功能損傷的病患應小心使用。

英文名：Anexate Inj	學名：Flumazenil	劑量：0.5mg/5ml/AMP	中文名：安易醒	健保價：910
		C	羅氏	代碼：IFLU

適應症：用於回轉 BZD 之中樞鎮靜作用。

用法用量：起始劑量 IV 0.3mg，如 60 秒內未達所需的意識程度，可重複給予直到病患甦醒或至總劑量達 2mg。

副作用：快速注射後，可能有感覺焦慮感、心悸，恐懼等副作用。但不常見，上述不適作用通常不需要特殊處理。

禁忌：不可用於已知對本品過敏之患者。不建議用在已長期接受 BZD 治療的癲癇病人。

注意事項：給藥後 24 小時內不得進行須全神貫注的活動。如操作具危險性機器、開車時。

英文名：Naloxone inj	學名：Naloxone	劑量：0.4mg/ml/AMP	中文名：解麻	健保價：303
		C	健亞	代碼：INA

適應症：麻醉藥品過量之解毒劑。

用法用量：疑似麻醉藥品使用過量：起始量 0.4mg~2mg，由靜脈注射。若未達到預期的復甦效果或改善呼吸功能，於投藥後隔 2~3 分鐘再重複給藥。若投與本藥 10mg 仍未有任何反應，宜

考慮是否診斷為鴉片類藥品引起或部分鴉片類藥品引起之中毒。若無法靜脈注射時，則可改以肌肉注射或皮下注射。

副作用：入睡困難、焦慮、神經質、腹痛、噁心、無力、關節肌疼痛、頭痛。

禁忌：(1) 使用類鴉片止痛劑的病人。(2) 目前有類鴉片依賴性的病人。(3) 急性肝炎或肝臟衰竭病人。

注意事項：肝腎功能不全者應小心使用。

電解質(Electrolytes)

英文名：KCl Inj	學名：Potassium Chloride	劑量：15%/20ml/AMP	中文名：氯化鉀	健保價：15
黃色液體		C	信東	代碼：IKCL

適應症：鉀缺乏症。

用法用量：

(1) 成人：40-60 mEq/day 可到 200~400 mEq/day(通常不超過 3mEq/kg)。血鉀濃度>2.5mEq/L 時，每日可使用 200mEq 的鉀離子，以濃度<30mEq/L，且每小時不超過 10mEq 的速率靜脈輸注。血鉀濃度<2mEq/L 時，每日可使用 400mEq 的鉀離子，且每小時不超過 20mEq 的速率靜脈輸注。

(2) 小孩：2~3mEq/kg/day 或 40mEq/m²。

副作用：高血鉀、噁心、嘔吐、心律不整、肌肉無力感。

禁忌：嚴重腎臟炎、先天性心不全患者禁用。

注意事項：本藥濃度每 ml 含鉀離子 1.5~2mEq 時，靜脈頭與前必須稀釋，如直接注射，有致命危險。注射速度過速，即使小劑量亦有致命的危險。

英文名：Radi-K	學名：Potassium Gluconate	劑量：595mg/TAB	中文名：鉀順	健保價：1.89
圓形白色標記：PBF/104			寶齡富錦	代碼：ORA

適應症：血鉀過低症。(因手術前後，使用藥物、瀉肚、心臟病引起之血鉀過低症)。

用法用量：一日 3~9 錠分 2~3 次服用。

副作用：偶有噁心、嘔吐、食慾不振、下痢、腹痛、胸悶、便秘、及腹部膨脹感。偶有皮疹、搔癢出現。

注意事項：

- (1) 低鉀狀態時作為鉀的補充劑，使用前必須先檢查血清中鉀值、鈉值及尿量。
- (2) 使用中定期檢查血清中鉀值、尿量和尿中鉀值鈉值的比率以及腎功能。
- (3) 長期使用時，血中及尿中鉀值、腎功能、心電圖最好定期檢查。
- (4) 對 Addison's disease(安迪生氏病)患者，必須施以適當的安迪生氏病療法。
- (5) 由於原發性 Aldosteronism(醛固酮過多症)引起之 低鉀症，請與醛固酮拮抗劑併用。
- (6) 腎功能障礙、腎功能低下及細尿管、輸尿管病變患者請謹慎服用。

英文名： Vitacal ^急	學名：每 ml 含： Glucose 100mg, Calcium Chloride 20mg	劑量：	中文名：美達加 祿	健保價：15
透明安瓶			信東	代碼：IVIT

適應症：止血，營養。

用法用量：每日或隔日一次，每次 10~20ml 靜脈緩慢注射。

注意事項：(1)室溫必光儲存。(2)Ca⁺²：0.272mEq/ml。

維生素(Vitamins)

英文名： Kentamin	學名：Each CAP contains： Thiamine HCl 50mg Pyridoxine HCl 50mg Cyanocobalamin 500mcg	劑量：	中文名：開恩達 命	健保價：2
黃紅膠囊標記：PBF		A	寶齡富錦	代碼：OKE

適應症：因缺乏維生素 B1、B6、B12 所引起的肌肉痛、神經痛、腳氣病、肩膀酸痛、腰痛、懷孕授乳期間及身體疲勞時，病中、病後等的營養補充。

用法用量：成人一日 1~3 顆，兒童依年齡遞減。

副作用：皮膚感覺異常、過敏、血管神經病變。

注意事項：需避光儲存。

英文名：Wanse	學名：Ferrous Fumarate 100mg, Cyanocobalamin 4mcg, Folic acid 2mg	劑量：	中文名：旺血	健保價：1.5
圓形紅色錠劑			優生	代碼：OWAN

適應症：一般貧血。

用法用量：成人每次 1~2 錠，小兒每次 1 錠，1 日 3 次，飯後立即服用。

副作用：鐵劑可能引起便秘、腹瀉、噁心、嘔吐、深色糞便、腹痛，通常為暫時性反應。

禁忌：對此藥品任一成分過敏者、色素沉著症或含鐵血黃素沉著症者禁用含鐵製劑。

注意事項：服用含鐵製劑糞便顏色會變黑或變深。

英文名：Folic acid	學名：Folic acid	劑量：5mg	中文名：葉酸	健保價：2
圓形黃色錠劑標記：124			榮民	代碼：OFO

適應症：惡性貧血、妊孕性貧血、小兒巨大紅血球貧血及骨髓增生或衰退引起之貧血。

用法用量：起始劑量一天 3 次，1 次 1 錠。

副作用：食慾不振、噁心、紅斑、搔癢感、全身倦怠感。

英文名：Vitamin B1 inj	學名：Thiamine	劑量： 100mg/2m/AMP	中文名：維他命 B1	健保價：15
			大豐	代碼：IVB1

適應症：腳氣、多發性神經炎、維他命 B1 缺乏症。

用法用量：每次 2ml 皮下、肌肉、靜脈或脊髓腔內注射。

英文名：Vit.B1	學名：Thiamine	劑量：100mg/TAB	中文名：維他命 B1	健保價：1
圓形白色標記：100		A	強生	代碼：OVB1

適應症：(1) 腳氣病的治療和預防。(2) B1 缺乏症。(3) 酒精中毒。

用法用量：10~20mg，一天 3 次。

副作用：血管神經病變、肺水腫。

禁忌：對 Vitamin B1 過敏。

注意事項：Vitamin B1 缺乏症很少單獨存在，應考慮是否有多種維他命缺乏的可能。

擬交感神經興奮藥物(Alpha-/Beta-Agonist)

英文名： Dopamine inj 急	學名：Dopamine	劑量： 200mg/5ml/AMP	中文名：得保命	健保價：25.8
玻璃瓶標記：Dopamin		C	榮民	代碼：IDOP

適應症：休克症候群及心臟衰竭。

用法用量：先用 5%Glucose 或 0.9%NaCl 稀釋後靜脈注射。初期速率 1~5 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ ，可逐漸增加至 5~10 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ 。依據病人的血壓、心輸出量、尿液輸出量，最大極量為 20~50 $\mu\text{g}/\text{kg}/\text{min}$ 。

副作用：過敏、胃腸不適、頭痛、心律不整、低血壓。

禁忌：有親鉻細胞瘤，快速不整脈或心室不整脈者，不可使用本藥。四肢循環疾病、血管閉塞患者小心使用。

注意事項：不得直接皮下、肌肉或靜脈注射。

英文名： Epirenamin inj 急	學名： Epinephrine	劑量： 1mg/ml/AMP	中文名：鹽酸副 腎素注射液	健保價：15
		C	大豐	代碼：IEPI

適應症：過敏反應引起之休克、呼吸道痙攣或喉頭水腫心跳停止之急救、支氣管性氣喘。

用法用量：

(1) 過敏性反應治療：肌肉或皮下注射，起始劑量 0.2~0.5mg，視需要每 10~15min 重複給藥，單一最高劑量 1mg。

(2) 支氣管擴張劑：皮下注射，起始劑量 0.2~0.5mg，視需要每 20min 或 4 小時重複給藥，單一最高劑量 1mg。

(3) 心臟興奮劑：心內或靜脈注射，起始劑量 0.1~1mg，必要每 5min 重複給藥。

(4) 血管收縮劑：與脊髓麻醉劑併用，劑量 0.2~0.4mg 加到脊髓麻醉劑混合。

(5) 與局麻劑併用：與 0.1~0.2mg，作成 1:200,000 或 1:20,000。

(6) 血管加壓劑(過敏性休克)：肌肉或皮下注射，起始劑量 0.5mg，視需要每 5~15min 靜脈注射 0.025~0.050mg。

副作用：頭痛、噁心、嘔吐、震顫、臉或皮膚潮紅紅腫。

注意事項：若溶液變成粉紅色、紅棕色或有沉澱則不可使用。

類固醇(Steroids)

英文名：Rinderon Inj急	學名： Betamethasone	劑量： 4mg/1ml/AMP	中文名：臨得隆	健保價：16.7
		C	塩野義	代碼：IRIN

適應症：外科休克類似休克狀態、腦浮腫、副腎腫瘍摘除、關節風濕症、急性副腎不全、支氣管氣喘、風濕熱、結核性胸膜炎、結核性髓膜炎、腦脊髓炎、濕疹、天疱瘡類、圓形脫毛症、過敏性結膜炎、鞏膜炎、虹彩炎、虹彩毛樣體炎、過敏性鼻炎、複合性副鼻腔炎。

用法用量：

(1) IV or IM: 4-12 mg/dose,需要時每 3-4hr。IVD: 4-12 mg in NS or D5W qd or bid 靜脈及肌肉注射：每次 4~12mg，視症狀每隔 3~4 小時反覆投與同量。

(2) 點滴靜脈注射：每次 4~20mg，與生理食鹽液或葡萄糖液，一天投與 1~2 次。

注意事項：(1)患有急慢性感染症，使用本藥物時，要同時併用適當的化學療法或抗生素藥品，以治療感染疾病

(2) 對消化管障礙、腎臟疾患、高血壓患者、精神病患者服用時應多加注意。

(3) 服藥期間要特別注意蛋白質的補充，服藥適量，以免危險。

英文名：Topsym cream	學名： Fluocinonide	劑量：5gm/TUBE	中文名：妥膚淨	健保價：42.4
長條軟膏			田邊	代碼：ETO5

適應症：急性濕疹、慢性濕疹、乳小兒濕疹、脂漏性濕疹、貨幣狀濕疹、接觸性皮膚炎、異位性皮膚炎、尋常性乾癬、圓形脫毛症、尋常性白斑、掌蹠膿疱症、癢疹類（蕁麻疹樣苔癬、粟粒疹或小丘疹、固定蕁麻疹）

用法用量：一天 1~3 回，適量塗敷於患部。

副作用：過敏反應（紅斑、丘疹、腫脹）。

禁忌：(1) 皮膚結核 (2) 單純性疱疹、水痘 (3) 無濕疹樣變化之白癬不可使用。

注意事項：(1) 妊娠使用安全性尚未確定，應避免長期或大量使用 (2) 不可用於眼科。

英文名： Hydrocortisone inj急	學名： Hydrocortisone	劑量： 100mg/2ml/VIAL	中文名：舒爾體 爽	健保價：35.3
		C	中化	代碼：IHYD

適應症：腎上腺皮質機能不全，劇烈休克，膠原疾病(全身性紅斑性狼瘡)，過敏反應(支氣管氣喘)，過敏性皮膚疾患(天皰瘡、剝脫性皮膚炎)。

用法用量：IM 或 IV，起始劑量 100-500 mg IV 30 秒~ 10 min，依病人狀況及臨床反應每隔 2, 4, or 6 hr 重複給藥。

副作用：失眠、食慾增加、腸胃不適、情緒變化、毛髮增加、糖尿病、青光眼、鼻出血。

禁忌：全身性黴菌感染。已知對藥物或本劑所含成分過敏者。上述兩者禁用。接受腎上腺皮質

類固醇免疫抑制劑量治療者，不可接受活性疫苗或減毒疫苗接種。

注意事項：高血壓、消化性潰瘍、糖尿病小心使用。

英文名：Pelonine	學名： Prednisolone	劑量：5mg/TAB	中文名：倍樂寧	健保價：1.5
圓形白色標記：JCP/ I 13		C/D	強生	代碼：OPEL

適應症：

(1) 風濕性疾患風濕性關節炎、風濕熱、Still 氏病、風濕性心炎、乾癬性關節炎、恥骨炎、強直性脊椎炎、骨關節炎、風濕性脊椎炎、痛風性關節炎等。

(2) 支氣管氣喘及過敏性疾病。

(3) 紅斑性狼瘡。

對其他各種炎症性皮膚疾患頗有效果，目前凡對Cortisone 及Hydrocortisone 有效之全部適應症，本劑皆有效。

用法用量：一日之全投與量分為一日4次或一日2次服用，症狀好轉後每隔2~3日將1日投與量減少2.5~5mg (1/2~1 錠) 作維持療法。

注意事項：(1) 長期療法後欲中止服用時，不可立即中止，必先漸減用量，最後中止投藥。(2) Cortisone、Hydrocortisone 療法常有之Moon-face (圓形臉) 及輕度多毛症、不眠症。(3) 因主要副作用引起浮腫、血壓上升，尤以腎臟疾患及高血壓患者應注意。

附錄

附錄一：藥物品項（中文名）、代碼一覽表

英文商品名	中文商品名	代碼
B.C. Cream	美西	EBC
Erythromycin Oph Oint	紅黴素眼藥膏	EER
Exelderm cream	優足達	EEX
Glycerin ball	立迅	EGLY
Lido Jelly	利度凝膠	ELID
Topsym cream	妥膚淨	ETO5
Water for Injection		IAQ
Levophed inj	力復非他	IAR
Asiphylline inj	心安寧	IAS
Atropine inj	硫酸阿托品	IATP
Citosol inj	治得舒	ICI
Dopamine inj	得保命	IDOP
Dupin Inj	樂平	IDUP
Epirenamin	鹽酸副腎素	IEPI
Fluanxol Inj	福祿安	IFL
Anexate Inj	安易醒	IFLU
Vitagen 10%	美達研 10%	IG10
Gitose 5%	吉多士 5%	IGIT
Vitagen 20%	美達研 20%	IGW20
Vitagen 50%	美達研 50%	IGW50
Hydrocortisone inj	舒爾體爽	IHYD
Humulin R	優泌林常規型	IIN
KCl Inj	氯化鉀	IKCL
Lidocaine Inj 2% 20ml	利多卡因	ILID
Lidocaine Inj 2% 5ml	利多卡因	ILID5
Naloxone inj	解麻	INA
Normal Saline 20	生理食鹽水	INOS20
Progesterone inj	黃體素	IPGT
Primperan inj	腹寧朗	IPRI
Relaxin Inj	能弛聖	IRE
Liquor Ringer	林格氏注射液	IRIG
Rinderon Inj	臨得隆	IRIN
Risperidal Consta 25 inj	維思通	IRIS
Risperidal Consta 37.5inj	維思通	IRIS37

英文商品名	中文商品名	代碼
Rolikan inj	樂麗康	IRO
Sodium Chloride inj 0.9		ISOD
Suopinchon	壽平腫	ISU
Vitamin B1 inj	維他命 B1	IVB1
Diphenhydramine inj	鹽酸二苯胺明	IVE
Vitacal	美達加祿	IVIT
Abilify 15	安立復	OAB15
Abilify 5	安立復	OAB5
Alat	心福	OALA
Alepam	安樂平	OALE
Allopurinol	安樂普利諾	OALL
Ambroxol	安嗽	OAMR
Amoxicillin	安莫西林	OAMO
Apa-Cymba 60	欣樂	OCYA
Apa-Mirtazapine O.D.T.	緩憂	OAMIR
Apa-Risdol 2	鴻汶理思得 2	ORI2
Apo-Quetiapine	安保思樂	OAQU
Apo-Risperidone Solution	安保瑞思得	OARS
Aricept 10	愛憶欣	OARI10
Aripiprazole 15	阿立批挫錠	OAR15
Aripiprazole-Zydus	安若寧	OARZ10
Ativan 0.5 (原廠)	安定文	OATV
B.H.L. 5	顫立靜	OBHL
Baktar	撲菌特	OBAK
Bendopar 125	賓渡帕	OBE125
Betetrim S.R.	倍得舒	OBET
Binin-U 10	易寧優錠	OBIU10
Binin-U 2	易寧優	OBIU2
Bokey	伯基	OBO
Bromazin	牟靜錠	OBRO
Buscopan	補斯可伴	OBUN
Calmday	康眠定	OCAL5
Carbatin	康立定	OCAB
Catapres	降保適	OCAT

英文商品名	中文商品名	代碼
Champix	戒必適	OCH
Cirzodone	杏緩妥	OCIR
Clonopam 0.5	克癩平	OCLO05
Clonopam 2	克癩平	OCLO2
Clopran	可必安	OCL
Clozaril 100	可致律	OCZ100
Colian	可立安	OCOL
Concerta 27	專思達	OCON27
Concerta 36	專思達	OCON36
Convulex 300	康癩能	OCO300
Crestor	冠脂妥	OCR
Cymbalta 30	千憂解	OCYM
Cymbalta 60	千憂解	OCY
Dalmadorm	當眠多	ODAL
Deanxit (原廠)	得安緒	ODE
Denset	得原緒	ODEN
Depakin 200	帝拔癩	ODP200
Depakin 500	帝拔癩	ODP
Depakin Oral Sol' n	帝拔癩	ODPS
Depyretin	得百利寧	ODEP
Desud Plus 舌下錠	解佳益	ODES
Diabitin	血糖平	ODIA
Diapine	大安源	ODIA2
Dilantin	癩能停	ODPH
Diovan	得安穩	ODIO
Dipachro S.R.	帝帕克	ODI
Diphenidol	敵芬	ODIP2
Ditropan	達多幫	ODIT
Dogmatyl	脫蒙治	ODO50
Dulcolax	樂可舒	ODU
Duphalac	亞培杜化液	ODUP
Duxetine 30	萬憂停	ODUX
Easyfor SR	悅康	OEASY
Ebixa(原廠)	憶必佳	OEB
Efexor XR 75	速悅	OEFXR
Escipro	易適普	OESC
Escitalopram-Zydus	釋心憂	OESZ

英文商品名	中文商品名	代碼
Eszo	艾斯樂	OES
Etumine	意妥明	OET
Eutac	憂停	OEUT
EVY F.C.	益美憶	OEYV
Faxine	樂心	OFA
Felpin	菲可平	OFEL
Fluanxol 3	福祿安	OFL3
Fluanxol 5	福祿安	OFL5
Fluitran	服爾伊得安	OFLT
Flunazon	復腦通	OFLN
Flupine	福安源	OFLUP
Flurazin	富祿靜	OFRA
Folic acid	葉酸	OFO
Gemd	脂福	OGEMD
Geodon	哲思	OGEO
Haldomin	煩樂平	OHAL
Halopin	安樂平	OHAL
Hydergine	喜得鎮	OHY
Imolex	依莫瀉	OIMX
Inderal	恩特來	OIN
Invega 3	思維佳	OIN3
Invega 6	思維佳	OIN6
Kascoal	加斯克兒	OKAS
Kentamin	開恩達命	OKE
Kinax	景安寧	OKIN
Kinloft	抗憂服	OKI
Kinxetin	抗憂佳	OKIX
L.A.	樂安	OLA
Lamictal 100	樂命達	OLAL
Lamictal 50	樂命達	OLAMI
Lederscon	立達賜康	OLED
Lendormin	戀多眠	OLEN
Lepax	得緒安	OLEP
Lilitin	鋸利靜	OLIL
Lodopin 25	絡篤平	OLO25
Lodopin 50	絡篤平	OLO
Lorazin	樂力靜	OLOZ

英文商品名	中文商品名	代碼
Lote	樂得	OLOT
Luvox (原廠)	無鬱寧	OLU
Madopar 250	美道普	OMA250
Medicon	滅咳康	OMED
Mezapin	可洛拉平	OMEZ25
MgO	氧化鎂	OMGO
Milpran	解鬱優	OMIL
Mirtan	邁坦	OMIR30
Mucaine	胃卡因	OMU
Musgud	瑪舒可	OMUS
Neuroquel 100	腦樂靜	ONEU
Nicotinell 口嚼錠	克菸	ONICO
Nitrostat	耐絞寧	ONIT
Nodoff	納得復	ONOD
Noopol	腦寶	ONOP
Olan 5 口溶錠	若寧	OOLA
Olanzapine-Waka 口溶錠	歐蘭薩平	OOLW
Olzapine 10	雙復明	OOL
Pelonine	倍樂寧	OPEL
Ponstal	痛疏達	OPOS
Prometin	補樂美淨	OPRM
Qeutialin 200	喜樂平	OQUT200
Quetialin 25	喜樂平	OQUT25
Radi-K	鉀順	ORA
Resonium A	凱鉀立寧	ORE
Risperdal 1 (原廠)	理思必妥	ORIS
Risperdal 2 (原廠)	理思必妥	ORIS2
Risperdal Oral Sol' n	理思必妥	ORISS
Ritalin	利他能	ORIT
Ritalin LA	利長能	ORLA
Rivotril 0.5 (原廠)	利福全	ORIV05
Secorine syrup	息咳寧	OSECO
Seroquel 100	思樂康	OSEQ
Seroquel XR 200	思樂康	OSEX200
Seroquel XR 300	思樂康	OSEX300
Seroquel XR 50	思樂康	OSEQ50

英文商品名	中文商品名	代碼
Seroxat (原廠)	克憂果	OSEX
Silence 1	悠然	OSIL
Sleepman	舒夢眠	OSL
Smokfree 10cm2	淨菸 10	TSM10
Smokfree 15cm2	淨菸 15	TSM15
Solian 200	首立安	OSOL
Solian 50	首立安	OSOL50
Soma	舒肌痛	OSO
Sopid	悠思坦	OSOP
Sotalon	舒得夢	OSOT
Spiterin	思特寧	OSPI
Stilnox CR	使蒂諾斯	OSTICR
Stilnox (原廠)	使蒂諾斯	OSTI
Strattera	思銳	OSTR4
Suboxone 2	舒倍生	OSUB
Superide	思必樂	OSUPE
Susine	舒神	OSUS
Syntam	郝智	OSYN
Syntocriptine	比洛達	OSCR
Tegol	癩妥	OTEG
Tenolol	定樂平	OTEO
Through	便通樂	OTHR
Tofranil	妥富腦	OTOF
Tramed	特美痛	OTRD
Trancolon	特良高朗	OTRN
Trazone	暢鬱舒	OTZ
Uformin	克醣錠	O UFO
Ultidep 20	樂憂平	OULT
Uniclone	優樂康	OUNI
Valdoxan	煩多閃	OVALD
Vit. B1		OVB1
Voltaren SR	服他寧	OVOL
Wanse	旺血	OWAN
Wellbutrin XL	威克倦	OWEX
Winsumin	穩舒眠	OWIN
Xanax 0.25	贊安諾	OXA25
Xanax 0.5	贊安諾	OXA

英文商品名	中文商品名	代碼
Xet	抗特慮	OX
Zapine	來特平	OZAP
Zoloft (原廠)	樂復得	OZO
Zonin	柔靈平	OZON
Zydis 口溶錠	津普速	OZYZ
Zyprexa 5	金普薩	OZY

附錄二：懷孕期藥物安全分類

FDA

分級	定義	藥物
A	(1)沒有致畸型之慮，為安全的藥物。 (2)在人體已做過對照組的研究，無法證實在妊娠第一期，甚至以後，對胎兒有危險性。這類藥物對胎兒傷害的可能性最微小。	維他命即屬此類。
B	(1)動物實驗顯示對胎兒沒有危險性，但並未對懷孕的婦女做過對照組的研究。 (2)動物實驗顯示對胎兒有不良的影響，但對懷孕婦女所做的對照組研究中，卻無法證實此類藥物對胎兒有害。	許多常用藥物即屬此類： penicillin ，一般孕期仍可使用
C	(1)動物試驗顯示對胎兒有不良影響，但並沒有對懷孕婦女做過對照組的研究。 (2)尚未做過動物試驗及人體試驗。屬於此一等級的藥物，只能在經驗判斷對胎兒的潛在利益大於潛在的危險性之前提下使用。	例如：某些抗精神症狀藥物： Lorazepam, Haloperidol ，在使用上就要小心諮詢。
D	有足夠的證據顯示對胎兒有危險性，但評估此類藥物對懷孕婦女有益，則可以不論其胎兒危險性。例如，孕婦在生命垂危的狀態下此藥是必須的；或孕婦在病重時，更安全的藥物不能被使用或無效時，仍可使用此藥。	例如：抗癲癇藥物： Carbamazepine 及 Phenytoin
X	動物試驗或人體試驗均顯示會造成胎兒異常或有足夠的證據顯示對胎兒有危險性，而且懷孕婦女使用此等級的藥物，其危險性超過任何可能的好處。這類藥物在懷孕的婦女及即將懷孕的婦女是禁止使用的。	例如：治療青春痘藥物： Isotretinoin 會引起神經系統、臉部、心臟發育異常。

ADEC Pregnancy Categories (Australia)

分級	定義
A	藥物經過大量孕婦及育齡期婦女服用數據，觀察顯示沒有明顯增加傷害或是構成畸胎的可能。
B1	一定數量的孕婦以及育齡期婦女服用資料顯示沒有直接或間接明顯傷害導致畸胎的可能。 動物實驗並未顯示出對胎兒的傷害。
B2	極度有限數量的孕婦及育齡期婦女服用資料顯示沒有明顯傷害或是導致畸胎的可能，或是觀察到在人類胎兒有直接或間接的傷害 動物實驗的數據可能缺乏但是可以查遇到的資料顯示沒有增加胎兒傷害的證據。
B3	極度有限數量的孕婦及育齡期婦女服用資料顯示沒有明顯傷害或是導致畸胎的可能，或是觀察到在人類胎兒有直接或間接的傷害。 有動物研究顯示胎兒損傷的發生率增加的證據，但是在人類上面的意義並不明確。
C	藥理作用可能引起或是被懷疑是引起胎兒或是新生兒的傷害，此傷害不會引起畸胎，且此作用影響是可逆的。
D	藥物會引起或是被懷疑或是已經可能預期增加對人類的胎兒有畸胎或是不可逆的傷害，這些藥物也可能有藥理上的副作用。
X	藥物具有引起胎兒永久性傷害的風險，不應該使用在孕婦或是可能懷孕的婦女身上。

附錄三：不可磨粉或剝半的藥品

	商品名	藥品劑型	說明
無法提供 半顆	Alat	膠囊	半顆無法計價
	Amoxicillin	膠囊	半顆無法計價
	Apa-Cymba	膠囊	半顆無法計價
	Apa-Mirtazapine O.D.T.	口溶錠	半顆無法計價
	Bendopar 125	膠囊	半顆無法計價
	Bokey	膠囊	半顆無法計價
	Betetrim SR	持續釋放錠	仿單：不可剝半或咬碎服用
	Carbatin	膠囊	半顆無法計價
	Colian	膠囊	半顆無法計價
	Concerta 27	持續釋放錠	仿單：不可剝半或咬碎服用
	Concerta 36	持續釋放錠	仿單：不可剝半或咬碎服用
	Convulex 300	軟膠囊	軟膠囊無法剝半
	Cymbalta 30	膠囊	半顆無法計價
	Cymbalta 60	膠囊	半顆無法計價
	Dalmadom	膠囊	半顆無法計價
	Dilantin	膠囊	半顆無法計價
	Duxetine 30	膠囊	半顆無法計價
	Easyfor SR	膠囊	仿單：藥品為控釋微粒，可以打開膠囊吞服；半顆無法計價
	Efexor XR 75	膠囊	仿單：藥品為控釋微粒，可以打開膠囊吞服；半顆無法計價
	Felpin ER	持續釋放錠	仿單：不可剝半或咬碎服用
	Flunazon	膠囊	半顆無法計價
	Gemd	膠囊	半顆無法計價
	Geodon	膠囊	半顆無法計價
	Imolex	膠囊	半顆無法計價
	Invega 3	持續釋放錠	仿單：特殊劑型，不可剝半或咬碎服用
	Invega 6	持續釋放錠	仿單：特殊劑型，不可剝半或咬碎服用
	Kentamin	膠囊	半顆無法計價
Milpran	膠囊	半顆無法計價	

	商品名	藥品劑型	說明
	Nicotinell	口嚼錠	半顆無法計價
	Olan 5	口溶錠	半顆無法計價
	Olanzapine-Waka 口溶錠	口溶錠	半顆無法計價
	Ponstal	膠囊	半顆無法計價
	Ritalin LA	持續釋放 膠囊	仿單：應整粒吞服，不可切、壓碎或嚼碎
	Soma	膠囊	半顆無法計價
	Sotalon	膠囊	半顆無法計價
	Stilnox CR	持續釋放 錠	仿單：不可壓碎、咀嚼或是折半
	Strattera 40	膠囊	半顆無法計價
	Syntam	顆粒	半包無法計價
	Seroquel XR 50	持續釋放 錠	英文仿單：必須整粒吞服且不可磨碎或咀嚼；中文仿單並無提及。
	Seroquel XR 200	持續釋放 錠	英文仿單：必須整粒吞服且不可磨碎或咀嚼；中文仿單並無提及。
	Seroquel XR 300	持續釋放 錠	英文仿單：必須整粒吞服且不可磨碎或咀嚼；中文仿單並無提及。
	Tramed 50	膠囊	半顆無法計價
	Wellbutrin XL	持續釋放 錠	仿單：應整粒吞服，不可切、壓碎或嚼碎
	Voltaren SR	緩釋膜衣 錠	仿單：為緩釋膜衣釋放錠，不可剝半或咬碎服用
	Zyprexa Zydis	口溶錠	半顆無法計價
建議不剝半	Depakin 200	腸溶錠	仿單：腸溶錠，剝半時對胃刺激性大
	Dulcolax	腸溶錠	仿單：腸溶錠，剝半時對胃刺激性大

附錄四：健保給付

全民健康保險藥品給付規定通則

四之(二) 因病情需要，經醫師指導使用方法由病人持回注射之藥品：

13. 抗精神病長效針劑（至多攜回一個月）。（87/4/1）

第 1 節 神經系統藥物 Drugs acting on the nervous system

1.2. 精神治療劑 Psychotherapeutic drugs

1.2.1. 選擇性血清促進素再吸收抑制劑 (SSRI)、血清促進素及正腎上腺素再吸收抑制劑 (SNRI) 及其他抗憂鬱劑 (fluvoxamine maleate、fluoxetine、paroxetine、sertraline、venlafaxine、milnacipran、mirtazapine、citalopram、escitalopram、duloxetine、agomelatine 等製劑)：(88/12/1、89/10/1、91/5/1、92/6/1、93/5/1、94/2/1、94/12/1、99/10/1、101/7/1)

使用時病歷上應詳細註明診斷依據及使用理由。

1.2.1.1. Bupropion HCL：(92/1/1、99/10/1)

作為戒菸治療者不予給付。

1.2.2. 抗精神病劑 Antipsychotics

1.2.2.1. Clozapine (如 Clozaril)

1. 限精神科專科醫師使用。

2. 前 18 週使用時，每週需作白血球檢驗，每次處方以七日為限，使用 18 週後，每月作一次白血球檢驗。

3. 申報費用時，應檢附白血球檢驗報告。

1.2.2.2. Second generation antipsychotics (簡稱第二代抗精神病藥品，如 clozapine、olanzapine、risperidone、quetiapine、amisulpride、ziprasidone、aripiprazole、paliperidone 等)：(91/9/1、92/1/1、92/7/1、94/1/1、95/10/1、97/5/1、99/10/1)

1. 本類製劑之使用需符合下列條件(95/10/1、97/5/1、99/10/1)：

(1) 開始使用「第二代抗精神病藥品」時需於病歷記載：

醫療理由或診斷，以及臨床整體評估表 (Clinical Global Impression，簡稱 CGI) 之分數。

(2) 經規則使用六至八週後，需整體評估其療效，並於病歷記載：臨床整體評估表之分數。

(3) 日劑量超過下列治療劑量時，需於病歷記載理由：

clozapine 400 mg/day

risperidone 6 mg/day

olanzapine 20 mg/day

quetiapine 600 mg/day

amisulpride 800mg/day (92/1/1)

ziprasidone 120mg/day (92/7/1)

aripiprazole 15mg/day (94/1/1)

paliperidone 12mg/day (97/5/1)

2.本類藥品不得使用於雙極性疾患之鬱症發作。(95/10/1)

3.Olanzapine 用於預防雙極性疾患復發時，限 lithium、carbamazepine、valproate 等藥品至少使用兩種以上，治療無效或無法耐受副作用時使用。(95/10/1)

1.2.3.Zaleplon、zolpidem、zopiclone 及 eszopiclone (98/1/1、98/5/1、98/10/1、102/11/1)

1.使用安眠藥物，病歷應詳載病人發生睡眠障礙的情形，並作適當的評估和診斷，探討可能的原因，並提供衛教建立良好睡眠習慣。(98/5/1)

2.非精神科醫師、神經科專科醫師若需開立本類藥品，每日不宜超過一顆，連續治療期間不宜超過 6 個月。若因病情需長期使用，病歷應載明原因，必要時轉精神科、神經科專科醫師評估其繼續使用的適當性。(98/5/1、98/10/1)

3.精神科、神經科專科醫師應針對必須連續使用本藥的個案，提出合理的診斷，並在病歷上詳細記錄。(98/5/1、98/10/1)

4.依一般使用指引不建議各種安眠藥併用，應依睡眠障礙型態處方安眠藥，若需不同半衰期之藥物併用應有明確之睡眠障礙型態描述紀錄，且應在合理劑量範圍內。(98/5/1)

5.對於首次就診尚未建立穩定醫病關係之病患，限處方 7 日內安眠藥管制藥品。(98/5/1)

6.zaleplon 成分藥品用於治療難以入睡之失眠病人，僅適用於嚴重，病人功能障礙或遭受極度壓力之失眠症患者，用於 65 歲以上病患時，起始劑量為每日 5mg (98/1/1、98/10/1)

7.成人病患使用 eszopiclone 成分藥品之起始劑量為睡前 1mg，最高劑量為睡前 3mg，65 歲以上病患之最高劑量為 2mg。(102/11/1)

1.3.神經藥物 Neurologic drugs

1.3.1.骨骼肌鬆弛劑 Skeletal muscle relaxants

1.3.1.1.Tizanidine HCl (如 Sirdalud tab)：(90/10/1)

限下列病患使用

- 1.神經系統疾病引起痙攣症狀之病例。
- 2.急性疼痛性肌肉痙攣病例。

1.3.2.抗癲癇劑 Antiepileptic drugs

1.3.2.1.Sodium valproate 注射劑 (如 Depakine Lyophilized Injection)(89/7/1、93/2/1、93/6/1、102/10/1)

限癲癇症病患使用，且符合以下其中之一項者使用：

- 1.對 phenytoin 注射劑無效或無法忍受 phenytoin 副作用且無法口服 valproic acid 之病患。
- 2.癲癇連續發作 (Seizure clusters) 之病患。
- 3.癲癇重積狀態(Status epilepticus) 之病患。

1.3.2.2.Gabapentin (如 Neurontin)、vigabatrin (如 Sabril)、tiagabine (如 Gabitril)、pregabalin (如 Lyrica)、zonisamide (如 Zonegran)、perampanel (如 Fycompa)、lacosamide (如 Vimpat)：(89/9/1、89/2/1、93/6/1、96/3/1、97/1/1、97/10/1、101/2/1、102/1/1、104/6/1、104/11/1)

限用於其他抗癲癇藥物無法有效控制之局部癲癇發作之輔助性治療(add on therapy)。

1.3.2.3.Topiramate (如 Topamax)(90/9/1、92/11/1、93/6/1、94/3/1、94/9/1、95/1/1、99/5/1、99/10/1)

限下列病患使用：

- 1.限用於其他抗癲癇藥物無法有效控制之局部癲癇發作之輔助治療(add on therapy)或作為第二線之單一藥物治療。

2.用於預防偏頭痛之治療（94/3/1、94/9/1、95/1/1、99/5/1、99/10/1）

(1)限符合國際頭痛協會偏頭痛診斷標準並有以下任一狀況之偏頭痛患者，且對現有預防藥物療效不佳或無法忍受副作用或有使用禁忌者使用。

I.即使使用急性藥物，反覆發作偏頭痛已嚴重影響到患者的日常生活。

II.特殊病例，如偏癱性偏頭痛、基底性偏頭痛、偏頭痛之前預兆時間過長或是偏頭痛梗塞等。

III.偏頭痛發作頻繁，每星期2次(含)以上。

(2)Topiramate 每日治療劑量超過 100mg 時，需於病歷詳細記載使用理由。

1.3.2.4. Levetiracetam（101/6/1、102/10/1）

1.一般錠劑膠囊劑（如 Keppra Film-Coated Tablets）：（97/1/1、101/6/1）

(1)限用於其他抗癲癇藥物無法有效控制之局部癲癇發作之輔助性治療 (add on therapy) 或作為第二線之單一藥物治療。

(2)十二歲以上青少年與成人病患之肌抽躍性癲癇發作之輔助治療。

2.緩釋錠劑膠囊劑（如 UFree ER、Nobelin XR）：（101/6/1）

限使用於十六歲以上病患之局部癲癇發作之輔助治療。

3.口服液劑（如 Keppra Oral Solution）：（97/4/1）

限用於其他抗癲癇藥物無法有效控制之局部癲癇發作之輔助性治療 (add on therapy)。

4.注射劑（如 Keppra 濃縮輸注液）：（101/3/1、102/10/1）

限癲癇症病患使用，且符合以下其中之一項者使用：

1.對 phenytoin 注射劑無效或無法忍受 phenytoin 副作用且無法口服 levetiracetam 之病患。

2.癲癇連續發作 (Seizure clusters) 之病患。

3.癲癇重積狀態(Status epilepticus) 之病患。

1.3.2.5. Lamotrigine (如 Lamictal)（97/10/1）

限下列病患使用：

1.限用於其他抗癲癇藥物無法有效控制之局部癲癇發作之輔助性治療(add on therapy)或作為第二線之單一藥物治療。

2.限使用於 18 歲以上成人且為雙極性疾患者，並依下列原則使用：

(1)急性鬱期: 限使用於鋰鹽、carbamazepine、valproate 藥品治療療效不佳或治療後由鬱症轉為躁症之個案。

(2)雙極性疾患之鬱症預防: 限使用於鋰鹽、carbamazepine、valproate 藥品治療療效不佳或無法耐受其副作用者，單純用於躁症預防者不得使用。

(3)日劑量超過 200mg 時，需於病歷記載理由。

1.3.2.6 Carbamazepine（100/8/1）

1.使用於新病患：

(1)處方使用 carbamazepine 成分藥品之前，應先檢查病患 IC 健保卡是否已註記曾檢測帶有 HLA-B 1502 基因，檢測結果為陽性者，不得開立 carbamazepine 成分藥品之處方。

(2)醫師欲為病患處方 carbamazepine 成分藥品前，應先詢問病患是否對該藥品有過敏病史，若為不確認者或未檢測者，宜先行作 HLA-B 1502 基因檢測。

2.使用於舊病患：

若病患已服用 4 個月以上，且確認未曾出現喉嚨痛、嘴巴破或皮膚症狀（如分散的斑

點或斑丘疹症狀)等類似 Steven-Johnson 症候群或其他不良反應時,可依病情繼續處方治療,但仍需提醒病患注意上述症狀之發生。

3.醫師為病患處方使用 carbamazepine 成分藥品,以日劑藥費申報者,應依規定詳實申報處方明細。

1.3.3.失智症治療藥品

1.限用於依 NINDS-ADRDA 或 DSM 或 ICD 標準診斷為阿滋海默氏症或帕金森氏症之失智症病患。

2.如有腦中風病史,臨床診斷為「血管性失智症」,或有嚴重心臟傳導阻斷(heart block)之病患,不建議使用。

3.需經事前審查核准後使用,第一次申請須檢附以下資料:

(1)CT、MRI 或哈金斯氏量表(Hachinski Ischemic Score)三項其中之任一結果報告。

(2)CBC, VDRL, BUN, Creatinine, GOT, GPT, T4, TSH 檢驗。

(3)病歷摘要。

(4)MMSE 或 CDR 智能測驗報告。

4.依疾病別及嚴重度,另規定如下:

(1)阿滋海默氏症之失智症

由神經科或精神科醫師處方使用。

I.輕度至中度失智症:

限使用 donepezil、rivastigmine 及 galantamine 口服製劑(90/10/1、92/1/1、95/6/1、100/3/1、102/8/1):

i.智能測驗結果為 MMSE 10~26 分或 CDR 1 級及 2 級之患者。

ii.使用前述三種藥品任一種後,三個月內,因副作用得換用本類另一種藥物,不需另外送審,惟仍應於病歷上記載換藥理由。其中 Epalon Tablets、NEPES Tablets、Nomi-Nox Tablets 等 3 種藥品,倘因副作用,需換用 donepezil、rivastigmine 或 galantamine 口服製劑之另一種藥物,需另經事前審查核准後使用。(93/4/1、102/8/1)

iii.使用後每一年需重新評估,追蹤 MMSE 或 CDR 智能測驗,如 MMSE 較前一次治療時減少 2 分(不含)以上或 CDR 退步 1 級,則應停用此類藥品。惟 Epalon Tablets、NEPES Tablets、Nomi-Nox Tablets 等 3 種藥品,使用後每一年需重新評估,追蹤 MMSE 或 CDR 智能測驗,如 MMSE 較起步治療時減少 2 分(不含)以上或 CDR 退步 1 級,則應停用此類藥品。(98/1/1、99/5/1、102/8/1)

iv.使用 rivastigmine 貼片劑(如 Exelon Patch),每日限用一片,且不得併用同成分之口服藥品(100/3/1)。

II.中重度失智症:

限使用 memantine 口服製劑(95/6/1、99/10/1、102/8/1)

i.智能測驗結果為 $10 \leq \text{MMSE} \leq 14$ 分或 CDR 2 級之患者。

ii.曾使用過 donepezil, rivastigmine, galantamine 其中任一種藥品之患者,若不再適用上述其中任一藥物,且 MMSE 或 CDR 智能測驗達標準($10 \leq \text{MMSE} \leq 14$ 分或 CDR 2 級),並經事前審查核准後得換用 memantine。惟 memantine 不得與前項三種藥品併用。

iii.使用後每一年需重新評估,追蹤 MMSE 或 CDR 智能測驗,如 MMSE 較前一次治療

時減少 2 分(不含)以上或 CDR 退步 1 級，則應停用此類藥品。惟 Ebixa Tablets 及 Evy Tablets 等 2 種藥品，使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 或 CDR 智能測驗，如 MMSE 較起步治療時減少 2 分(不含)以上或 CDR 退步 1 級，則應停用此類藥品。(98/1/1、99/5/1、102/8/1)

III. 重度失智症：(99/10/1、102/8/1)

限使用 donepezil 及 memantine 口服製劑 (102/8/1)

- i. 智能測驗結果為 MMSE 5-9 分且 CDR 3 級之患者。
- ii. 臥床或無行動能力者不得使用。
- iii. 曾使用過 memantine, donepezil, rivastigmine, galantamine 而不再適用者，不得使用。
- iv. donepezil 及 memantine 二者不能併用。
- v. 使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 智能測驗，如 MMSE 較前一次治療時減少 2 分(不含)以上，則應停用此類藥品。惟 Epalon Tablets、NEPES Tablets、Nomi-Nox Tablets、Ebixa Tablets 及 Evy Tablets 等 5 種藥品，使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 智能測驗，如 MMSE 較起步治療時減少 2 分(不含)以上，則應停用此類藥品。(99/10/1、102/8/1)

(2) 帕金森氏症之失智症(99/5/1、100/3/1、102/8/1)

限神經科醫師診斷及處方使用於輕度至中度之失智症。

限使用 rivastigmine 口服製劑 (102/8/1)

- I. 智能測驗結果為 MMSE 10~26 分或 CDR 1 級及 2 級之患者。
- II. 失智症發生於帕金森氏症診斷至少一年以後。
- III. 使用後每一年需重新評估，追蹤 MMSE 或 CDR 智能測驗，如 MMSE 較前一次治療時減少 2 分(不含)以上或 CDR 退步 1 級，則應停用此類藥品。(99/5/1、102/8/1)

備註:起步治療定義:係指同組藥品第一次申請同意治療之評分

1.3.4. 帕金森氏症治療藥品：(91/11/1、93/2/1、95/9/1、96/9/1、97/7/1、100/6/1、101/6/1)

1. 如病人開始出現功能障礙，在使用 levodopa 之前或同時，得使用一種 dopamine agonist (ropinirole、pramipexole、pergolide、lisuride 及 rotigotine)，或 amantadine，或是 levodopa 併用 COMT 抑制劑 (entacapone：如 Comtan film-coated tab.)
2. Levodopa + carbidopa + entacapone 三合一製劑 (如 Stalevo Film-Coated Tablets 150/37.5/200mg 等 3 品項)：
限用於表現藥效終期運動功能波動現象，以左多巴/多巴脫羧基酶抑制劑無法達到穩定治療效果之巴金森氏症病人。(95/9/1)
3. 若已同時使用上述藥物且達高劑量，仍無法達到滿意的 "on" state，或出現運動併發症 (如異動症或肌強直)，需合併使用多類藥物治療時，應於病歷上詳細記載理由。
4. Rasagiline：(101/6/1)
 - (1) 可單獨使用，每日最高劑量為 1 mg；或與 levodopa 併用，rasagiline 每日最高劑量為 0.5 mg。
 - (2) 本品不得與 levodopa 以外之其他帕金森氏症治療藥品併用。
5. Pramipexole 及 ropinirole 用於治療原發性腿部躁動症時需先排除腎衰竭、鐵缺乏症及多發性神經病變，且不得與 dopamine agonist 及 levodopa 併用。(96/9/1、97/7/1)
 - (1) pramipexole 每日最大劑量為 0.75mg。(96/9/1)

(2)ropinirole 每日最大劑量為 4mg。(97/7/1)

6.Rotigotine 貼片劑(如 Neupro Patch),限用於原發性帕金森氏症,每日限用一片,且不得併用其他 dopamine agonist 之口服藥品(100/6/1)

1.3.5.注意力不全過動症治療藥品 methylphenidate HCl 緩釋劑型(如 Concerta Extended Release Tablets); atomoxetine HCl(如 Strattera Hard capsules)(93/9/1、96/5/1、96/9/1、97/5/1)

1.限六歲至十八歲(含),依 DSM 或 ICD 標準診斷為注意力不全過動症患者且對短效型 methylphenidate(如 Ritalin)治療之副作用無法耐受,或治療一個月以上,療效不佳者使用,並於病歷上記載使用理由。(96/9/1)

2.如符合前項規定且已使用本類藥品治療半年以上,而十八歲後仍需服用者,需於病歷上詳細記載以往病史及使用理由。(96/9/1)

3.Atomoxetine HCl 原則上每日限使用 1 粒,惟每日劑量需超過 60mg 時,應於病歷中記載理由,則每日至多可使用 2 粒,每日最大劑量為 100mg。(97/5/1)

1.3.6.Modafinil(如 Provigil Tablets 200mg)給付規定:(96/2/1)

同時需符合下列條件:

1.限猝睡症(narcolepsy)患者有日間過度睡眠症狀,且使用 methylphenidate 無效或無法忍受其副作用時使用。

2.猝睡症之診斷需符 2005 年國際睡眠障礙分類標準(International Classification of Sleep Disorder II, ICSD II),且夜間多頻睡眠檢查(nocturnal Polysomnography, PSG)和之後隔日之日間多次入睡睡眠檢查(Multiple Sleep Latency Test, MSLT)需顯示前一夜睡眠至少有 6 小時,MSLT 之平均入睡潛伏期(sleep latency)需小於或等於 8 分鐘,並需至少有兩次或以上之入睡出現之快速動眼睡眠(Sleep-onset REM periods (SOREMP))。

3.日間過度睡眠持續至少 3 個月以上,應有客觀評估,如成人的愛普沃斯嗜睡量表 ESS(Epworth sleepiness Scale)需高於 9 分,或兒童青少年日間嗜睡量表 PDSS(Pediatric daytime sleepiness Scale)或史丹福嗜睡評量表 SSS(Stanford sleepiness scale),且需排除阻塞性睡眠呼吸障礙(obstructive sleep apnea)、週期性下肢抽動(Periodic leg movement disorder)和睡眠相位後移症候群(Delayed sleep phase syndrome)等造成日間過度睡眠之可能性。

4.限有睡眠實驗室之醫院之神經內科、精神科、胸腔內科、耳鼻喉科專科醫師使用。

5.經事前審查核准後使用。首次申請時需檢附以下資料:1.病歷紀錄 2.ICSD II 診斷 3.PSG 報告 4.MSLT 報告 5.日間過度睡眠量表,如 ESS、PDSS、SSS 等。使用後每 3-6 個月施測日間過量睡眠症狀量表 ESS、或 PDSS、SSS,以評估療效。

6.使用期程:第 1 次申請獲准 1 年後,需重新進行 MSLT 檢查以評估客觀療效,並同時檢附過去 1 年之 ESS 或 PDSS、SSS。連續 2 年申請,如病人服藥順從性高,且藥效確定,則可每次核准 3 年。否則仍需每年申請 1 次,若 ESS 或 MSLT 其中之一顯示療效不佳,應即停用。

7.限制每日最大劑量 200mg。

第 10 節 抗微生物劑 Antimicrobial agents

10.1. 抗微生物劑用藥給付規定通則：

1. 凡醫師診斷為感染症，確有臨床需要者得適當使用抗微生物製劑。
2. 門診使用抗微生物製劑以不超過三日份用量為原則。如有必要，每次以七日為限；慢性骨髓炎病患得視病情需要延長抗微生物製劑給藥日數，惟每次門診處方仍以兩週為上限(87/7/1)。
3. 「上呼吸道感染病患」如屬一般感冒 (common cold) 或病毒性感染者，不應使用抗生素。如需使用，應有細菌性感染之臨床佐證，例如診斷為細菌性中耳炎、細菌性鼻竇炎、細菌性咽喉炎，始得使用抗生素治療 (90/2/1)。
4. 使用抗微生物製劑，宜以同療效、價廉為原則。使用三種抗微生物製劑(含)以上，需附微生物培養及藥物敏感試驗報告，藥物敏感試驗報告應包括第一線及第二線抗微生物製劑及各類常用藥物；同類同抗菌範疇之抗微生物製劑，若未能都進行藥物敏感性試驗時，得以其中之一種藥物的敏感性試驗結果做為使用其他同類同抗菌範疇藥物合理性之判定參考。(87/4/1)
5. 使用抗微生物製劑應以本保險規定之第一線抗微生物製劑優先使用，如欲使用第一線以外之抗微生物製劑，需依規定第 6、7 項辦理。
6. 醫師得按下列病情及診斷於進行微生物培養及藥物敏感試驗後直接使用第一線以外抗微生物製劑，惟若微生物培養證明第一線抗微生物製劑有效，應考慮改用第一線抗微生物製劑。(91/4/1)
 - (1) 感染病情嚴重者，包括：
 - I. 敗血症(sepsis)或敗血性休克(septic shock)
 - II. 中樞神經感染
 - III. 使用呼吸器者。
 - (2) 免疫狀態不良併發感染者：
 - I. 接受免疫抑制劑。
 - II. 接受抗癌化學療法。
 - III. 白血球數在 1000/cumm 以下或多核白血球數在 500/cumm 以下。
 - (3) 經感染症專科醫師會診，確認有感染症需使用者 (申報費用時需檢附會診紀錄及相關之病歷資料) (86/10/1、92/9/1)。
 - (4) 手術中發現有明顯感染病灶者。
 - (5) 脾臟切除病人有不明原因發熱者。
 - (6) 臟器穿孔。
 - (7) 嚴重污染傷口病人。
 - (8) 患疑似感染之早產兒及新生兒 (出生二個月以內)。
 - (9) 發生明確嚴重院內感染症者。
 - (10) 常有厭氧菌與非厭氧菌混合感染之組織部位感染時(如糖尿病足部壞疽併感染、骨盆腔內感染)，得直接使用可同時治療厭氧菌與非厭氧菌多重感染之單一非第一線抗微生物製劑。
7. 醫師得按下列病情改用第一線以外抗微生物製劑：

- (1)使用第一線抗微生物製劑超過 72 小時，經微生物培養及藥物敏感試驗證實對第一線抗微生物製劑具抗藥性，確有需要使用者，並請檢附該檢驗報告。
- (2)每 72 小時更換第一線抗微生物製劑一次，歷經 7 日以上仍無效，由其他醫療機構轉送至有微生物培養室醫院病人者。
- (3)嬰幼兒（出生二個月以上至滿五足歲）患疑似感染疾病，在使用第一線抗微生物製劑 72 小時仍無明顯療效者。

8.預防性的使用抗微生物製劑：(105/2/1)。

(1)清淨的手術：大致可分甲、乙兩類。

甲類：如單純性疝氣手術、精索靜脈曲張手術、甲狀腺手術、乳房切除手術...等，原則上可「免用」抗微生物製劑，如需使用，可術前一劑量，手術時間超過二小時者得於術中追加一劑，使用之抗微生物製劑應以本表之第一線抗微生物製劑為限(90/2/1)。

乙類：如心臟手術、腦部手術、臟器移植手術及放置人工植入物之手術，原則上使用不可超過 24 小時，以本表之第一線抗微生物製劑為主；如需使用第一線以外之抗微生物製劑或超過 48 小時，請詳敘理由，俾利審查(90/2/1、95/6/1)

(2)清淨但易受污染的手術。

術野是清淨但術中易受污染，如肝膽胃腸手術、泌尿道手術、肺部手術、婦科手術、耳鼻喉科手術、牙科手術...等手術。原則上抗微生物製劑使用 24 小時，以本表之第一線抗微生物製劑為主，若有厭氧菌與嗜氧菌混合污染之可能時，得使用 Cephamycin (cefoxitin, cefmetazole) 或 ampicillin 類合併 β -lactamase inhibitor (ampicillin/sulbactam, amoxicillin/clavulanic acid) 之藥物；如需使用第一線以外之抗微生物製劑或超過 48 小時，請詳敘理由，俾利審查(90/2/1、95/6/1)。

(3)免疫不全病人經醫師判斷感染風險高，依實證及流行病學資料及相關治療指引等，經感染症專科醫師認定需使用者，得適當使用預防性抗微生物製劑。申報費用時需檢附會診紀錄及相關之病歷資料。(105/2/1)。

9.污染性傷口之手術及手術後發生感染併發症，依本保險規定之抗微生物製劑使用原則用藥(90/2/1)。

10.本保險第一線抗微生物製劑範圍暫訂如附表一，並得視實際需要予以增減。

11.使用本表以外之抗微生物製劑超過七日時，除需附微生物培養與敏感試驗報告外，尚需附相關檢驗報告(如血、尿...等)與 TPR chart 影本並註明使用抗微生物製劑之規格、劑量、使用日期以利審核。

12.非第一線抗微生物製劑其於本藥品給付規定中另訂有規定者，依各該規定給付之。

13.有關結核病治療選擇的藥物種類、使用的劑量與治療的時程，應依衛生福利部疾病管制署最新版「結核病診治指引」辦理(網址

<http://www.cdc.gov.tw/ct.asp?xItem=5710&ctNode=1540&mp=230>)。(99/11/1、102/7/23)

10.2.盤尼西林類 Penicillins

10.2.1.Amoxicillin + clavulanic acid (如 Augmentin tab)：(85/1/1)

用於

- 1.急性化膿性中耳炎或急性化膿性鼻竇炎。
- 2.急性下呼吸道感染。
- 3.厭氧性細菌感染。

4.菌血症等適應症，得免附細菌敏感試驗報告，惟以十日為限。

附表一 全民健康保險醫療常用第一線抗微生物製劑品名表


口 服	注 射
Amoxicillin	Amphotericin B
Ampicillin	Ampicillin
Bacampicillin	Benzathine penicillin
Cefadroxil	Cefazolin
Cephalexin	Cephalexin (87/7/1)
Cephradine	Cephaloridine
Clindamycin	Cephalothin
Cloxacillin	Cephapirin
Colistin	Cephradine
Dicloxacillin	Clindamycin
Doxycyclin	Cloxacillin
Ethambutol (EMB)	Doxycycline
Flucloxacillin (102/10/1)	Gentamicin
Griseofulvin	Hetacillin
Hetacillin	Kanamycin
Isoniazid(INH)	Lincomycin (限用 10mL 包裝)
Ketoconazole (104/1/1 刪除)	Metronidazole
Methacycline	Oxacillin
Metronidazole	Oxytetracycline
Minocycline	Penicillin
Mycostatin	Rifamycin sv inj (限用於結核菌感染症)
Nalidixicacid	Rolitetracycline
Neomycin	Streptomycin
Nitrofurantoin	Flucloxacillin (94/3/1)
Nitroxoline	
Oxytetracycline	
Penicillin	
Pyrazinamide (PZA)	
Rifampicin (限用於結核菌感染症)	
Tetracycline	
Trimethoprim/ sulfamethoxazole	
Cefatrizine (97/9/1)	

附錄五：本院使用服藥頻次

院內頻次	對應時間				服用次數
QD	0800				每天一次，早飯後用
BID	0800		1800		每天兩次，早.晚飯後服用
TID	0800	1300	1800		每天三次，三餐飯後服用
QID	0800	1300	1800	2100	每天四次，三餐飯後及睡前服用
AM	0800				每日一次，早飯後服用
AMHS	0800			2100	每天兩次，早飯後及睡前服用
AMN	0800		1800		每天兩次，早.晚上.飯後服用
AMPM	0800	1300			每天兩次，早.午.飯後服用
AMPMHS	0800	1300		2100	每日三次，早.午飯後及睡前服用
BIDHS	0800		1800	2100	每日三次，早.晚.飯後及睡前服用
TIDHS	0800	1300	1800	2100	每日四次，三餐飯後及睡前服用
HS				2100	每日一次，睡前服用
PM		1300			每日一次，午飯後服用
N			1800		每日一次，晚上.飯後服用
NHS			1800	2100	每天兩次，晚飯後及睡前服用
PMN		1300	1800		每天兩次，中午.晚.飯後服用
PMNHS		1300	1800	2100	每日三次，中午.晚.飯後及睡前服用
QN			1800		每日一次，晚上.飯後服用
AMAC	0700				每日一次，早飯前服用
PMAC		1200			每日一次，午飯前服用
NAC			1700		每日一次，晚上飯前服用
AMPMAC	0700	1200			每日二次，早.中午飯前服用
BIDAC	0700		1700		每日二次，早.晚.飯前服用
PMNAC		1200	1700		每日二次，中午.晚.飯前服用
TIDAC	0700	1200	1700		每日三次，三餐飯前服用
QIDAC	0700	1200	1700		每日四次，三餐飯前及睡前服用
QNPRN			1800		需要時 晚飯後服用
BIDPRN	0800		1800		需要時 早.晚飯後服用
PMPRN		1300			需要時 午飯後服用
TIDPRN	0800	1300	1800		需要時 三餐飯後服用
QIDPRN	0800	1300	1800	2100	需要時 每天用四次
HSPRN				2100	睡前需要時服用
1		1300			每日一次，中午飯後服用
6			1800		每日一次，晚飯後服用
8	0800				每日一次，早飯後服用
9				2100	每日一次，睡前服用
8169	0800	1300	1800	2100	每天四次，三餐飯後及睡前服用

院內頻次	對應時間				服用次數
816	0800	1300	1800		每天三次，三餐飯用服用
869	0800		1800	2100	每天三次，早.晚飯及睡前服用
69			1800	2100	每日二次，晚飯後及睡前服用
81	0800	1300			每日二次，早.中午.飯後服用
86	0800		1800		每日二次，早.晚飯後服用
89	0800			2100	每日二次，早飯後及睡前服用

附錄六：藥物不良反應通報作業流程



凱旋醫院 院內藥物不良反應通報

藥物不良反應 (ADR) 通報程序：病安異常事件—>提 ADR 小組討論—>藥劑科通報

「藥物不良反應」定義：

藥物不良反應(Adverse drug reaction)定義：基於證據、或是可能的因果關係，而判定在任何劑量下，對藥品所產生之有害的、非蓄意的個別反應。若發生嚴重藥物不良事件(SAE)則一定要向行政院衛生署通報，包括：

1. 死亡
2. 危及生命
3. 導致病人住院或延長病人住院時間
4. 造成永久性殘疾
5. 造成先天性畸形
6. 及其他需作處置以防永久性傷害。

附錄七：藥物交互作用

凱旋醫院 目前院內造成交互作用之藥物

1 = Avoid combination. (Risk always outweighs benefit)

2 = usually avoid combination. (Use combination only under special circumstances)

3 = Minimize risk. (Take action as necessary to reduce risk)

Acetaminophen

3.ethanol
3.isoniazid
3.phenobarbital
3.phenytoin
3.warfarin

Alprazolam

3.digoxin
3.erythromycin
3.fluoxetine
3.fluvoxamine
3.itraconazole

Amantadine

3.bupropion
3.trihexyphenidyl

Aripiprazole

2.amiodarone
3.carbamazepine
3.fluoxetine

3.itraconazole
3.ketoconazole
3.paroxetine
3.quinidine

Aspirin

3.antacids
3.captopril
3.chlorpropamide
3.ethanol
3 fluoxetine
3.milnacipran
2.ginkgo
2.ibuprofen
2.warfarin

Atenolol

2.valsartan

Bromocriptine

3.erythromycin
3.thioridazine

Bupropion

- 3.amantadine
- 3.clopidogrel
- 3.desipramine
- 3.dextromethorphan
- 1.phenelzine
- 3.ticlopidine

Carbamazepine

- 3 aripiprazole.
- 3.citalopram
- 3.clozapine
- 2.diltiazem
- 3.erythromycin
- 2.felodipine
- 3.fexofenadine
- 3.fluoxetine
- 3.fluvoxamine
- 3.grapefruit juice
- 3.haloperidol
- 3.imipramine
- 3.isoniazid
- 3.lamotrigine
- 3.lithium
- 3.methadone
- 3.methylphenidate
- 3.midazolam
- 3.oxybutynin
- 3.phenytoin
- 3.risperidone
- 3.simvastatin
- 3.thyroid
- 3.valproic acid
- 3.warfarin
- 3.ziprasidone

Chlorpromazine

- 3.clonidine
- 3.donepenzil
- 3.epinephrine

- 3.ethanol
- 2.levodopa
- 3.lithium
- 3.phenobarbital
- 3.propranolol
- 3.trazodone

Citalopram

- 3.carbamazepine.
- 2.moclobemide
- 3.thiazides
- 3.tramadol

Clomipramine

- 3.fluvoxamine
- 3.grapefruit juice
- 3.ibuprofen
- 2.moclobemide
- 3.olanzapine
- 1.phenelzine

Clonazepam

- 3.valproic acid

Clonidine

- 3.chlorpromazine
- 2.desipramine
- 3.milnacipran
- 2.mirtazapine
- 3.propranolol

Clozapine

- 3.carbamazepine
- 3.diazepam
- 2.fluvoxamine
- 3.lorazepam
- 3.valproic acid

Dextromethorphan

- 3.bupropion
- 3.fluoxetine

- 1.moclobemide
- 2.selegiline

Diazepam

- 3.clozapine
- 3.ethanol
- 3.fluoxetine
- 3.isoniazid
- 3.levodopa
- 3.rifampin

Diphenhydramine

- 3.donepezil
- 3.tamoxifen
- 2.thioridazine

Donepezil

- 3.chlorpromazine
- 3.diphenhydramine

Dopamine

- 3.phenytoin.

Duloxetine

- 2.fluvoxamine
- 3.lithium
- 2.paroxetine
- 3.tramadol
- 3.tryptophan

Felodipine

- 2.carbamazepine
- 3.erythromycin
- 3.grape juice

Fluoxetine

- 3.alprazolam
- 3.amitriptyline
- 3.aripiprazole
- 3.aspirin
- 3.carbamazepine

- 3.desipramine
- 3.dextromethorphan
- 3.diazepam
- 3.furosemide
- 3.haloperidol
- 3.lithium
- 3.ibuprofen
- 3.nefazodone
- 3.phenytoin
- 3.propranolol
- 2.tamoxifen
- 2.thioridazine
- 3.tramadol
- 3.tryptophan

Fluvoxamine

- 3.alprazolam
- 3.carbamazepine
- 3.clomipramine
- 2.clozapine
- 2.duloxetine
- 3.lithium
- 3.methadone
- 3.olanzapine
- 3.phenytoin
- 1.terfenadine
- 2.theophylline
- 2.thioridazine
- 3.warfarin

Haloperidol

- 3.carbamazepine
- 3.fluoxetine
- 3.lithium
- 3.tamoxifen

Imipramine

- 3.carbamazepine
- 3.fluphenazine
- 2.norepinephrine
- 3.phenylephrine

3.venlafaxine

Lamotrigine

3.carbamazapine

3.phenytoin

3.rifampin

3.valproic acid

Levodopa

2.chlorpromazine

3.diazepam

3.moclobemide

3.phenytoin

3.pyridoxine

Lithium

3.amitriptyline

3.carbamazepine

3.chlorpromazine

3.diclofenac

3.duloxetine

3.fluoxetine

3.fluvoxamine

3.haloperidol

3.mefenamic acid

3.methyldopa

3.milnacipran

3.phenytoin

3.theophylline

3.venlafaxine

Lorazepam

3.clozapine

3.loxapine

Mefenamic acid

3.lithium

Methadone

3.carbamazepine

3.fluvoxamine

3.grapefruit juice

3.haloperidol

3.phenobarbital

2.phenytoin

Methylphenidate

3.carbamazapine

Mirtazepine

2.clonidine

3.tramadol

Moclobemide

2.citalopram

2.clomipramine

1.dextromethorphan

3.levodopa

Nifedipine

3.phenobarbital

3.phenytoin

3.propranolol

3.rifampin

Olanzapine

3.clomipramine

3.fluvoxamine

Oxybutynin

3.carbamazepine

Paroxetine

3.aripiprazole

2.duloxetine

3.milnacipran

3.nefazodone

1.pimozide

2.tamoxifen

3.thiazides

2.thioridazine
3.tramadol

Phenytoin

3.acetaminophen
3.carbamazepine
3.dopamine
3.ethanol
3.fluoxetine
3.fluvoxamine
3.furosemide
3.lamotrigine
3.levodopa
3.lithium
2.methadone
3.midazolam
3.nifedipine
3.phenobarbital
3.pyridoxine
3.quetiapine
3.rifampin
3.theophylline
3.thyroid
3.valproic acid
3.warfarin

Propranolol

3.chlorpromazine
3.clonidine
3.fluoxetine
3.nifedipine
2.theophylline

Quetiapine

3.citalopram
3.phenytoin

Risperidone

3.carbamazepine
3.itraconazole

Sertraline

1.pimozide
3.tamoxifen
3.tramadol
3.warfarin

Thiazides

3.citalopram
3.paroxetine

Tramadol

3.amitriptyline
3.citalopram
3.duloxetine
3.fluoxetine
3.mirtazapine
3.paroxetine
3.venlafaxine

Trazodone

3.buspirone
3.chlorpromazine

Trihexyphenidyl

3.amantadine

Valproic acid

3.carbamazepine
3.clonazepam
3.clozapine
3.isoniazid
3.lamotrigine
3.phenobarbital
3.phentoin

Ziprasidone

3.carbamazepine
2.pimozide
2.thioridazine

附錄八：檢驗數據參考值

	Male				Female			
	通報 低值	參考值		通報 高值	通報 低值	參考值		通報 高值
Glucose AC	50	65	110	350	50	65	110	350
Glucose PC	50	65	200	500	50	65	200	500
BUN		7	20	50		7	20	50
Creatine		0.7	1.5	5		0.7	1.5	5
AST		5	35	500		5	35	500
ALT		0	40	500		0	40	500
CPK		27	168	1000		27	168	1000
LDH		95	205	500		95	205	500
Na	120	135	147	160	120	135	147	160
K	2.5	3.4	4.7	6.5	2.5	3.4	4.7	6.5
Cl	90	98	107	120	90	98	107	120
Lithium		0.6	1.2	1.5		0.6	1.2	1.5
CBZ		8	12	15		8	12	15
VALP		50	120	150		50	120	150
phenytoin		10	20	25		10	20	25
HLA-B1502		N	P	P		N	P	P
TPHA		N	P	P		N	P	P
WBC	3000	4000	9900	20000	3000	4500	10500	20000
Hgb	8	13.7	17.8		8	13.7	16	
Plt	< 50000	150	450		< 50000	150	400	

※ **P.S** 以上 **20** 項有異常才簡訊通報
 (其他項目可列印病房後，電話告知醫護人員)
 (以紙本核對，勿口頭告之)

附錄九：藥物不良反應評估表（Naranjo scale）

不良反應與藥物相關性之評估：	是	否	不知
1.以前是否有關於此種不良反應確定的研究報告？	+1	0	0
2.此種不良反應是否發生於服藥之後？	+2	-1	0
3.當停藥或服用此藥之解藥，不良反應是否減輕？	+1	0	0
4.停藥一段時間再重新服用此藥，同樣的不良反應是否再度發生？	+2	-1	0
5.有沒有其他原因（此藥物以外）可以引起同樣之不良反應？	-1	+2	0
6.當給予安慰劑時，此項不良反應是否會再度發生？	-1	+1	0
7.此藥物的血中濃度是否達到中毒劑量？	+1	0	0
8.對此病人而言，藥物劑量與不良反應的程度是否成正向關係？	+1	0	0
9.病人過去對同樣或類似藥物是否也產生同樣的不良反應？	+1	0	0
10 此項不良反應是否有客觀的證據證明是藥品引起的？	+1	0	0
判斷屬於下列何者： <input type="checkbox"/> ≤ 0：存疑； <input type="checkbox"/> 1-4 分：可能； <input type="checkbox"/> 5-8 分：極有可能； <input type="checkbox"/> ≥ 9 分：確定	總	分：	

1. 關於此種不良反應，以前是否有確定之研究報告？

※查詢並佐證一個ADR 是否已經有文獻報告，或曾有發生過的臨床案例報告。

2. 此種不良反應是否發生於服藥之後？

附錄十：可能影響 G-6-P-D 患者溶血之藥物

PARTIAL list of drugs and chemicals thought to be safe or unsafe in individuals with glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency*

Unsafe for class I, II, and III variants	Safe for class II and III variants•
Acetanilid	Acetaminophen
Dapsone	Aminopyrine
Furazolidone	Ascorbic acid (except in very high doses)
Methylene blue	Aspirin
Nalidixic acid	Chloramphenicol
Naphthalene (mothballs, henna)	Chloroquine
Niridazole	Colchicine
Nitrofurantoin	Diphenhydramine
Phenazopyridine	Isoniazid
Phenylhydrazine	L-DOPA
Primaquine	Menadione
Sulfacetamide	Paraaminobenzoic acid
Sulfamethoxazole Δ	Phenacetin
Sulfanilamide	Phenytoin
Sulfapyridine	Probenecid
Thiazosulfone	Procainamide
Toluidine blue	Pyrimethamine
Trinitrotoluene	Quinidine
Uricase (rasburicase, pegloticase)	Quinine
	Streptomycin
	Sulfamethoxypyridazine
	Sulfisoxazole
	Trimethoprim
	Tripelennamine
	Vitamin K

* Note: This is a partial listing only. See text for information on how to obtain a more comprehensive listing of safe and unsafe agents.

• Safety for class I variants is usually not known.

Δ The relative safety of this medication for patients with class II and III variants is unclear. See text for details.

Data from: Beutler, E, *Blood* 1994; 84:3613.



藥品索引

本索引同時收列藥物「商品名」及「成份名」，並將商品名以黑體字表現，以示區別。

Abilify 15, **34**
 Abilify 5, **34**
 Acetaminophen, 9
 Acetamionphen, 65
 Acetylsalicylic acid, 68
 Agomelatine, 55
 Al(OH)₃ · Mg(OH)₂, 69
 Alat, **75**
 Alepam, **24**
 Allopurinol, **26**
 Alprazolam, 19
 Ambroxol, **66**
 Aminophylline, 66
 Amisulpride, 32, 33
 Amoxicillin, **16**
 Anexate Inj, **83**
 Apa-Cymba 60, **48**
 Apa-Mirtazapine O.D.T., **46**
 Apa-Risdol 2, **42**
 Apo-Quetiapine, **40**
 Apo-Risperidone Solution, **43**
 Aricept 10, **7**
 Aripiprazole, 33, 34
 Aripiprazole 15, **33**
 Aripiprazole-Zydus, **33**
 Asiphylline inj, **66**
 Atenolol, 75
 Atomoxetine, 4
 Atropine inj, **57**
 Atropine sulfate, 57
 B.H.L. 5, **57**
 Baktar, **16**
 BC Cream, **27**
 Bendopar 125, **17**
 Betamethasone, 89
 Betetrim S.R., **47**
 Binin-U 10, **30**
 Binin-U 2, **29**
 Bisacodyl, 69
 Bokey, **68**
 Bromazepam, 19
 Bromazin, **19**
 Bromocriptine, 78
 Brotizolam, 20
 Buprenorphine/ Naloxone, 83
 Bupropion, 47
 Buscopan, **69**
 Calmday, **24**
 Carbamazepine, 59
 Carbatin, **59**
 Catapres, **75**
 Champix, **15**
 Chlorpromazine, 28
 Chlorzoxazone, 9
 Cirzodone, **56**
 Citalopram, 50
 Citosol inj, **13**
 Clomipramine, 54
 Clonazepam, 20, 21
 Clonidine, 75
 Clonopam 0.5, **21**
 Clonopam 2, **20**
 Clopran, **54**
 Clotiapine, 28
 Clozapine, 35, 36
 Clozaril 100, **35**
 Colian, **54**
 Concerta 27, **2, 4**
 Concerta 36, **4**
 Convulex 300, **62**
 Crestor, **77**
 Cyclobenzaprine, 9
 Cymbalta 30, **48**
 Cymbalta 60, **47**
 Dalmadorm, **22**
 Deanxit, **55**
 Denset, **55**
 Depakin 200, **61**
 Depakin 500, **62**
 Depakin Oral Sol'n, **61**

Depyretin, **65**
 Desud, **83**
 Dextromethorphan, 66
 Diabitin, **73**
 Diapine, **21**
 Diazepam, 21
 Diclofenac sodium, 68
 Dihydroergotoxine Mesylates, 7
 Dilantin, **60**
 Dimethicone, 69
 Diovan, **76**
 Dipachro S.R., **63**
 Diphenhydramine, 18
 Diphenhydramine inj, **18**
 Diphenidol, **78**
 Ditropan, **14**
 Dogmatyl, **31**
 Donepezil, 7
 Dopamine, 88
 Dopamine inj, **88**
 Doxepin, 54
 Dulcolax, **69**
 Duloxetine, 47, 48
 Duphalac, **70**
 Dupin Inj, **21**
 Duxetine 30, **48**
 Easyfor SR, **49**
 Ebixa, **7**
 Efexor XR 75, **49**
 Epinephrine, 88
 Epirenamin inj, **88**
 Erythromycin, 27
 Erythromycin Oph Oint, **27**
 Escipro, **51**
 Escitalopram, 50, 51
 Escitalopram-Zydus, **51**
 Estazolam, 22
 Eszo, **22**
 Etumine, **28**
 Eutac, **46**
 EVY F.C., **7**
 Exelderm cream, **27**
 Faxine, **50**
 Felodipine, 75
 Felpin, **75**
 Ferrous Fumarate 100mg, Cyanocobalamin
 4mcg, Folic acid 2mg, 86
 Fluanxol 3, **28**
 Fluanxol 5, **29**
 Fluanxol Inj, **29**
 Fludiazepam, 22
 Fluitran, **11**
 Flumazenil, 83
 Flunarizine, 79
 Flunazon, **79**
 Fluocinonide, 89
 Fluoxetine, 51
 Flupentixol, 28, 29
 Flupentixol 0.5mg, 55
 Flupentixol 0.5mg Melitracen 10mg, 55
 Flupine, **22**
 Flurazepam, 22
 Flurazin, **32**
 Fluvoxamine, 52
 Folic acid, 86
 Furosemide, 11
 Gabapentin, 59
 Gemd, 77
 Gemfibrozil, 77
 Geodon, **44**
 Gitose 5%, **81**
 Glibenclamide, 73
 Glucose, 80, 81
 Glucose 100mg, Calcium Chloride 20mg, 85
 Haloperidol, 29, 30
 Halopin, **30**
 Humulin R, **73**
 Hydergine, **7**
 Hydrocortisone, 89
 Hydrocortisone inj, **89**
 Hyoscine, 69
 Imipramine, 54

Imolex, **70**
 Inderal, **76**
 Insulin Human Regular, 73
 Invega 3, **39**
 Invega 6, **39**
 Kascoal, **69**
 KCl Inj, **85**
 Kentamin, **86**
 Kinax, **19**
 Kinlofe, **53**
 Kinxetin, **51**
 L.A., **60**
 Lactulose, 70
 Lamictal 100, **60**
 Lamictal 50, **59**
 Lamotrigine, 59, 60
 L-dopa 100 mg + benserazide 25mg, 17
 L-dopa 200 mg + benserazide 50mg, 17
 Lederscon, **69**
 Lendormin, **20**
 Lepax, **50**
 Levophed, **5**
 Lido Jelly, **12**
 Lidocaine, 12
 Lidocaine Inj, **12**
 Lilitin, **58**
 Liquor Ringer, **80**
 Lithium carbonate, 58
 Lodopin 25, **44**
 Lodopin 50, **45**
 Loperamide, 70
 Lorazepam, 23
 Lorazin, **23**
 Lote, **52**
 Luvox, **52**
 Madopar 250, **17**
 Magnesium oxide, 70
 Medicon, **66**
 Mefenamic acid, 68
 Memantine, 7
 Mepenzolate, 71
 Metformin, 73
 Methylphenidate, 2, 4, 5
 Metoclopramide, 71
 Mezapin, **36**
 MgO, **70**
 Milnacipran, 49
 Milpran, **49**
 Mirtan, **46**
 Mirtazapine, 46
 Moclobemide, 46
 Mucaine, **71**
 Musgud, **9**
 Naloxone, 83
 Naloxone inj, **83**
 Neuroquel 100, **40**
 Nicotine, 14
 Nicotinell, **14**
 Nifedipine, 75
 Nitroglycerin, 18
 Nitrostat, **18**
 Nodoff, **37**
 Noopol, **79**
 Nordazepam, 24
 Norepinephrine, 5
 Normal Saline 20, **81**
 Olan 5 □溶錠, **38**
 Olanzapine, 36, 37, 38
 Olanzapine-Waka, **36**
 Olzapine 10, **38**
 Oxazepam, 24
 Oxethazine 5mg Al(OH)₃ 126mg MgCO₃
 87.5mg, 71
 Oxybutynin, 14
 Paliperidone, 39
 Paroxetine, 52, 53
 Pelonine, **90**
 Phenytoin, 60
 Phenytoin 50mg Phenobarbital 20mg, 60
 Piracetam, 79
 Ponstal, **68**
 Potassium Chloride, 85

Potassium Gluconate, 85
 Prednisolone, 90
 Primperan inj, **71**
 Progesterone, 64
 Progesterone inj, 64
 Prometin, **71**
 Propranolol, 76
 Qeutialin 200, **40**
 Quetialin 25, **40**
 Quetiapine, 39, 40, 41
 Radi-K, **85**
 Relaxin, **9**
 Resonium A, **64**
 Rinderon Inj, **89**
 Risperdal 1, **42**
 Risperdal 2, **42**
 Risperdal Oral Sol'n, **43**
 Risperidal Consta 25, **44**
 Risperidal Consta 37.5inj, **44**
 Risperidone, 42, 43, 44
 Ritalin, **5**
 Ritalin LA, **5**
 Rivotril 0.5, **20**
 Rolikan inj, **81**
 Rosuvastatin, 77
 Secorine syrup, **66**
 Sennoside A+B, 72
 Seroquel 100, **39**
 Seroquel XR 200, **41**
 Seroquel XR 300, **41**
 Seroquel XR 50, **41**
 Seroxat, **52**
 Sertraline, 53
 Silence, **23**
 Sleepman, **25**
 Smokfree 10, **14**
 Smokfree 15, **14**
 Sodium Bicarbonate, 81
 Sodium chloride, 82
 Sodium Chloride 8.6mg Calcium chloride
 0.33mg, 80
 Sodium Chloride inj 0.9, **82**
 Sodium Polystyrene Sulphonate, 64
 Solian 200, **33**
 Solian 50, **32**
 Soma, **9**
 Sopid, **31**
 Sotalon, **24**
 Spiterin, **42**
 Stilnox, **25**
 Stilnox CR, **25**
 Stratterra, **4**
 Suboxone 2, **83**
 Succinyl Choline, 9
 Sulconazole, 27
 Sulfamethoxazole 400mg + Trimethoprim 80mg,
 16
 Sulpiride, 31
 Suopinchon, **11**
 Superide, **32**
 Susine, **31**
 Syntam, **79**
 Syntocriptine, **78**
 Tegol, **59**
 Tenolol, **75**
 Thiamine, 9, 86, 87
 Thiamylal, 13
 Through, **72**
 Tofranil, **54**
 Topsy cream, **89**
 Tramadol, 65
 Tramed, **65**
 Trancolon, **71**
 Trazodone, 55, 56
 Trazone, **55**
 Trichlormethiazide, 11
 Trifluoperazine, 32
 Trihexyphenidyl, 57
 Uformin, **73**
 Ultidep 20, **50**
 Uniclone, **25**
 Valdoxan, **55**

Valproic acid, 61, 62, 63
Valsartan, 76
Varenicline, 15
Venlafaxine, 49, 50
Vit.B1, **87**
Vitacal, **85**
Vitagen 10%, **81**
Vitagen 20%, **80**
Vitagen 50%, **80**
Vitamin B1 inj, **86**
Voltaren SR, **68**
Wanse, **86**
Water for Injection, **82**
Wellbutrin XL, **47**
Winsumin, **28**

Xanax 0.25, **19**
Xanax 0.5, **19**
Xet, **53**
Zaleplon, 24
Zapine, **35**
Ziprasidone, 44
Zoloft, **53**
Zolpidem, 25
Zonin, **45**
Zopiclone, 25
Zotepine, 44, 45
Zydis □溶錠, **37**
Zyprexa 5, **38**
 γ -Benzene hexachloride, 27