

“瑪科隆” **佳立鈣錠** 500毫克
A-Cal Tablets 500mg “MACRO”

【成分】

※有效成分及含量：每錠中含Calcium Carbonate 500mg

※其他成分(賦形劑)：Manitol · Prejel · Tartrazine · Sodium saccharine · Milk flavor powder · Magnesium stearate

【用途(適應症)】緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用
(一)曾因本藥成分引起過敏的人。
(二)未滿三個月之嬰兒。
- 二、有下列情形者，使用前請先洽醫師診治
(一)3歲以下。
(二)消化道潰瘍的人。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生
(一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
(二)與其他藥品併用時。
- 四、其他使用上注意事項
(一)為防止兒童誤食請妥善保管。
(二)避免陽光直射。
(三)勿超過建議使用量。
(四)一天內不可服用超過一日最大使用量，也不可連續服用一日最大使用量兩週以上。
(五)制酸劑之錠劑應嚼碎後吞服。
(六)本藥不得併服其他藥品。
(七)本藥含有碳酸鹽之制酸成分，可能引起腹脹、打嗝。

【用法用量】一天3至4次，或需要時服用。應嚼碎後吞服。

| 年齡 | 使用量 |
|-----------|----------------|
| 12歲以上~成人 | 每次1錠 |
| 6歲以上未滿12歲 | 每次1/2錠 |
| 3歲以上未滿6歲 | 每次1/4錠 |
| 3歲以下之嬰幼兒 | 請洽醫師診治，不宜自行使用。 |

【作用】中和胃酸，單次劑量(1錠)之酸中和能力為9.0mEq以上。

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

| 身體部位 | 副作用 |
|------|---------------------------------|
| 胃腸道 | 腹脹、打嗝、噁心、嘔吐、便秘、腹瀉、慢性胃痛、胃部不適或灼熱感 |
| 神經系統 | 頭痛、意識不清、厭食 |
| 其他 | 高血鈣、腎衰竭、鹼中毒 |

- 二、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並接受醫師診治。
 1. 若有任何不適情況產生。
 2. 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

【包裝】6-1000錠PTP鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲存條件】貯存於室溫25°C以下，避光。

*本藥主成分碳酸鈣為天然原料，帶有無法完全去除之微量黑點，若錠劑偶有發現，業經檢測無虞。

委託者：瑪科隆股份有限公司

地 址：台中市西區忠明南路303號18樓之3

製造廠：羅得化學製藥股份有限公司

地 址：台中市大甲區東西七路一段65號