



安汀復[®]錠 2 毫克

Akinfree[®] Tablets 2 mg

- 【藥理作用】** 本劑可有效治療藥物引起之帕金森氏症，及各種帕金森氏症的輔助治療劑。
帕金森氏病的引起是因中樞部位的紋狀體內的膽素性神經興奮性及多巴胺性神經之抑制性之間的不平衡所致。本劑為作用在CNS的cholinergic synapses拮抗ACH在感受體的結合，可治療肌肉僵硬和動作無力感及減少唾液分泌。
- 【成份】** Each tablet contains:
Biperiden Hydrochloride.....2mg
- 【賦形劑】** Lactose、Avicel、Hydroxy Propyl Cellulose L、Starch、Primojel、Magnesium Stearate
- 【適應症】** 帕金森氏症
- 【用法用量】** 每天3~4次，每次1粒。
本藥須由醫師處方使用。
- 【副作用】** 偶有口乾、精神激昂、視力模糊、嗜睡或定向力障礙、姿勢性低血壓、便秘、行為障礙等副作用發生。
- 【注意事項】** 1. 具有狹角性青光眼、腸障礙、巨腸結者及對Biperiden過敏者均不可使用。
2. 服用本劑劑量過量，或同時投予抗副交感神經製劑時，可能會產生精神紊亂、精神欣快、情緒激動、行為障隘等現象。
3. 同時服用本劑與類似抗副交感神經作用製劑時可能會產生中樞抗副交感症狀，這些製劑包括一般止痛劑，如：meperidino, phenothiazines 和其它抗精神藥及三環抗抑鬱藥物。一般抗心律不整藥物，如：quinidine 鹽類和抗組織胺。
4. 孕婦除非必要請勿使用本劑。
5. 小孩使用本劑之安全性和有效性尚未被評估，故請勿使用本劑。
- 【貯存條件】** 25℃以下儲存。
- 【包裝】** 6~1000粒塑膠瓶裝，鋁箔盒裝。

製造廠：瑞士藥廠股份有限公司新市廠
廠址：台南市新市區中山路182號
委託製造者：新瑞生物科技股份有限公司
地址：台南市中西區民權路2段158號2樓