



華興製藥

抗巴金森治療劑

“華興” **亞 冒 淨** 錠100公絲
(阿曼他定)

Amandine Tablets 100mg "H.S."
(Amantadine)

衛署藥製字第029702號

(G-0636號)

Amandine一般被命名為Amantadine Hydrochloride具有抗巴金森症作用。

《成 分》

每錠含：Amantadine Hydrochloride.....100mg

《賦 形 劑》

Povidone、Starch、Lactose、Cellulose Microcrystalline、
Colloid Silicon Dioxide、Magnesium Stearate、Talc、Tartrazine

《適 應 症》

巴金森病、預防及治療A型流行性感冒症狀。

《用法用量》

成人一般劑量為一天200mg，分二次服用，其作用時間在48小時內開始，初劑量為一天100mg，在服用到數週後，劑量可增加到一天200mg，分二次服用，若尚未達理想狀況，可以增加到一天400mg分數次服用。

本藥須由醫師處方使用。

《注意事項》

具有癲癇病史或者其他猝發經驗的病人，應該在嚴密的觀察下，注意可能的增加猝發程度。

具有充血性心臟病病史或末梢血管水腫之病人，需被緊密跟隨，因部份病人在服用之後會有衍發充血性心臟病。因為Amandine而改善的巴金森病人，應該謹慎漸漸地恢復正常活動，以配合其他醫學上的因素，例如骨质疏松症或靜脈栓塞的出現。使用Amandine的病人，當他注意到有中樞神經系統作用或視力模糊時，應接受警告避免開車及從事需要機警性的工作。

Amandine治療過程中，不可突然停藥，否則病情惡化。

當anticholinergic藥和Amandine共同使用時，而發有atropine-like作用產生時，則藥量必須減少。

當病人患有腎臟疾病、充血性心臟病、末梢血管水腫或姿態性低血壓時，要謹慎用藥，因為Amandine不被代謝，主要由尿中排泄，故當腎功能不好時，它將會蓄積下來。

當Amandine被投與肝病患者，再發性濕疹樣癢腫病史，或精神病患者，或未用化學治療劑控制的嚴重之精神、神經病患者，小心是必要的。

當Amandine與中樞神經刺激劑共同使用時，小心觀察是必要的。

對於致痛可能性及遺傳突變可能性並無任何實驗評估。

成人緩慢靜脈注射physostigmine 1~2mg劑量，在1到2小時內；而小孩劑量0.5mg在5到10分鐘內，可有效控制Amandine所引起的中樞神經系統之毒性。

在急性服用過量時，除一般性測量外，腸胃道灌洗或催吐，立刻採用。液體要強迫補充，需要時可用靜脈補充，尿中的酸性會影響Amandine的排泄，當尿為酸性時，排泄速率會增快。若使用使尿液酸性化的藥物，會使藥物從體內濾清加速。血壓、脈搏、呼吸、體溫要被監視注意。患者需要觀察是否活動過度和痙攣，假如需要鎮靜和抗痙攣藥物治療可採用。注意患者心律不整及低血壓可能的發展，假如需要正確的抗心律不整，抗低血壓治療是可以給與的。

血中電解質、尿中酸鹼度及尿流出量要監視注意，如果最近沒有排泄紀錄，必須作導尿措施。

新生兒及一歲下之嬰兒使用Amandine的安全性及功效尚未被建立。

較常見而嚴重的副作用是抑鬱充血性心臟病、偶發性姿態性低血壓、精神病、尿滯留，而少數的痙攣、白血球減少、嗜中性白血球症，曾被報告過。

其他較不嚴重的如幻覺、紊亂、不安、焦慮、厭食、噁心、便秘、運動失調、眩暈、網狀青斑、末梢血管水腫。

較不常見如嘔吐、口乾、頭痛、呼吸困難、疲勞、失眠虛弱感。

罕見的為皮膚潮紅、言語障礙、視力障礙。

最少的是濕疹樣皮膚病。

《儲 存》

儲存於25°C以下。

《包 裝》

4~1000粒瓶裝。

華興化學製藥廠股份有限公司

彰化縣田尾鄉饒平村四維巷128號

服務專線：(04)8832121~6