

**B.H.L. Tablets** 2 mg 頸立靜錠 2 公絲 衛署藥製字第 046118 號  
5 mg 5 公絲 衛署藥製字第 046236 號  
本藥須由醫師處方使用

成分：B.H.L. Tablets 2mg 每錠含 benzhexol hydrochloride 2mg。

B.H.L. Tablets 5mg 每錠含 benzhexol hydrochloride 5mg。

適應症：帕金森氏症候群。

說明：帕金森氏病、精神抑鬱、冷漠和因中樞神經系統之藥物(如：reserpine、phenothiazines)引起的錐體束外症狀，這些病況包括會產生震顫、流涎現象。

注意事項：對尿滯留、心臟血管疾病、肝或腎損害等，應避免突然的停止治療。

禁忌：青光眼。

副作用：口乾、胃腸不適、眩暈、亂視、降低心搏、減低敏感反應；對敏感的病人、精神混亂、易激動和精神病患，需長期治療。

用法用量：一天 1~2 公絲，分次使用，逐漸增加劑量；維持劑量 5~15 公絲，分次使用。

貯藏：貯存於室溫，避免在潮濕的溫度。

包裝：2~1000錠塑膠瓶裝。

委託製造者：



台灣美強股份有限公司

台北市南京東路二段 66 號 4 樓

製造廠：中國化學製藥股份有限公司

新豐工廠：新竹縣新豐鄉坑子口 182-1 號

BHL-ins.v1