



伯基[®] 腸溶微粒膠囊 100 公絲 (乙醯水楊酸)

Bokey Enteric-Microencapsulated 100mg (Aspirin)

衛署藥製字第 037344 號

乙醯水楊酸(Acety Salicylic Acid), 以下簡稱 ASA) 是傳統用於解熱鎮痛的良藥, 近來隨著醫藥界的研究發現, ASA 具有預防心臟病的功效, 但經由研究更發現, ASA 經低劑量投與後, 具有不可逆性阻斷 ThromboxaneA2(一種血管收縮素)行成之作用, 而能減少血栓形成。但在高劑量下, ASA 卻會抑制血管內皮中 Prostacyclin(一種血管鬆弛素)之合成。因此, 對心肌梗塞之防治而言, 具有不利的影響。又市售一般乙醯水楊酸製劑之主成分均高達 500mg, 因此, 心血管疾病患者, 常需將藥片剝成數片, 而造成投藥之不便及劑量之誤差。有鑑於此, 本公司特別研製低劑量乙醯水楊酸腸溶微粒膠囊, 以供長期防治心血管性疾之藥選擇。此外, 精心設計之腸溶微粒新劑型, 不但可降低藥物對胃腸之刺激性又可確保投藥後之有效性。因此, 伯基腸溶微粒膠囊對於國人心血管性疾之防治, 應具深遠之治療意義。

【成分】: 每膠囊中含:

Aspirin 100mg

【作用】:

1. 本藥可經由促進環氧酶(Cyclo-oxygenase)之乙醯化而有效抑制循環內血小板 Thromboxane 之生成, 並進而緩解血管之痙縮及防止血小板之凝集。
2. 本藥之抗血小板凝集效應, 可延緩或降低血栓性栓塞疾病之發生及惡化。
3. 本藥亦可抑制 Thromboxan 於門脈循環中之生成, 而經由系統前代謝(肝代謝)後大多形成對血小板凝集不具影響性之代謝物 Salicylate。因此, 進入全身循環內之 Acetyl Salicylic Acid 濃度極低。顧殆不會抑制 Prostacyclin 之形成, 而干擾藥效的發揮。
4. 本藥內含以 Acetyl Salicylic Acid 為主成分之腸溶微粒, 可預防藥物於胃中崩散而造成腸胃不適, 並可藉由微粒之穩定釋放效果, 使患者獲得更安全、更有

效的治療成果。

【適應症】:

男性短暫性缺血性發作, 預防心肌梗塞, 預防心栓性栓塞症。

【用法·用量】:

每日 1 粒配服開水服用。

本藥須由醫師處方使用。

【禁忌症】:

1. 曾對本藥產生過敏反應之患者禁用本藥。
2. 嚴重肝、腎疾患、血友病或其他出血性疾患、糜爛性胃炎或消化性潰瘍患者禁用之

【一般注意】

1. 由於本藥使用後會延長出血時間, 故欲接受手術之患者應於手術前一週停藥。
2. 曾經因使用 Acetyl Salicylic Acid 發生氣喘之患者或消化性潰瘍患者應小心使用。
3. 本藥與抗凝血劑併用時宜謹慎監測血液之凝集情形。

【孕婦、授乳婦之投與】:

本藥使用於孕婦、受乳婦之安全性尚未確立, 而懷孕末期之孕婦應避免服用。

【新生兒、乳兒之投與】:

由於新生兒及乳兒之組織器官尚未發育完全, 宜先權衡治療之必要性方始投與。

【使用後之注意】:

本藥服用後, 若發生過敏或不適現象(如發疹、搔癢等), 請立即停藥並請教醫生或藥師。

【副作用】:

一般而言, 依指示每日服用 1 粒所產生之副作用極為輕微, 偶有胃腸不適、噁心、嘔吐、粘膜受損、潰瘍及隱發性血液流失現象, 而如眩暈、耳鳴、暫時性耳聾及代謝性酸中毒則與高劑量之投與有關。

【保存上之注意】:

1. 本藥應置於小兒伸手不及處，以免誤食，造成危險。
2. 室溫 (15~30°C) 儲存。
3. 請依外包裝標示，於有效期限內使用完畢。

【包裝】：

2~1000 粒瓶裝、盒裝。

永信藥品工業股份有限公司
YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.
公司地址：台灣省台中縣大甲鎮中山路1段1191號
電話：(04) 26875100
台中幼藥廠：台灣省台中縣大甲鎮日南里工九路27號