


抗組織胺劑
賽普寧錠
CYPRODIN TABLETS

衛署藥製字第002904號

- 【成分】每錠中含：
 Cyproheptadine HCl.....4mg
- 【賦形劑】Dried Starch、Lactose、Magnesium Stearate、Microcrystalline Cellulose、Saccharin Sodium、Silicon Dioxide、Talc、Tutti Frutti
- 【性狀】本劑之主要成分Cyproheptadine HCl也即1-Methyl-4-(5-dibenzo-[a,c] cycloheptatrienylidene)piperidine Hydrochloride，係無臭之白色～微黃色之結晶性粉末，本品1gm可溶於275ml之水，35ml之酒精，1.5ml之甲醇，16ml之氯仿，但不溶於乙醚，其融點為214～216℃，其構造式如右所示。
- 【作用】本劑係具有強力之抗組織胺作用及顯著之抗Serotonin作用之最新抗過敏性藥劑，對於過敏性疾患具有顯著之治療效果，尤其是對於過去使用其他抗組織胺劑而無效之症狀也可奏效。本劑服用30分鐘後即可發揮治療效果，通常皮膚疾患之搔癢或皮疹服用2～3日以內即可完全消失，其副作用比其他抗組織胺劑少，唯偶而有輕微之眠氣感但繼續服用即可消失。本劑之LD₅₀(Mouse):靜脈內24mg/kg，經口123mg/kg。
- 【適應症】蕁麻疹、過敏性皮膚炎、接觸性皮膚炎、濕疹、藥物疹、皮膚搔癢症、鼻炎、過敏性氣喘、枯草熱。
- 【用法·用量】通常成人一日3～4錠，小兒一日1 1/2～2錠，幼兒一日1/2～1錠，分3～4次服用之，視症狀適宜增減劑量。本藥須經醫師處方使用。
- 【包裝】100錠；500錠；1,000錠 塑膠瓶裝。



Code No.:E-10

強生化學製藥廠股份有限公司

JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS CO., LTD.

新北市241三重區三和路四段77、79號

訂貨專線：(02)29894756 FAX：(02)29712579

工廠電話：(02)22878405