



“國嘉” 喜普錠4毫克(鹽酸塞浦希他啉)

Cyproh Tablets 4mg "KOJAR" (Cyproheptadine Hydrochloride)

本品是一種具抗乙醯膽鹼和鎮靜作用，可加強抗組織胺和Serotonin antagonist的作用，並有Antimuscarinic和鈣離子阻斷效果，對一般之過敏反應，有緩解之療效。

【成份】

Each Tablet Contains :
Cyproheptadine Hydrochloride.....4mg

【賦形劑】

Lactose、Povidone、Sodium Lauryl Sulfate、Tartrazine Yellow No.4 Lake、Brilliant Blue FCF Aluminum Lake、Magnesium Stearate、Croscarmellose Sodium、Cellulose Microcrystalline、Colloid Silicon Dioxide、Sodium Starch Glycolate、Magnesium Aluminum Silicate

【適應症】

過敏性疾患如皮膚炎、鼻炎、蕁麻疹、搔癢症、枯草熱、藥物過敏症。

【用法用量】

一回4mg，一日1~3回。
本藥須由醫師處方使用。

【禁忌症】

1. 新生兒、早產兒、授乳之母親。
2. 對Cyproheptadine或MAOI 敏感者。
3. 青光眼、前列腺肥大、幽門狹窄、氣喘、年老虛弱之病人。

【注意事項】

1. 2歲以下孩童或虛弱之老年人，最好不要服用本品。
2. 小孩或嬰兒服用過量，會造成嗜睡、中樞神經抑制、痙攣、和死亡。
3. 老年人服用本品容易造成眩暈、鎮靜和低血壓，應注意。
4. 服用本品後，應避免操作機械或開車。

【交互作用】

1. 和酒精或中樞神經抑制劑併用具有相加作用。
2. MAO inhibitors會延長和加強本品抗乙醯膽鹼效果。

【副作用】

1. 精神神經系：嗜眠、倦怠感、頭痛、眩暈、興奮、錯亂。
2. 消化系：口渴、噁心、下痢、腹痛。
3. 過敏症：發疹、水腫、蕁麻疹、對光敏感。
4. 血液：紫斑、血小板減少、白血球減少。
5. 其他：頻尿。

【包裝】

2~1000錠瓶、鋁箔盒裝。

【儲存】

室溫避光保存(25°C)。

PIC/S GMP



國嘉製藥工業股份有限公司 幼獅三廠
KOJAR PHARMA TAICHUNG YOUTH PLANT 3

臺中市大甲區日南里工十路2號

服務專線：(04)26816197