

“台裕”

右旋糖 注射液 5%

衛署藥製字第 015218 號

DEXTROSE Injection 5% “Tai Yu”

「“台裕”右旋糖點滴注射液 5%」為葡萄糖之等張注射水溶液。葡萄糖可直接提供人體所需之營養及熱量。

〔成分〕

Each ml contains : Dextrose.....50.0mg

pH : 3.5~6.5。

熱量(cal/L) : 203。

滲透壓比：約 1。

〔適應症〕

外傷、手術等引起之失血、創傷性或出血性休克、脫水、水分缺乏、營養補給。

〔用法用量〕

本藥限由醫師使用。

(1).靜脈點滴注射：

成人每次 250~1000ml 靜脈點滴注射，投藥速度以葡萄糖計算每小時 0.5g/kg 體重以下為宜。兒童用量由醫師酌減使用，但投藥速度以每小時 50~100ml 為宜。

(2).靜脈注射：

成人每次 20ml 靜脈注射，依症狀由醫師增減之。

〔注意事項〕

(一)1.低張性脫水症之患者禁用。

2.缺鉀傾向之患者、糖尿病患者、尿崩症患者、腎功能不全之患者，應慎重投藥。

3.大量急速投藥，可能引起電解質喪失，應慎重投藥。

4.用前應詳予檢視，如溶液為澄清透明方可使用；輸液玻璃瓶裝者應再拍打瓶底，如有反彈之中空清脆聲(真空)，方可使用。

(二)取用時：

1.運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動，若發現有上述情形時，請勿使用。

2.若藥液有不澄清、變色、異物或其他異常現象時，請勿使用。

(三)輸液套選用及插入法：

1.請依輸液套使用方法正確使用。

2.請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞；插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。

3.使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。

〔賦形劑〕

Water for Injection。

〔貯藏方法〕

室溫避光貯存。

〔包裝〕

250、300、500、1000 毫升塑膠軟袋裝、250、500 毫升塑膠瓶裝、20 毫升玻璃安瓿裝，100 支以下盒裝。



台 裕 化 學 製 藥 廠 股 份 有 限 公 司
TAI YU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO.,LTD
新 竹 縣 竹 東 鎮 員 山 路 1 1 巷 1 3 弄 1 號
TEL : (03) 5826655 FAX : (03) 5822389