

寶齡 達多幫 錠 5 公絲 (奧斯必得寧)

DITROPAN Tablets 5mg (oxybutynin)

衛署藥製字第 027361 號

「成分」：每錠中含

Oxybutynin chloride 5mg

「作用」：

本品對平滑肌具抗收縮之作用，即抑制 Acetylcholine 對平滑肌之刺激作用，其 anticholinergic 之作用僅為 Atropine 之 1/5，但 antispasmodic 之作用則為 Atropine 之 4~10 倍，對骨骼神經結合處及自主神經節則不具破壞作用。

本劑能增加膀胱之尿容量，減少逼尿肌之收縮作用，而延長排尿時間，本劑之耐受性極佳。

「適應症」：

因膀胱神經之控制不適所伴隨排尿諸症之緩解。

「禁忌」：

不適用於患有青光眼、胃腸道阻塞、麻痺性腸塞絞痛、老年人或虛弱的病人所帶有之腸道弛緩、結腸巨大症、潰瘍性結腸炎、重症肌無力、尿道阻塞、心臟血管不適引起的急性出血。

「警語」：

在高溫度之環境下使用，因為會減少出汗的現象，所以會引起熱疲勞感，患者因迴腸造口術或結腸造口術或腸道阻礙而發生之下痢，不適使用本劑。服用本品可能會引起昏睡、視覺模糊，所以使用期間對於從事冒險工作者、汽車駕駛者等均應特別留神。

「懷孕期」：

動物實驗顯示無畸胎之不良結果，但臨床上孕婦之安全使用報告乃未確定，所以本品須經醫師指示方可使

用。

「注意事項」：

年老之患者、自發性神經患者、肝病、腎臟病等均應小心服用。對潰瘍性結腸炎之病患給予大量之 Ditropan，也許會發生麻痺性腸塞絞痛或結腸巨大症。甲狀腺機能亢進者、冠狀動脈心臟病者、充血性心臟衰弱者、心律不整者、心搏過速、血壓過高者、前列腺肥大者，都會因使用本品而加重其症狀。

「副作用」：

口乾、出汗減少、尿量停留、視力模糊、心搏加速、心跳加快、瞳孔放大、眼狀肌麻痺、眼內壓增加、嗜眠、虛弱、眩暈、失眠、噁心、嘔吐、便秘、浮腫、抑制哺乳、過敏反應等。

「用法用量」：

成人：通常一天 2~3 次，每次 1 粒，一天內不宜超過四次為限。

5 歲以上之小孩：通常一天 2 次，每次一粒或 1/2 粒，一天內不超過三次為宜。

本藥須由醫師處方使用

「包裝」：

4~1000 粒瓶裝。

