

亞典內用液(崙和費定) EA Ten Oral Solution (Trihexyphenidyl)

衛署藥製字第 031036 號

G-1099

(成 分) : Each ml contains :

Benzhexol HCl 0.4mg

(臨床效果) : 1.向精神藥投與所引起之帕金森氏症候群，運動困難，靜坐不能被認為有效。

2.對帕金森氏症候群主症狀之肌肉強剛、震顫、無動等錐體外路症狀有緩解之效果。

3.帕金森氏症候群引起流涎等自律神經症狀可加以改善。

4.帕金森氏症候群所發生之意慾低下，抑鬱等的精神症狀應得以改善。

(適 應 症) : 帕金森氏症候群。

(用法用量) : 本品應口服，並於三餐前後服用，通常成人第1天應服用 2mg 若患者已正作其他藥物治療者，則第1天應服用 1mg，並間入代替原用藥物之部分治療，以後本品劑量逐漸增加，而原用藥物之劑量亦應相對逐漸減少，以致獲得效果，平衡為止，對曾經治療過血管硬化，及過敏患者，宜少量逐增劑量，以期獲得良好之耐藥性，自始即以本品治療或無任何不良反應之患者，第一天應服用 1mg，第二天服用 2mg，以後每天增加 2mg，至一天之總劑量達 6 至 10mg 為止，但屬於腦炎後遺症者，其每天所需總劑量應達 12 至 15mg，對服用較低劑量者，可將一天總劑量分三次，於三餐前後服用，但服用較大劑量者，則需分四次，並於睡前服用第四劑，至於服藥之時間究為餐前或餐後，可應患者，隨其所好選擇之，如腦炎後遺症患者，常分泌過量之唾液，故宜於飯後服用，或另服少量之硫酸阿托品予以輔助，如遇口內唾液過乾時，除非發生噁心，則應於餐前服用，若需於飯後服用時，可取冰糖、口香糖，或大量飲料予以解渴。(本藥須由醫師處方使用)

(注 意) : 當類似有神經質之症狀，應進行適當的減量或停藥，偶而有噁心、口渴、嘔吐、便秘、食慾不振、排尿困難、閉尿、發疹、心跳亢進的現象發生，對於青光眼、對本劑過敏症、重症肌無力症之患者禁止使用，對於前列腺肥大等尿路閉塞性疾患的某些患者，罹患不整心律及心跳過快患者，罹患肝及腎障害、高齡、高血壓、腸胃管閉塞性、動脈硬化性帕金森氏症候群之患者，對本品並非禁忌，但須妥善照顧觀察，對於妊婦、授乳婦、小兒、乳兒，除非在治療上有益性，超過危險性時，才投與，本品不得與 phenothiazine 系藥物併用，會使精神錯亂，興奮、幻覺等副作用增強。

(貯 藏) : 本劑於室溫保存之。

(包 裝) : 4000 毫升以下之瓶裝。