

安膚樂 乳膏

Elisone cream

【主 成 分】安膚樂乳膏每公克含1毫克之Mometasone furoate。

【賦 形 劑】White Petrolatum, Paraffin Wax, Arlacel 165, Kaochol 8685(Cetyl Stearyl Alcohol), Chlorocresol, Sodium Phosphate monobasic, Span 60, Polysorbate 80(Tween80), Mineral Oil, Propylene Glycol, Phosphoric acid, Methyl Paraben, Propyl Paraben, Sorbitan Sesquioleate, Purified Water.

【適 應 症】對類固醇具有感受性之皮膚病所引起之炎症反應及搔癢之緩解。

【作 用】

Mometasone furoate為一種新合成的類固醇，具有抗發炎、止癢及血管收縮等特性。

【用法用量】每日一次，薄敷於患部。

【副 作 用】

乳膏：局部感覺異常，癢或皮膚萎縮，但極少發生。

使用其他局部類固醇製劑可能會發生的副作用：刺激、多毛症、色素不足、周圍皮膚炎、過敏性皮炎、二次感染、皺褶及汗疹。

【禁 忌 症】禁用於對本劑中任一成份過敏的病人。

【注意事項】

如有刺激、過敏發生，應停用本劑，並施予適當治療。如患處有明顯的感染發生，可併用抗生素和抗真菌劑，如果情況未見好轉，則應停用本劑，直至感染被控制住方可再用。其他如全身性類固醇易引起的副作用偶爾也會發生，但如腎上腺抑制。廣體、密閉式治療容易引起全身性吸收。所以在長期使用本劑時，尤其嬰兒，須特別小心。本劑不可作為眼用。兒童局部使用類固醇比成人病患易導致下視丘腦下垂體軸功能抑制及Cushing syndrome，因為體表面積/體重的比率較大。兒童局部使用類固醇必須限制在最小的有效治療範圍，長期的類固醇治療可能會干擾兒童的生長。

【懷孕或哺乳婦女】

對胎兒及哺乳婦女的安全性未知，因此在對母體的有益性大於對胎兒的危險性時才可使用，請務必小心，不得大量或長期使用。局部使用類固醇而全身性吸收，尚不知是否會分泌在乳汁中，全身性的使用類固醇會分泌於乳汁中，要估計此藥對母親的重要性，再決定停止哺乳或停藥。

【過 量】

出現症狀：過量長期使用會抑制下視丘-腦下垂體功能，引起腎上腺功能抑制。

治療方法：可給予適當的交感神經素治療。急性皮質類固醇過多乃可逆反應。如有需要，可做適當處理來治療電解質不平衡。如為慢性中毒，以漸進式中止類固醇治療。

【儲 藏】請貯存於25℃以下。

【包 裝】1000公克以下鋁軟管裝、塑膠軟管裝、塑膠瓶裝。

本藥須經由醫師處方使用。

衛署藥製字第 G-8001
045667 號。

【製 造 廠】



中生生技製藥股份有限公司淡水廠
CBC Biotechnological & Pharmaceutical Co., Ltd.
廠 址：251新北市淡水區埤島里行忠路120號
服務專線：0 2 - 8 6 3 1 0 0 1 8

SCJ-083
03