



血脂調節劑

GBC-003
衛署藥製字第032833號
Code No.:32058

“永信”

脂福®

(健菲布脂)

GEMD®

(Gemfibrozil)

膠囊 300公絲

Capsules 300mg “Yung Shin”

3.98cm

本藥主成分是一種新型血脂調節劑，可以調節各種血中脂質以降低動脈粥狀硬化的機會，重建血脂平衡，減少發生冠狀動脈心臟病之危險。故在高血脂症的治療領域中，本藥實為一優秀而確實的製劑。

【成分】每膠囊中含：

Gemfibrozil.....300mg

【賦形劑】

Potato Starch、Aluminum Magnesium silicate、Sodium Starch Glycolate、Stearic Acid、Sodium Lauryl Sulfate。

【特徵】

1. 本藥是脂質調節劑，可降低血中昇高的膽固醇及三酸甘油脂之濃度。
2. 本藥也可以減少VLDL-Cholesterol、LDL-Cholesterol和Triglycerides，並可升高HDL-Cholesterol，因而可以減少罹患冠狀動脈心臟疾病的機會。
3. 本藥能抑制末梢脂肪分解和減少肝中free fatty acid之抽出，因而降低肝中三酸甘油脂之產生。
4. 本藥會抑制VLDL-carrier apolipoprotein B之合成及增加其肅清力，而減少VLDL之產生。
5. 本藥亦可昇高HDL-cholesterol，促進肝臟膽固醇的轉化及移除，並增加膽固醇由糞便排出。
6. 本藥口服後經由胃腸道吸收良好，於1~2小時可達到最高血中濃度，若單一劑量投與，則其血中半衰期是1.5小時。多次劑量投與時則為1.3小時。

【適應症】

高血脂症。

【用法·用量】

每次2粒，一天2次。

本藥須由醫師處方使用。

【禁忌症】

肝或腎功能不全、原發性膽硬化、膽囊疾病及對本藥過敏之患者禁用之。

【一般注意】

1. 本藥長期投與可能產生膽囊疾病。
2. 本藥應依適應症及用法·用量投與；且若血中脂質濃度無有意義的降低時，則應停止使用。
3. 本藥可能會增加膽固醇排泄於膽汁中而導致膽結石，此時宜中止投藥。
4. 本藥併用抗凝血劑時，抗凝血劑的劑量需減量，並維持prothrombin time於正常，以防止出血，且應經常測定prothrombin，直至穩定為止。

【孕婦、授乳婦之投與】

本藥品使用於孕婦、授乳婦之安全性尚未確立，因此對孕婦及可能懷孕的婦女與授乳婦在使用之前，宜先權衡治療之必要性方始投與。

【新生兒、乳兒之投與】

由於新生兒及乳兒之組織器官尚未發育完全，宜先權衡治療之必要性方始投與。

【使用後之注意】

本藥服用後，若發生過敏或不適現象（如發疹、搔癢等），請立即停藥並請教醫師或藥師。

【副作用】

偶有下列現象發生：

1. 皮膚：發疹、皮膚炎、搔癢、蕁麻疹。
2. 造血系統：貧血、嗜伊紅血球增多、白血球減少。
3. 胃腸：口乾、便秘、厭食、腹痛、消化不良、腹瀉、噁心、嘔吐、腹部膨脹感。
4. 骨骼肌：背痛、關節痛、肌肉痙攣痛、肌痛、四肢痛。
5. 中樞神經系統：眩暈、失眠、感覺異常、耳鳴、頭痛、霧視。
6. 臨床檢驗：低血鉀症、肝功能檢查異常。
7. 其他：疲勞、身體不適、暈厥。

【保存上之注意】

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。
2. 於25℃以下、避光儲存。
3. 請在有效期限內使用。

【包裝】

8~1000粒罐裝、塑膠瓶、鋁箔盒裝。



YUNGSHIN®

永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04) 26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

2146380