



恩排糖膜衣錠25毫克

Jardiance 25mg Film-Coated Tablets

衛部藥輸字 第 026405 號

須由醫師處方使用

版本日期 2024-05-24

1 性狀


1.1 有效成分及含量

每顆JARDIANCE 膜衣錠均含有25 mg empagliflozin游離鹼。

JARDIANCE為口服型藥物含有empagliflozin，為活性的第二型鈉-葡萄糖轉運通道 (sodium-glucose co-transporter 2，SGLT2) 抑制劑。

Empagliflozin的化學名稱為D-Glucitol,1,5-anhydro-1-C-[4-chloro-3-[[4-[[[(3S)-tetrahydro-3-furanyl]oxy]phenyl]methyl]phenyl]-, (1S)。

其分子式為 $C_{23}H_{27}ClO_7$ ，分子量為450.91，結構式為：



Empagliflozin為白色至淡黃色、不具吸濕性的固態粉末，其水溶性極低、略溶於甲醇、少溶於乙醇和乙腈、可溶於50%的乙腈水溶液，並且完全不溶於甲苯。

1.2 賦形劑

單水乳糖 (Lactose Monohydrate)、微晶纖維素 (microcrystalline cellulose)、羥丙基纖維素 (hydroxypropyl cellulose)、交聯羧甲基纖維素鈉 (croscarmellose sodium)、膠體二氧化矽 (colloidal silicon dioxide) 以及 硬脂酸鎂 (magnesium stearate) ；此外，膜衣亦含有下列無活性成分：羥丙甲纖維素 (hypromellose)、二氧化鈦(titanium dioxide)、滑石粉 (talc)、聚乙二醇 (polyethylene glycol) 以及黃氧化鐵 (yellow ferric oxide)。

1.3 劑型

膜衣錠

1.4 藥品外觀

JARDIANCE (empagliflozin) 25 mg錠劑為淺黃色、橢圓形、兩面中央凸起的膜衣錠，其中一面壓印「S 25」字樣，另一面則壓印百靈佳殷格翰公司標誌。

2 適應症

2.1 血糖控制

用於成人及10歲以上小兒之第二型糖尿病病人[請參閱臨床試驗資料(12)]。

2.2 預防心血管事件

用於具第二型糖尿病且已有心血管疾病的成人病人時，可降低心血管原因死亡的風險。

2.3 使用上的限制

不建議用於第一型糖尿病病人，其可能會增加這類病人酮酸中毒的風險[請參閱警語及注意事項(5.1.1)]。對於eGFR低於30 ml/min/1.73 m²的第二型糖尿病成人病人，不建議使用JARDIANCE改善其血糖控制。根據其作用機制，JARDIANCE在此情況下可能無療效。

3 用法及用量

3.1 用法用量

3.1.1 開始使用 JARDIANCE 之前

請在開始使用JARDIANCE治療前及治療中認為有必要時，進行腎功能評估 [請參閱警語及注意事項 (5.1.2)]。

針對體液容量減少的病人，開始服用JARDIANCE前先矯治此一狀況 [請參閱警語及注意事項 (5.1.2)及特殊族群注意事項 (6.7)]。

3.1.2 成人病人建議劑量

- JARDIANCE可單獨使用亦可與metformin、metformin併用sulfonylurea、pioglitazone(併用或不併用metformin)、胰島素(併用或不併用metformin及/或sulfonylurea)合併使用，作為附加於飲食控制及運動之外的治療藥物，藉以改善第二型糖尿病病人的血糖控制效果。
- JARDIANCE的建議劑量為每日早上一次、每次10 mg，可與食物一起服用，亦可空腹服用。
- 當耐受性良好，可將劑量提升至25 mg做為進一步的血糖控制。

3.1.3 10歲以上小兒病人建議劑量

- JARDIANCE 的建議劑量為每日早上一次、每次10 mg，可與食物一起服用，亦可空腹服用。
- 需要進一步的血糖控制時，可將劑量提升至每天 25 mg。
- 目前並無有關預估腎絲球過濾率 (eGFR) < 60 ml/min/1.73 m² 小兒和未滿 10 歲小兒的資料，故無法提供建議劑量 [請參閱臨床試驗資料 (12)]。

3.3 特殊族群用法用量

3.3.1 腎功能不全者

表1 各種腎功能狀態病人的 JARDIANCE 25mg 建議劑量

腎功能狀態	建議劑量
eGFR $\geq$ 30 mL/min/1.73m ²	無需調整劑量
eGFR < 30 mL/min/1.73m ² , End-Stage Renal Disease (ESRD)或透析	不建議使用

4 禁忌

- 曾對empagliflozin或JARDIANCE中其他賦形劑產生過敏反應，例如曾發生血管性水腫 [請參閱警語及注意事項 (5.1.7)]。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

5.1.1 酮酸中毒

過去在對使用第二型鈉-葡萄糖轉運通道 (SGLT2) 抑制劑 (包含JARDIANCE) 的第一型和第二型糖尿病病人進行臨床試驗以及上市後監測時，曾發現酮酸中毒的案例；這是一種嚴重、威脅生命且必須緊急住院治療的疾病。使用JARDIANCE的病人曾有報告酮酸中毒致死的案例。在以第一型糖尿病病人為研究對象的安慰劑對照試驗中，相比於接受安慰劑的病人，接受SGLT2抑制劑治療的病人，酮酸中毒風險增加。JARDIANCE不建議用於治療第一型糖尿病病人 [請參閱適應症(2)與用法及用量(3)]。儘管酮酸中毒較不可能發生於未患有糖尿病的病人，但這些病人也曾有通報相關案例。

接受JARDIANCE治療的病人如果有出現重度代謝性酸中毒的徵象和症狀，無論其血糖濃度多高，均應評估是否發生酮酸中毒，因為即使血糖濃度低於 250 mg/dL，仍可能發生JARDIANCE相關酮酸中毒。如果懷疑酮酸中毒，應停用JARDIANCE、評估病人的狀況，並立即開始施行治療。治療酮酸中毒時，可能需要給予胰島素、水分並補充碳水化合物。許多上市後報告顯示，尤其是在第一型糖尿病病人中，常有未即時發現酮酸中毒的情形，也因此延誤了立即的治療，其原因就是病人的血糖濃度低於一般糖尿病酮酸中毒預期呈現的血糖濃度 (經常低於250 mg/dL)。病人就診時的徵象與症狀符合脫水及重度代謝性酸中毒之診斷，包括噁心、嘔吐、腹痛、全身不適，以及呼吸急促。在部分但並非全部案例中，曾發現病人較易發生酮酸中毒的因素有：胰島素劑量調降、急性發燒性疾病、熱量攝取減少、手術、可能導致胰島素不足的胰臟疾病 (例如第一型糖尿病、胰臟炎或胰臟手術病史)，以及酗酒。

開始使用JARDIANCE前，請先考慮病人病史中可能使其較易發生酮酸中毒的因素，包括任何原因引起的胰臟胰島素不足、熱量攝取限制，以及酗酒。病人進行預定手術時，考慮於術前至少三天暫時停用JARDIANCE。[請參閱藥效藥理特性及藥物動力學特性 (10.2, 11)]。請在已知較可能發生酮酸中毒的其他臨床情形下 (例如因急性疾病或術後的長時間禁食) 考慮監測酮酸中毒，並暫時停用JARDIANCE。重新使用JARDIANCE前須確認引發酮酸中毒的風險因素已解決。應教導病人辨識酮酸中毒的徵象與症狀，並請病人在出現這些症狀時，應停止使用JARDIANCE並立即就醫。

5.1.2 體液容量減少

JARDIANCE可引發血管內容積減少，有時進而發生帶有症狀的低血壓或血清肌酸酐急性瞬間的變化[請參閱不良反應 (8.2)]。上市後報告曾有接受SGLT2抑制劑包含empagliflozin的第二類型糖尿病病人，出現急性腎損傷，有些病人需要住院及血液透析。腎功能不全的病人 (eGFR低於 60 mL/min/1.73 m²)、年長的病人、或正在使用環利尿劑的病人可能發生體液容量減少或低血壓的風險增加。病人具有上述一個或多個特性時，在開始JARDIANCE治療之前，請評估體液狀態及腎功能。體液容量減少的病人，開始JARDIANCE治療之前，請先矯正此情形。開始JARDIANCE治療之後，請監測體液容量減少之徵象和症狀以及腎功能。

5.1.3 尿路敗血症與腎盂腎炎

曾有通報使用SGLT2抑制劑 (包含JARDIANCE) 的病人發生嚴重泌尿道感染 (包括尿路敗血症及需要住院的腎盂腎炎) 的案例。SGLT2抑制劑的治療會提高泌尿道感染的風險。請評估病人身上是否有泌尿道感染的徵象和症狀，並於必要時立即給予治療 [請參閱不良反應

(8)]。

5.1.4 併用胰島素與胰島素促分泌物質時發生的低血糖

胰島素與胰島素促分泌物質已知都可能引發低血糖。JARDIANCE 與胰島素促分泌物質（例如：磺醯尿素類藥物）或胰島素併用時，低血糖的發生風險較高 [請參閱不良反應 (8.2)]。因此，與 JARDIANCE 併用時，可能須調降胰島素促分泌物質或胰島素的劑量，以減少發生低血糖的風險。

5.1.5 會陰部壞死性筋膜炎(弗尼爾氏壞疽)

會陰部壞死性筋膜炎(弗尼爾氏壞疽)是一種罕見但嚴重且可能危及性命的壞死性感染，需要緊急手術治療。在接受 SGLT2 抑制劑(包括恩排糖)之糖尿病病人中，曾發現會陰部壞死性筋膜炎的罕見案例；在女性與男性皆有病例。其中嚴重者也有可能住院、多次手術甚或死亡。

對於接受恩排糖治療如有出現生殖器或會陰區域疼痛或壓痛、紅斑或腫脹並伴隨發燒或身體不適的病人，皆應評估是否發生壞死性筋膜炎。如有懷疑，應立即以廣效性抗生素進行治療，如有必要，可進行手術清創，停用恩排糖，密切監測血糖濃度，並提供適當的血糖控制替代療法。

5.1.6 生殖器黴菌感染

JARDIANCE 可能會提高生殖器黴菌感染的發生率 [請參閱不良反應 (8.2)]。過去有慢性或復發性生殖器黴菌感染病史的病人，會有較高的機會發生生殖器黴菌感染。請以適當方式進行監測及治療。

5.1.7 過敏反應

在 JARDIANCE 上市後使用經驗中，曾有嚴重過敏反應（例如血管性水腫）的案例報告。如果發生過敏反應，請停止 JARDIANCE；立即按照標準照護流程治療，並監測直至徵兆和症狀消失。JARDIANCE 禁用於對 empagliflozin 或 JARDIANCE 中其他賦形劑過敏者 [請參閱禁忌症 (4)]。

5.1.8 低密度脂蛋白膽固醇 (LDL-C) 上升

使用 JARDIANCE 時可能發生 LDL-C 上升的現象 [請參閱不良反應 (8.2)]。請以適當方式進行監測及治療。

6 特殊族群注意事項

6.1 懷孕

懷孕

風險摘要

由於動物研究資料顯示有不良腎臟影響，因此不建議在懷孕第二孕期和第三孕期時使用 JARDIANCE。目前懷孕婦女使用 JARDIANCE 的現有資料極少，因此無法據以判定藥物與重大先天缺陷和流產風險之間是否具有相關性。懷孕期間糖尿病控制不佳可能對母體和胎兒造成風險。[參見臨床考量]。

在動物試驗中，在相當於人類第二孕期晚期和第三孕期的大鼠腎臟發育期間施用 empagliflozin 時，觀察到不良腎臟變化。約為最大臨床劑量 13 倍的劑量引發可復原的腎盂和腎小管擴張。[參見資料]。

對於懷孕前已知患有糖尿病且 HbA1c >7 的女性病人，其胎兒出現重大先天缺陷的背景值風險估計

值為6%-10%，而在HbA1C >10的女性病人，機率則高達為20%-25%。目前此族群的流產背景風險為未知。在美國一般族群經臨床認定的懷孕案例中，胎兒重大先天缺陷與流產的背景風險估計值分別為2-4%與15%-20%。

臨床考量

疾病相關母體和 / 或胚胎 / 胎兒之風險：懷孕期間若患有控制不良的糖尿病，會增加母體發生糖尿病酮酸血症、子癲前症、自發性流產、早產和分娩併發症的風險。控制狀況不佳的糖尿病也會提高胎兒發生重大先天缺陷、死產、巨嬰症相關疾病的風險。

資料

動物資料

幼年大鼠研究的結果顯示，自出生後第21天(PND 21)開始，以1、10、30及100 mg/kg的每日劑量直接給予empagliflozin至第90天為止，在100 mg/kg的每日劑量下(根據AUC計算，相當於最大臨床劑量25 mg的13倍)，曾觀察到腎臟重量增加以及腎小管和腎盂擴張現象。在13週的不用藥恢復期結束後，則未觀察到上述現象。這些結果是在大鼠腎臟發育期間(相當於人類腎臟發育的第二孕期晚期和第三孕期)暴露於藥物時發生。

大鼠和兔子的胚胎胎兒發育試驗顯示，empagliflozin是在相當於人類器官形成期(第一孕期)的時期施用。在最高300 mg/kg的每日劑量(根據AUC計算，分別相當於最大臨床劑量25 mg的48與128倍)下未對發育造成不良影響。在引發大鼠母體毒性的更高劑量下，若使用700 mg/kg的每日劑量(相當於最大臨床劑量25 mg的154倍)，胎兒四肢骨骼畸形的案例會增加。在大鼠中，empagliflozin會穿過胎盤到達胎兒組織。於兔子施用較高的empagliflozin劑量(700 mg/kg的每日劑量，相當於最大臨床劑量25 mg的139倍)會引發母體及胎兒毒性。

在懷孕大鼠的產前和產後發育試驗中，給予empagliflozin以最高100 mg/kg的每日劑量(約相當於最大臨床劑量25 mg的16倍)，自妊娠第6天開始施用至泌乳第20天(斷奶)為止，且並未產生母體毒性。在大於或等於30 mg/kg的每日的劑量下(約相當於最大臨床劑量25 mg的4倍)，可以觀察到子代的體重降低。

6.2 哺乳

風險摘要

關於JARDIANCE是否會進入人類的乳汁以及其對於哺乳嬰兒或乳汁生成有何影響，目前相關的資料有限。Empagliflozin會分泌到授乳中大鼠的乳汁內[參見資料]。由於人類腎臟是在子宮內到出生後2年內逐漸成熟(此時可能因授乳而暴露)，因此發育中的人類腎臟可能處於風險之中。

因為JARDIANCE可能對接受哺乳的嬰兒造成嚴重的不良反應，包含empagliflozin可能影響出生後腎臟發展，應告知病人，不建議在哺乳期間使用。

資料

在懷孕第18天的大鼠給予單劑量口服藥物之後，大鼠胎兒組織中存在的empagliflozin濃度低。在大鼠乳汁中，乳汁對血漿中藥物濃度比平均值在0.634 – 5範圍內，而且在用藥後2至24小時期間皆大於1。乳汁對血漿中藥物濃度比平均值最大值5發生在用藥後8小時，顯示empagliflozin會蓄積在乳汁內。年幼大鼠直接暴露於empagliflozin時，會對其成熟期間發育中的腎臟造成風險(腎盂和腎小管擴張)。

6.4 小兒

JARDIANCE 用於10歲以上第二型糖尿病小兒病人作為血糖控制的安全性及有效性已被確立。

一項針對10至17歲的第二型糖尿病小兒病人，為期26週的雙盲、安慰劑對照試驗、最長52週的雙盲活性治療安全性延伸期，以及小兒藥物動力學試驗結果皆支持JARDIANCE用於該適應症[請參閱藥理特性(10)及臨床試驗資料(12)]。

JARDIANCE用於10歲以下第二型糖尿病小兒病人的安全性及有效性尚未獲得確立。

6.5 老年人

在針對第二型糖尿病病人改善血糖控制的研究中，總計有2721 (32%) 名接受JARDIANCE治療的病人年滿65歲、491 (6%) 名年滿75歲。預期JARDIANCE在腎功能不全的老年病人中血糖療效較低[請參閱特殊族群注意事項(6.7)]。對於年滿75歲的病人而言，體液容量減少相關不良反應的發生風險在安慰劑、JARDIANCE 10 mg和JARDIANCE 25 mg組內分別為2.1%、2.3%和4.4%。對於年滿75歲的病人而言，泌尿道感染的發生風險在隨機分配至安慰劑、JARDIANCE 10 mg和JARDIANCE 25 mg組內的病人中，分別為10.5%、15.7%和15.1% [請參閱警語及注意事項(5.1.2)]以及不良反應(8.2)]。

6.6 肝功能不全

JARDIANCE可用於肝功能不全病人[請參閱藥物動力學特性(11)]。

6.7 腎功能不全

於一項針對輕度和中度腎功能不全(預估腎絲球過濾率30至小於90 mL/min/1.73 m²)病人所進行的JARDIANCE血糖控制的療效及安全性試驗中接受評估[請參閱臨床試驗資料(12)]。於此試驗中，195名使用JARDIANCE的病人具有介於60和90 mL/min/1.73 m²之間的腎絲球過濾率估計值、91名使用JARDIANCE的病人具有介於45和60 mL/min/1.73 m²之間的腎絲球過濾率估計值，而97名病人具有介於30和45 mL/min/1.73 m²之間的腎絲球過濾率估計值。JARDIANCE 25 mg的降血糖效益會隨著病人腎功能的惡化而減弱。腎功能不全、體液容量減少不良反應，以及泌尿道感染相關不良反應的發生風險，都會隨著腎功能的惡化上升[請參閱警語及注意事項(5.1.2)]。


在一項大型心血管結果試驗中，1819名具有低於60 mL/min/1.73 m²之腎絲球過濾率估計值之腎功能惡化病人接受JARDIANCE後，此族群的心血管死亡風險與總體族群一致[請參閱臨床試驗資料(12)]。

在JARDIANCE療效及安全性研究中，並未納入eGFR小於20 mL/min/1.73 m²的病人。

7 交互作用

表2 與JARDIANCE臨床上相關的交互作用

利尿劑	
臨床上的影響	Empagliflozin 與利尿劑併用會造成尿量和排尿次數增加，可能進而提升體液容量減少的可能性
處置	在開始JARDIANCE治療之前，請評估體溶液狀態及腎功能。體溶液減少的病人，開始JARDIANCE治療之前，請先矯正此情形。開始JARDIANCE治療之後，監測體溶液減少之徵象和症狀以及腎功能。
胰島素或胰島素促分泌物質劑	
臨床上的影響	JARDIANCE與胰島素或胰島素促分泌物質(例如磺醯尿素類藥物)併用，會增加低血糖的發生風險
處置	JARDIANCE與胰島素促分泌物質(例如磺醯尿素類藥物)或胰島素併用時，可能須降低胰島



	素促分泌物質或胰島素的劑量，以減少低血糖症的風險
銻鹽	
臨床上的影響	使用SGLT2 抑制劑，併用銻鹽可能會使血液中銻鹽的濃度降低。
處置	起始使用JARDIANCE或調整劑量時，須更頻繁的監測血清中的銻鹽濃度。
尿中葡萄糖檢測陽性	
臨床上的影響	SGLT2抑制劑會增加尿中葡萄糖排出量而使尿中葡萄糖檢測呈現陽性。
處置	使用 SGLT2 抑制劑的病人，不建議以檢測尿中葡萄糖監測血糖控制。請以其他方法監測血糖控制。
干擾 1,5-anhydroglucitol (1,5-AG) 分析	
臨床上的影響	針對使用 SGLT2 抑制劑的病人，1,5-AG 的測量值在其血糖控制的評估上並不可靠
處置	不建議以 1,5-AG 分析監測血糖控制。請以其他方法監測血糖控制。

7.1 小兒族群

僅對成人進行交互作用試驗。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

下文及仿單內其他部分將針對下列重要不良反應提出說明：

- 酮酸中毒 [請參閱警語及注意事項 (5.1.1)]
- 體液容量減少 [請參閱警語及注意事項 (5.1.2)]
- 尿路敗血症與腎盂腎炎 [請參閱警語及注意事項 (5.1.3)]
- 併用胰島素與胰島素促分泌物質時發生的低血糖 [請參閱警語及注意事項 (5.1.4)]
- 會陰部壞死性筋膜炎(弗尼爾氏壞疽) [請參閱警語及注意事項 (5.1.5)]
- 生殖器黴菌感染 [請參閱警語及注意事項 (5.1.6)]
- 過敏反應 [請參閱警語及注意事項 (5.1.7)]
- 低密度脂蛋白膽固醇 (LDL-C) 上升 [請參閱警語及注意事項 (5.1.8)]

8.2 臨床試驗經驗

由於臨床試驗是在各種不同的狀況下進行，因此在某一種藥物的臨床試驗中所觀察到的不良反應發生率，無法與在另一種藥物的臨床試驗中所觀察到的不良反應率直接進行比較，亦無法反映實際臨床狀況中的發生率。

在先前的臨床試驗中以第二型糖尿病成人及10至17歲小兒病人為對象，對JARDIANCE的使用進行評估。JARDIANCE 的整體安全性在這些適應症研究試驗中，基本上呈現一致。

針對第二型糖尿病成人病人進行的臨床試驗

表3的數據是由針對第二型糖尿病病人進行的4項24週安慰劑對照試驗，以及1項使用胰島素的安

安慰劑對照試驗之18週數據統整而來。JARDIANCE在其中1項試驗乃作為單獨療法使用，在另外4項試驗則作為輔助療法使用 [請參閱臨床試驗資料 (12)]。

這些數據反映出1976名病人對JARDIANCE的暴露經驗，平均暴露時間為大約23週。病人接受安慰劑 (N=995)、JARDIANCE 10 mg (N=999) 或JARDIANCE 25 mg (N=977) 每日一次的治療。該族群的平均年齡為56歲，且有3%超過75歲。族群內超過半數 (55%) 為男性；46%為白人、50%為亞洲人，3%為黑人或非裔美國人。族群內有57%具有超過5年的糖尿病病史，在基準點時族群的平均糖化血色素 (HbA1c) 為8%。基準點時，經確認為糖尿病之小血管併發症的事件包括糖尿病腎病變 (7%)、視網膜病變 (8%) 或神經病變 (16%)。有91%的病人為腎功能正常或輕度腎功能不全，9%的病人為中度腎功能不全 (平均腎絲球過濾率估計值為86.8 mL/min/1.73 m²)。

表3顯示使用JARDIANCE時伴隨出現的常見不良反應 (不包括低血糖)。這些不良反應在基準點時並不存在、在JARDIANCE組內的發生率高於安慰劑組，而且在JARDIANCE 10 mg或25 mg組內的發生率高於或等於2%。

表 3 在以安慰劑對照的JARDIANCE 單獨療法或合併療法臨床試驗群中，在JARDIANCE 組發生率≥2%，且高於安慰劑組的不良反應

不良反應	安慰劑(%) N=995	JARDIANCE 10 mg (%) N=999	JARDIANCE 25 mg (%) N=977
泌尿道感染 ^a	7.6	9.3	7.6
女性生殖器黴菌感染 ^b	1.5	5.4	6.4
上呼吸道感染	3.8	3.1	4.0
排尿增加 ^c	1.0	3.4	3.2
血脂異常	3.4	3.9	2.9
關節痛	2.2	2.4	2.3
男性生殖器黴菌感染 ^d	0.4	3.1	1.6
噁心	1.4	2.3	1.1

^a試驗預設之不良反應類別，包括 (但不限於)：泌尿道感染、無症狀之菌尿症、膀胱炎。

^b女性生殖器黴菌感染包括下列不良反應：外陰陰道黴菌感染、陰道感染、外陰炎、外陰陰道念珠菌病、生殖器感染、生殖器念珠菌病、生殖器真菌感染、生殖泌尿道感染、外陰陰道炎、子宮頸炎、泌尿生殖道真菌感染、細菌性陰道炎。計算百分比時，均以各組內的女性受試者人數作為分母：安慰劑 (N=481)、JARDIANCE 10 mg (N=443)、JARDIANCE 25 mg (N=420)。

^c試驗預設之不良反應類別，包括 (但不限於)：多尿、頻尿和夜尿。

^d男性生殖器黴菌感染包括下列不良反應：龜頭包皮質炎、龜頭炎、生殖器真菌感染、生殖泌尿道感染、念珠菌龜頭炎、陰囊膿瘍、陰莖感染。計算百分比時，均以各組內的男性受試者人數作為分母：安慰劑 (N=514)、JARDIANCE 10 mg (N=556)、JARDIANCE 25 mg (N=557)。

口渴（包括多渴症）在安慰劑、JARDIANCE 10 mg和JARDIANCE 25 mg組內的通報比例分別為0%、1.7%和1.5%。

體液容量減少

JARDIANCE會引起滲透性利尿，進而導致血管內容量減少，以及體液容量減少相關不良反應。涵蓋五項安慰劑對照臨床試驗的統整數據顯示，體液容量減少相關不良反應（如〔居家〕血壓下降、收縮壓下降、脫水、低血壓、低血容、姿勢性低血壓及昏厥）在安慰劑、JARDIANCE 10 mg和JARDIANCE 25 mg組內的通報比例分別為0.3%、0.5%和0.3%。在具有血管內容量減少風險的病人中，JARDIANCE可使其低血壓發生風險上升 [請參閱特殊族群注意事項 (6.5、6.7)]。

排尿增加

涵蓋五項安慰劑對照臨床試驗的統整數據顯示，排尿增加（如多尿、頻尿及夜尿）不良反應的發生率JARDIANCE組高於安慰劑組（表3）。具體而言，夜尿在安慰劑、JARDIANCE 10 mg和JARDIANCE 25 mg組內的通報比例分別為0.4%、0.3%和0.8%。


急性腎功能不全

使用JARDIANCE會提高血清肌酸酐並降低腎絲球過濾率估計值（參見表4）。基準點時患有中度腎功能不全的病人，會有較大的平均變化量（參見表4）[請參閱特殊族群注意事項 (6.5、6.7)]。

一項長期心血管結果試驗中，在中斷治療後觀察到可復原的急性腎功能不全現象，這可能是因為使用empagliflozin所造成急性血液動力的變化對腎功能所造成的影響。

表 4 在4項24週安慰劑對照試驗的統整數據和腎功能不全試驗中，血清肌酸酐和腎絲球過濾率估計值（eGFR）^a相較於基準點的變化

		24週安慰劑對照試驗的統整數據		
		安慰劑	JARDIANCE 10 mg	JARDIANCE 25 mg
基準點平均值	N	825	830	822
	肌酸酐 (mg/dL)	0.84	0.85	0.85
	eGFR (mL/min/1.73 m ²)	87.3	87.1	87.8
12週時的變化	N	771	797	783
	肌酸酐 (mg/dL)	0.00	0.02	0.01
	eGFR (mL/min/1.73 m ²)	-0.3	-1.3	-1.4
24週時的變化	N	708	769	754
	肌酸酐 (mg/dL)	0.00	0.01	0.01



		eGFR (mL/min/1.73 m ²)	-0.3	-0.6	-1.4
		中度腎功能不全 ^b			
			安慰劑		JARDIANCE 25 mg
基準點平均值	N	187	--	187	
	肌酸酐 (mg/dL)	1.49	--	1.46	
	eGFR (mL/min/1.73 m ²)	44.3	--	45.4	
12週時的變化	N	176	--	179	
	肌酸酐 (mg/dL)	0.01	--	0.12	
	eGFR (mL/min/1.73 m ²)	0.1	--	-3.8	
24週時的變化	N	170	--	171	
	肌酸酐 (mg/dL)	0.01	--	0.10	
	eGFR (mL/min/1.73 m ²)	0.2	--	-3.2	
52週時的變化	N	164	--	162	
	肌酸酐 (mg/dL)	0.02	--	0.11	
	eGFR (mL/min/1.73 m ²)	-0.3	--	-2.8	
治療終止後變化 ^c	N	98	--	103	
	肌酸酐 (mg/dL)	0.03	--	0.02	
	eGFR (mL/min/1.73 m ²)	0.16	--	1.48	

^a在治療期間觀察之案例

^b腎功能不全試驗中，eGFR ≥ 30 但 < 60 mL/min/1.73 m²的一部分病人

^c終止治療後約3週

低血糖

低血糖的發生率（按照試驗區分）已列於表5。JARDIANCE與胰島素或磺醯尿素類藥物併用時，低血糖的發生率會上升。

表 5 臨床安慰劑對照試驗中，總體^a和嚴重^b低血糖事件的發生率

單獨療法 (24週)	安慰劑 (n=229)	JARDIANCE 10 mg (n=224)	JARDIANCE 25 mg (n=223)
總體 (%)	0.4	0.4	0.4
嚴重 (%)	0	0	0
與Metformin併用 (24週)	安慰劑 + Metformin (n=206)	JARDIANCE 10 mg + Me tformin (n=217)	JARDIANCE 25 mg + Me tformin (n=214)
總體 (%)	0.5	1.8	1.4
嚴重 (%)	0	0	0
與Metformin + 磺醯尿素類藥物併用 (2 4週)	安慰劑 (n=225)	JARDIANCE 10 mg + Me tformin + 磺醯尿素類藥 物 (n=224)	JARDIANCE 25 mg + Me tformin + 磺醯尿素類藥 物 (n=217)
總體 (%)	8.4	16.1	11.5
嚴重 (%)	0	0	0
與Pioglitazone +/- Me tformin併用 (24週)	安慰劑 (n=165)	JARDIANCE 10 mg + Pio glitazone +/- Metformin (n=165)	JARDIANCE 25 mg + Pio glitazone +/- Metformin (n=168)
總體 (%)	1.8	1.2	2.4
嚴重 (%)	0	0	0
與基礎胰島素 +/- Metfo rmin併用 (18週 ^d)	安慰劑 (n=170)	JARDIANCE 10 mg (n=169)	JARDIANCE 25 mg (n=155)
總體 (%)	20.6	19.5	28.4
嚴重 (%)	0	0	1.3
與MDI胰島素 +/- Metfo rmin併用 (18週 ^d)	安慰劑 (n=188)	JARDIANCE 10 mg (n=186)	JARDIANCE 25 mg (n=189)



	)		
總體 (%)	37.2	39.8	41.3
嚴重 (%)	0.5	0.5	0.5

^a總體低血糖事件：血漿或微血管葡萄糖值低於或等於70 mg/dL

^b嚴重低血糖事件：需要協助（無論血糖值為何）

^c受治療組（曾接受至少一劑試驗藥物的病人）

^d最初的18週治療期內不得調整胰島素的劑量

生殖器黴菌感染

在涵蓋五項安慰劑對照臨床試驗的統整數據中，生殖器黴菌感染（如陰道黴菌感染、陰道感染、生殖器真菌感染、外陰陰道念珠菌病，以及外陰炎）的發生率是以JARDIANCE治療組高於安慰劑治療組，在隨機分配至安慰劑、JARDIANCE 10 mg和JARDIANCE 25 mg組的病人中分別為0.9%、4.1%和3.7%。因生殖器感染而退出試驗的比例，在接受安慰劑治療者中為0%，在接受JARDIANCE 10 mg或25 mg治療者中為0.2%。

生殖器黴菌感染在女性病人中的發生率高於男性（參見表3）。

在接受JARDIANCE 10 mg（低於0.1%）和JARDIANCE 25 mg（0.1%）治療的男性病人中，包莖的發生率高於接受安慰劑治療者（0%）。

泌尿道感染

涵蓋五項安慰劑對照臨床試驗的統整數據顯示：在接受JARDIANCE治療的病人中，泌尿道感染（如泌尿道感染、無症狀之菌尿症以及膀胱炎）的發生率乃高於安慰劑組（參見表3）。有慢性或復發性泌尿道感染病史的病人，會有較高的機率發生泌尿道感染。因泌尿道感染而中斷治療的比例，在安慰劑、JARDIANCE 10 mg和JARDIANCE 25 mg組內分別為0.1%、0.2%和0.1%。

泌尿道感染在女性病人中的發生率較高。在被隨機分配至安慰劑、JARDIANCE 10 mg和JARDIANCE 25 mg組的女性病人中，泌尿道感染的發生率分別為16.6%、18.4%和17.0%。在被隨機分配至安慰劑、JARDIANCE 10 mg和JARDIANCE 25 mg組的男性病人中，泌尿道感染的發生率分別為3.2%、3.6%和4.1% [請參閱特殊族群注意事項 (6.5)]。

實驗室檢測

血清肌酸酐升高及 eGFR 降低

開始使用JARDIANCE治療幾週內，發生血清肌酸酐升高及 eGFR 降低。這些變化之後趨於穩定。在一項以中度腎功能不全病人為對象的試驗中，觀察到較大的平均變化量。在一項長期的心血管結果試驗中，血清肌酸酐升高及 eGFR 降低的情形一般不超過0.1 mg/dL及-9.0 mL/min/1.73 m²。於第四週時，停止治療後數值回復，推測使用JARDIANCE後，急性血液動力學變化在腎功能變化中扮演一定的角色。

低密度脂蛋白膽固醇 (LDL-C) 上升

在接受JARDIANCE治療的病人中，曾觀察到低密度脂蛋白膽固醇 (LDL-C) 出現與劑量有關的上升現象。在接受安慰劑、JARDIANCE 10 mg和JARDIANCE 25 mg治療的病人中，LDL-C分別上升2.3%、4.6%和6.5% [請參閱警語及注意事項 (5.1.8)]。平均基準點LDL-C濃度在各治療組之間的範圍為90.3到90.6 mg/dL。

血比容積上升

四項安慰劑對照試驗的統整數據顯示，安慰劑組的血比容積中位數下降1.3%，而JARDIANCE 10 mg組和25 mg組均上升2.8%。安慰劑、JARDIANCE 10 mg和JARDIANCE 25 mg組內一開始血比容落在參考範圍內的病人中，分別有0.6%、2.7%和3.5%的比例於治療結束時血比容數值超過參考範圍的上限

小兒病人臨床試驗

在 DINAMO 試驗中，共有 157 位 10 至17歲的第二型糖尿病小兒病人接受Jardiance 10mg 及 25mg (N=52)、linagliptin (N=52)、及安慰劑 (N=53)的治療。9.4%安慰劑組及21% Jardiance組通報了低血糖的狀況。這些事件均非重度或需要協助。整體而言，小兒病人的安全性資料近似於第二型糖尿病成人病人的安全性資料。

8.3 上市後經驗

在JARDIANCE的上市後使用經驗中還曾發現其它的不良反應。由於這些反應是由人數未定的族群自主通報而得，因此一般而言無法準確估計其發生率，或確立其與藥物暴露之間的因果關係。

腸胃道疾病: 便秘

感染: 會陰部壞死性筋膜炎(弗尼爾氏壞疽)、尿路敗血症與腎盂腎炎

代謝及營養疾病: 酮酸中毒

腎臟及尿道疾病: 急性腎損傷

皮膚與皮下組織疾病: 血管性水腫、皮膚反應 (例如皮疹、蕁麻疹)

9 過量

若發生JARDIANCE 用藥過量的情形，請立即就診。目前尚未針對血液透析清除empagliflozin的效果進行研究。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

Empagliflozin係一種第二型鈉-葡萄糖轉運通道 (SGLT2)。SGLT2負責再吸收由腎絲球過濾回體循環之葡萄糖的主要轉運通道。藉由抑制SGLT2，empagliflozin可減少腎臟對已過濾之葡萄糖的再吸收作用，並降低腎臟對葡萄糖再吸收的閥值，藉此增加尿糖排泄量。

Empagliflozin 也可降低鈉的再吸收，增加鈉流經遠曲小管的濃度；這可能會影響多種生理功能，例如減緩心臟前負荷及後負荷，以及交感神經活動的向下調節。

10.2 藥效藥理特性

尿糖排泄

治療第二型糖尿病病人時，服用一劑empagliflozin後尿糖排泄量會立刻增加，而且每日服用一次25 mg empagliflozin後，效果可維持至4週。治療期結束時，平均排泄量約為78g/日；若每日服用一次10 mg empagliflozin，則平均排泄量約為64 g/日[請參閱臨床試驗資料 (12)]。從健康受試者口服單劑empagliflozin 10mg、25mg的數據顯示，平均而言，尿糖排泄量增加情形約3天回到基準點。

尿量

在一項為期5日的試驗中，以empagliflozin 25 mg每日一次進行治療時，平均24小時尿量相較於基準點所增加的容積於第1天時為341 mL，而第5天時則為135 mL。

心臟電生理學

在一項隨機分組、以安慰劑及活性對較劑為對照的交叉試驗中，共有30名健康受試者接受單一劑口服empagliflozin 25 mg、empagliflozin 200 mg（最大劑量的8倍）、moxifloxacin以及安慰劑治療，無論使用25 mg 或 200 mg的empagliflozin，QTc皆未延長。

10.3 臨床前安全性資料

致癌性、致突變性、生育力受損

致癌性

已於CD-1小鼠和Wistar大鼠中進行的2年試驗評估本藥的致癌性，Empagliflozin在100、300或700 mg/kg/日（約為最大臨床劑量25 mg所產生之暴露量的72倍）的劑量下不會增加雌性大鼠的腫瘤發生率；在雄性大鼠方面，於700 mg/kg/日（約為最大臨床劑量25 mg所產生之暴露量的42倍）的劑量下，腸系膜淋巴結血管瘤的案例會顯著增加。Empagliflozin在100、300或1000 mg/kg/日（約相當於最大臨床劑量25 mg暴露量的62 倍）的劑量下不會增加雌性小鼠的腫瘤發生率。在1000 mg/kg/日（約相當於最大臨床劑量25 mg暴露量的45倍）的劑量下，曾在雄性小鼠中觀察到腎小管腺瘤和腎臟癌的案例。這些腫瘤可能與主要存在於雄性小鼠腎臟的代謝途徑有關。

致突變性

體外Ames細菌致突變分析、體外L5178Y tk+/- 小鼠淋巴瘤細胞分析以及大鼠中的體內微核分析皆顯示，無論經過代謝活化與否，empagliflozin均不具有致突變性及誘變性（clastogenic）。

生育力受損

在最高700 mg/kg/日的劑量下（在雄鼠和雌鼠中約相當於最大臨床劑量25 mg的155倍），empagliflozin接受治療對給藥的雄性或雌性大鼠的交配、生殖力或早期胚胎發育皆無影響。

11 藥物動力學特性

吸收

已針對健康受試者與第二型糖尿病病人進行研究探討empagliflozin 的藥物動力學，結果並未觀察到兩族群之間存在任何具有臨床意義的差異。在口服後，empagliflozin會在服藥後1.5小時達到最高血漿濃度，之後血漿濃度下降可分為兩階段，其一為迅速分佈期（distribution phase），其二為相對緩慢的終止期（terminal phase）。給予10 mg empagliflozin每日一次的治療時，穩定狀態平均血漿曲線下面積（AUC）和C_{max}分別為1870 nmol·h/L和259 nmol/L，而給予25 mg empagliflozin每日一次的治療時，則分別為4740 nmol·h/L和687 nmol/L；在治療劑量範圍內，empagliflozin的全身暴露量增幅與劑量成正比，empagliflozin的單劑治療與穩定狀態藥物動力學參數相似，顯示其線性藥物動力學與時間有關。

相較於空腹服藥，攝取高脂肪及高熱量膳食後服用25 mg empagliflozin會使其暴露量略為降低：AUC降低約16%，而C_{max}降低約37%，此膳食對empagliflozin 藥物動力學的影響未被認為具有臨床意義，empagliflozin可與食物一起服用，亦可空腹服用。

分佈

依據群體藥物動力學分析估計，穩定狀態的擬分佈體積（apparent steady-state volume of distribution）為73.8 L，健康受試者口服¹⁴C]-empagliflozin溶液後，紅血球分配率（partitioning）約為36.8%，血漿蛋白結合率（plasma protein binding）為86.2%。

排除

依據群體藥物動力學分析估計，empagliflozin的擬末端排除半衰期（apparent terminal elimination half-life）為12.4小時，擬口服清除率（apparent oral clearance）則為10.6 L/小時；每日用藥一次後，在血漿AUC方面，穩定期的蓄積率達22%，與empagliflozin的半衰期一致。

代謝

Empagliflozin的主要代謝物於人類血漿中無法測得，含量最多的代謝物為三種葡萄糖醛酸（glucuronide）共軛物（2-O-、3-O-以及6-O-葡萄糖醛酸），每種代謝物的全身暴露量小於總藥物相關成分的10%；體外試驗顯示，在人體中empagliflozin的主要代謝途徑為經由UGT2B7、UGT1A3、UGT1A8以及UGT1A9等尿嘧啶5'-二磷酸-葡萄糖醛酸基轉移酶（uridine 5'-diphospho-glucuronosyltransferase）的葡萄糖醛酸化作用。

排泄

健康受試者口服 ^{14}C -empagliflozin溶液後，約95.6%的藥物相關放射活性經由糞便（41.2%）或尿液（54.4%）排除，大部分糞便中測得的藥物相關放射活性物為未發生變化的原形藥（unchanged parent drug），而且約半數尿液排泄出的藥物相關放射活性物為未發生變化的原形藥。

特定族群腎功能不全

用於治療第二型糖尿病病人且患有輕度（eGFR: 60到小於90 mL/min/1.73 m²）、中度（eGFR: 30到小於60 mL/min/1.73 m²）、重度（eGFR: 小於30 mL/min/1.73 m²）腎功能不全的病人以及因腎衰竭而接受透析的病人時，empagliflozin的AUC分別較腎功能正常的受試者高約18%、20%、66%以及48%；相較於腎功能正常的受試者，中度腎功能不全受試者與因腎衰竭而接受透析的病人的empagliflozin最高血漿濃度相近，輕與重度腎功能不全病人的empagliflozin最高血漿濃度較腎功能正常的受試者高約20%。群體藥物動力學分析顯示empagliflozin的擬口服清除率隨著eGFR下降，因而造成藥物暴露量增加。然而，在尿中以原始型態排出的該部分empagliflozin以及尿糖排泄量，都會隨著eGFR下降而減少。

肝功能不全

用於治療輕度、中度與重度肝功能不全（依據Child-Pugh分級法判定）的病人時，empagliflozin的AUC分別較肝功能正常的受試者高約23%、47%以及75%，C_{max}分別較肝功能正常的受試者高約4%、23%以及48%。

年齡、身體質量指數和人種的影響

群體藥物動力學分析結果顯示，年齡、身體質量指數（BMI）、性別以及人種（區分亞洲人和主要為白人）對於empagliflozin的藥物動力學性質不存在具有臨床意義的影響 [請參閱特殊族群注意事項 (6.5)]。

小兒族群

曾針對10至17歲第二型糖尿病小兒和青少年病人研究empagliflozin 5 mg、10 mg和25 mg單一劑量的藥物動力學和藥效學。在考慮重要共變數後，觀察到成人和小兒病人的藥物動力學和藥物動力學-藥效學（尿液葡萄糖排除）關係相當。

曾針對10至17歲第二型糖尿病小兒和青少年病人，研究empagliflozin 10 mg（可能將劑量增加至25 mg）的藥物動力學和藥效學（自基準期以來的HbA1c變化）。觀察到的曝藥量-反應關係在成人、小兒和青少年中大致上相當。口服empagliflozin所致的曝藥量在成人病人觀察到的範圍內。有關在穩定狀態給藥後1.5小時觀察到的幾何平均波谷濃度和幾何平均濃度，empagliflozin 10



mg 每天一次為 26.6 nmol/L 和 308 nmol/L，empagliflozin 25 mg 每天一次為 67.0 nmol/L 和 525 nmol/L。

藥物交互作用

體外藥物交互作用評估

Empagliflozin 不會抑制、去活化或誘發 CYP450 同功酶。體外試驗資料顯示，在人體中 empagliflozin 的主要代謝途徑為經由 UGT1A3、UGT1A8、UGT1A9 以及 UGT2B7 等尿嘧啶 5'-二磷酸-葡萄糖醛酸基轉移酶的葡萄糖醛酸化作用，Empagliflozin 不會抑制 UGT1A1、UGT1A3、UGT1A8、UGT1A9 以及 UGT2B7。因此，若併用藥物為主要 CYP450 同功酶或 UGT1A1、UGT1A3、UGT1A8、UGT1A9 以及 UGT2B7 之受質，則不預期 empagliflozin 會對該等藥物產生影響。誘導 UGT（例如由 rifampicin 或任何其他 UGT 酵素誘導劑產生誘導作用）對於 empagliflozin 暴露量所造成的影響仍未曾接受評估。

Empagliflozin 為 P-glycoprotein (P-gp) 以及乳癌抗性蛋白 (BCRP) 之受質，然在治療劑量下不會抑制上述排出轉運蛋白 (efflux transporter)，體外藥物交互研究皆顯示，empagliflozin 不太可能與 P-gp 受質類藥物產生交互作用；Empagliflozin 為人體吸收轉運蛋白 (uptake transporter) OAT3、OATP1B1 以及 OATP1B3 之受質（不含 OAT1 與 OCT2），臨床相關血漿濃度之 empagliflozin 不會抑制任何上述人體吸收轉運蛋白，因此，併用的藥物如果是上述吸收轉運蛋白之受質，則不預期 empagliflozin 會對這類藥物造成任何影響。

體內藥物交互作用評估

治療健康受試者以及第二型糖尿病病人（有或無併用 hydrochlorothiazide 以及 torasemide）時，無論有無併用 metformin、glimepiride、pioglitazone、sitagliptin、linagliptin、warfarin、verapamil、ramipril 以及 simvastatin，empagliflozin 的藥物動力學皆相似（見圖 1）。在腎功能正常的受試者中，以 empagliflozin 併用 probenecid 會使尿中的 empagliflozin 排泄量下降 30%，但不会对 24 小時的尿糖排泄量造成任何影響。對於腎功能不全病人而言，此觀察結果的相關性仍不明。

圖 1 各種藥物對 Empagliflozin 藥物動力學的影響，以幾何平均 AUC 與 C_{max} 之比值的 90% 信賴區間表示 [參考線代表 100% (80% - 125%)]



Antidiabetic drugs


Metformin, 1000 mg, twice daily^a
 Glimepiride, 1 mg, single dose^a
 Pioglitazone, 45 mg, once daily^a
 Sitagliptin, 100 mg, once daily^a
 Linagliptin, 5 mg, once daily^a

AUC
C_{max}
AUC
C_{max}
AUC
C_{max}
AUC
C_{max}
AUC
C_{max}

Others

Simvastatin, 40 mg, single dose^b
 Warfarin, 25 mg, single dose^c
 Verapamil, 120 mg, single dose^b
 Ramipril, 5 mg, once daily^c
 Gemfibrozil, 600 mg, twice daily^b
 Hydrochlorothiazide, 25mg, once daily^c
 Torasemide, 5 mg, once daily^c
 Rifampicin, 600 mg, single dose^d
 Probenecid, 500 mg, twice daily^d


AUC
C_{max}
AUC
C_{max}
AUC
C_{max}
AUC
C_{max}
AUC
C_{max}
AUC
C_{max}
AUC
C_{max}
AUC
C_{max}



^a empagliflozin, 50 mg, 每日一次; ^b empagliflozin, 25 mg, 單劑量; ^c empagliflozin, 25 mg, 每日一次; ^d empagliflozin, 10 mg, 單劑量

治療健康受試者時，empagliflozin對metformin、glimepiride、pioglitazone、sitagliptin、linagliptin、warfarin、digoxin、ramipril、simvastatin、hydrochlorothiazide、torasemide以及口服避孕藥之藥物動力學並無具有臨床相關性的影響（見圖2）。

圖 2 Empagliflozin對各種藥物之藥物動力學的影響，以幾何平均AUC與C_{max} 之比值的90%信賴區間表示[參考線代表100% (80% - 125%)]



^a empagliflozin, 50 mg, 每日一次; ^b empagliflozin, 25 mg, 每日一次; ^c empagliflozin, 25 mg, 單劑量; ^d 給予simvastatin; ^e 給予warfarin消旋混合物 (racemic mixture); ^f 給予 Microgynon[®]; ^g 給予ramipril

12 臨床試驗資料

第二型糖尿病成人病人的血糖控制

已在臨床試驗中對JARDIANCE單獨療法以及與metformin、磺醯尿素類藥物、pioglitazone、linagliptin及胰島素的合併療法進行研究。過去也曾經在患有輕度或中度腎功能不全的第二型糖尿病病人中研究JARDIANCE。

相較於安慰劑，第二型糖尿病病人接受JARDIANCE治療後，血色素A1c (HbA1c) 出現下降現象。HbA1c在JARDIANCE組內相較於安慰劑組內下降的現象，在按照性別、人種、地理區域、基準點BMI以及罹病時間所區分的不同次組中，都可以觀察得到。

單獨療法

總計有 986 名第二型糖尿病病人參與評估JARDIANCE單獨療法之療效與安全性的雙盲安慰劑對照臨床試驗。

無法妥善控制血糖且未曾接受治療的第二型糖尿病病人先進入開放標示的安慰劑導入期治療2週。導入期結束時，血糖控制仍不佳且HbA1c介於7%和10%之間的病人會隨機分入安慰劑組、empagliflozin 10 mg組、empagliflozin 25 mg組或參考比較劑組接受治療。

第24週時，相較於安慰劑，每日JARDIANCE 10 mg或25 mg之治療可使HbA1c ($p < 0.0001$)、空腹血糖值 (FPG) 與體重產生統計上顯著的下降 (見表6和圖3)。

表6 JARDIANCE之安慰劑對照單獨療法試驗於第24週時的結果

	JARDIANCE 10 m g N=224	JARDIANCE 25m g N=224	安慰劑 N=228
--	------------------------------	-----------------------------	--------------

HbA1c (%)^a


基準點 (平均值)	7.9	7.9	7.9
自基準點起之變化 (調整後平均值)	-0.7	-0.8	0.1
與安慰劑之差異 (調整後平均值) (97.5% CI)	-0.7 ^b (-0.9, -0.6)	-0.9 ^b (-1.0, -0.7)	--
達成HbA1c <7%之病人人數 (%)	72 (35%)	88 (44%)	25 (12%)
FPG (mg/dL)^c			
基準點 (平均值)	153	153	155
自基準點起之變化 (調整後平均值)	-19	-25	12
與安慰劑之差異 (調整後平均值) (95% CI)	-31 (-37,-26)	-36 (-42, -31)	--
體重			
基準點 (平均值) (kg)	78	78	78
自基準點起之變化百分比 (調整後平均值)	-2.8	-3.2	-0.4
與安慰劑之差異 (調整後平均值) (95% CI)	-2.5 ^b (-3.1, -1.9)	-2.8 ^b (-3.4, -2.2)	--

^a修訂版意圖治療族群。插補第24週時缺失的數據時，係採用試驗期間的最後觀察值 (LOCF法) 。第24週時，被隨機分配至JARDIANCE 10 mg、JARDIANCE 25 mg和安慰劑組的病人中，分別有9.4%、9.4%和30.7%的數據是以插補而得。

^b由ANCOVA法得到的p值<0.0001 (HbA1c：ANCOVA模型包含基準點HbA1c、治療、腎功能和地區。體重和FPG：模型與HbA1c相同，但分別額外包含基準點體重/基準點FPG。)

^cFPG (mg/dL)：JARDIANCE 10 mg組，n=223，JARDIANCE 25 mg組，n=223，安慰劑組，n=226

圖 3 每個時間點 (完成者) 及第24週時 (mITT族群) 的調整後平均HbA1c變化 - LOCF法



第24週時，隨機分配至10 mg JARDIANCE組的病人，其收縮壓比安慰劑組在統計上顯著低了-2.6 mmHg（經安慰劑調整， p 值=0.0231），而隨機分配至25 mg JARDIANCE組的病人則顯著低了-3.4 mmHg（經安慰劑校正， p 值=0.0028）。

與Metformin的合併療法

總計有 637 名第二型糖尿病病人參與一項評估JARDIANCE 併用metformin時之療效與安全性的隨機雙盲安慰劑對照試驗。

經每日劑量1500 mg以上的metformin治療後，仍無法妥善控制病情的第二型糖尿病病人先進入開放標示的安慰劑導入期治療2週。導入期結束時，血糖控制仍不佳且HbA1c介於7%和10%之間的病人會隨機分入安慰劑組、empagliflozin 10 mg組或empagliflozin 25 mg組進行治療。

第24週時，相較於安慰劑，每日JARDIANCE 10 mg或25 mg之治療可使HbA1c（ $p < 0.0001$ ）、空腹血糖值（FPG）與體重產生統計上顯著的下降（見表7）。

表 7 JARDIANCE併用Metformin之安慰劑對照試驗於第24週時的結果

	JARDIANCE 10 mg + Metformin N=217	JARDIANCE 25 mg + Metformin N=213	安慰劑 + Met formin N=207
HbA1c (%)^a			
基準點 (平均值)	7.9	7.9	7.9
自基準點起之變化(調整後平均值)	-0.7	-0.8	-0.1



與安慰劑 + metformin 之差異(調整後平均值) (95% CI)	-0.6 ^b (-0.7, -0.4)	-0.6 ^b (-0.8, -0.5)	--
達成HbA1c <7%之病人人數 (%)	75 (38%)	74 (39%)	23 (13%)
FPG (mg/dL)^c			
基準點 (平均值)	155	149	156
自基準點起之變化(調整後平均值)	-20	-22	6
與安慰劑之差異 + metformin (調整後平均值)	-26	-29	--
體重			
基準點平均值 (kg)	82	82	80
自基準點起之變化百分比 (調整後平均值)	-2.5	-2.9	-0.5
與安慰劑之差異 (調整後平均值) (95%CI)	-2.0 ^b (-2.6, -1.4)	-2.5 ^b (-3.1, -1.9)	--

^a修訂版意圖治療族群。插補第24週時缺失的數據時，係採用試驗期間的最後觀察值（LOCF法）。第24週時，被隨機分配至JARDIANCE 10 mg、JARDIANCE 25 mg和安慰劑組的病人中，分別有9.7%、14.1%和24.6%的數據是以插補而得。

^b由ANCOVA法得到的p值<0.0001（HbA1c：ANCOVA模型包含基準點HbA1c、治療、腎功能和地區。體重和FPG：模型與HbA1c相同，但分別額外包含基準點體重/基準點FPG。）

^cFPG（mg/dL）：JARDIANCE 10 mg組，n=216，JARDIANCE 25 mg組，n=213，安慰劑組，n=207

第24週時，JARDIANCE 10 mg組的收縮壓比安慰劑組在統計上顯著低了-4.1 mmHg（經安慰劑校正，p值<0.0001），而JARDIANCE 25 mg組則顯著低了-4.8 mmHg（經安慰劑校正，p值<0.0001）。

開始併用Metformin的合併療法

總計有1364名第二型糖尿病病人參與一項評估JARDIANCE併用metformin作為初始治療或使用相應單方治療之療效與安全性的隨機雙盲活性對照試驗。

未經治療且血糖控制不佳的第二型糖尿病病人先進入開放標示的安慰劑導入期治療2週。導入期結束時，血糖控制仍不佳且HbA1c介於7%和10.5%之間的病人會隨機分入8個活性治療組之一：

：JARDIANCE 10 mg或25 mg；metformin 1000mg或2000mg；JARDIANCE 10 mg併用metformin 1000 mg或2000 mg；或JARDIANCE 25mg併用metformin 1000mg或2000mg。

第24週時，相較於使用單方治療，JARDIANCE併用metformin的初始治療可使HbA1c (p值<0.01) 產生統計上顯著的下降 (見表8) 。

表 8 JARDIANCE與Metformin併用或各別使用作為初始療法之比較試驗於第24週時的血糖指數

	JARDIA NCE 10 mg + Metform in 1000 mg a N=161	JARDIA NCE 10 mg + Metform in 2000 mg a N=167	JARDIA NCE 25 mg + Metform in 1000 mg a N=165	JARDIA NCE 25 mg + Metform in 2000 mg a N=169	JARDI ANCE 10 m g N=16 9	JARDI ANCE 25 m g N=16 3	Metf ormi n 1000 mg ^a N=16 7	Metf ormi n 2000 mg ^a N=16 2
HbA1c (%)								
基準點 (平均值)	8.7	8.7	8.8	8.7	8.6	8.9	8.7	8.6
自基準點起之變化 (調整後平均值)	-2.0	-2.1	-1.9	-2.1	-1.4	-1.4	-1.2	-1.8
與JARDIANCE 之差異 (調整後平均值) (9 5% CI)	-0.6 ^b (-0.9, -0.4)	-0.7 ^b (-1.0, -0.5)	-0.6 ^c (-0.8, -0.3)	-0.7 ^c (-1.0, -0.5)	--	--	--	--
與metformin 之差異 (調整後平均值) (9 5% CI)	-0.8 ^b (-1.0, -0.6)	-0.3 ^b (-0.6, -0.1)	-0.8 ^c (-1.0, -0.5)	-0.3 ^c (-0.6, -0.1)	--	--	--	--

Metformin每日服用兩次之單日總劑量

^bp-value ≤0.0062 (意向分析校正[觀察的案例] MMRM模型包含治療、腎功能、地區、回診、回診治療以及HbA1c基準值)

^cp-value ≤0.0056 (意向分析校正[觀察的案例] MMRM模型包含治療、腎功能、地區、回診、回診治療以及HbA1c基準值)

併用Metformin 與磺醯尿素類藥物的合併療法

總計有 666 名第二型糖尿病病人參與一項評估JARDIANCE 併用metformin以及磺醯尿素類藥物時之療效與安全性的隨機雙盲安慰劑對照試驗。

接受每日劑量至少1500 mg的metformin與磺醯尿素類藥物治療後，仍無法妥善控制病情的第二型糖尿病病人先進入開放標示的安慰劑導入期治療2週。導入期結束時，血糖控制仍不佳且HbA1c介於7和10%之間的病人會隨機分入安慰劑組、empagliflozin 10 mg組或empagliflozin 25 mg組進行治療。

相較於安慰劑，每日JARDIANCE 10 mg或25 mg之治療可使HbA1c (p值<0.0001)、空腹血糖值

(FPG) 與體重產生統計上顯著的下降 (見表9) 。

表 9 JARDIANCE併用Metformin及磺醯尿素類藥物之安慰劑對照試驗於第24週時的結果

	JARDIANCE 10 mg + Metformin + SU N=225	JARDIANCE 25 mg + Metformin + SU N=216	安慰劑 + Metfor min + SU N=225
HbA1c (%)^a			
基準點 (平均值)	8.1	8.1	8.2
自基準點起之變化 (調整 後平均值)	-0.8	-0.8	-0.2
與安慰劑之差異 (調整後 平均值) (95% CI)	-0.6 ^b (-0.8, -0.5)	-0.6 ^b (-0.7, -0.4)	--
達成HbA1c <7%之病人 (%)	55 (26%)	65 (32%)	20 (9%)
FPG (mg/dL)^c			
基準點 (平均值)	151	156	152
自基準點起之變化 (調整 後平均值)	-23	-23	6
與安慰劑之差異 (調整後 平均值)	-29	-29	--
體重			
基準點平均值 (kg)	77	78	76
自基準點起之變化百分比 (調整後平均值)	-2.9	-3.2	-0.5
與安慰劑之差異 (調整後 平均值) (95% CI)	-2.4 ^b (-3.0, -1.8)	-2.7 ^b (-3.3, -2.1)	--

^a修訂版意圖治療族群。插補第24週時缺失的數據時，係採用試驗期間的最後觀察值 (LOCF法) 。第24週時，被隨機分配至JARDIANCE 10 mg、JARDIANCE 25 mg和安慰劑組的病人中，分別有17.8%、16.7%和25.3%的數據是以插補而得。

^b由ANCOVA法得到的p值<0.0001 (HbA1c：ANCOVA模型包含基準點HbA1c、治療、腎功能和地區。體重和FPG：模型與HbA1c相同，但分別額外包含基準點體重/基準點FPG。)

^cFPG (mg/dL)：JARDIANCE 10 mg組，n=225，JARDIANCE 25 mg組，n=215，安慰劑組，n=224

併用Linagliptin作為Metformin療法的輔助用藥

在一項686名第二型糖尿病病人曾參加的雙盲、活性對照試驗中，評估JARDIANCE 10 mg或25

mg併用linagliptin 5 mg與個別成分單用時的療效及安全性。

服用metformin(至少1500 mg/天)仍無法妥善控制病情的第二型糖尿病病人，經2週的單盲安慰劑導入期之後，仍無法妥善控制病情且HbA1c落在7%和10.5%之間的病人，以1:1:1:1:1的比例隨機分配至5組活性治療組的其中一組：JARDIANCE 10 mg或25 mg、linagliptin 5 mg、或linagliptin 5 mg與JARDIANCE 10 mg或25 mg組成的固定劑量複方錠。

第24週時，JARDIANCE 10 mg/日或25 mg/日併用linagliptin 5 mg/日的治療組，相較於個別成分單用治療，在HbA1c (p值<0.0001) 和FPG (p值<0.001) 均有統計上顯著的改善。與linagliptin 5 mg治療相比，JARDIANCE/linagliptin 25 mg/5 mg或JARDIANCE/linagliptin 10 mg/5 mg的治療組體重亦可達到統計上顯著的下降在JARDIANCE單用組，體重則無統計上顯著差異。

與活性治療組Glimepiride併用Metformin之對照比較性研究

總計有 1545 名經metformin治療後無法妥善控制病情的第二型糖尿病病人參與一項評估

JARDIANCE 之療效的雙盲glimepiride 對照試驗。

經2週導入期後血糖控制仍不佳且HbA1c介於7和10%之間的病人會隨機分入glimepiride 組或JARDIANCE 25 mg組進行治療。

第52週時，JARDIANCE 25 mg和glimepiride都使HbA1c和FPG下降 (見表10、圖4)。

JARDIANCE 25 mg和glimepiride組在效果大小觀察值上的差異均未涵蓋0.3%的預設非劣性臨界值。Glimepiride的每日平均劑量為 2.7 mg，而在美國的最大核准劑量為8 mg/日。

表 10 無法以Metformin妥善控制病情之病人併用JARDIANCE或併用Glimepiride作為治療藥物的活性對照試驗於第52週時的比較結果

	JARDIANCE 25 mg + Metformin N=765	Glimepiride + Metformin N=780
HbA1c (%)^a		
基準點 (平均值)	7.9	7.9
自基準點起之變化 (調整後平均值)	-0.7	-0.7
與glimepiride之差異 (調整後平均值) (95% CI)	-0.07 ^b (-0.15, 0.01)	--
FPG (mg/dL)^d		
基準點 (平均值)	150	150
自基準點起之變化 (調整後平均值)	-19	-9
與glimepiride之差異 (調整後平均值)	-11	--
體重		
基準點平均值 (kg)	82.5	83
自基準點起之變化百分比 (調整後平均值)	-3.9	2.0
與glimepiride之差異 (調整後平均值) (95% CI)	-5.9 ^c (-6.3, -5.5)	--


^a修訂版意圖治療族群。插補第52週時缺失的數據時，係採用試驗期間的最後觀察值（LOCF法）。第52週時，被隨機分配至JARDIANCE 25 mg和glimepiride組的病人中，分別有15.3%和21.9%的數據是以插補而得。

^b非劣 ANCOVA模型 p 值 <0.0001 （HbA1c：ANCOVA模型包含基準點HbA1c、治療、腎功能和地區）

^cANCOVA p 值 <0.0001 （體重和FPG：模型與HbA1c相同，但分別額外包含基準點體重/基準點FPG。）

^dFPG（mg/dL）：JARDIANCE 25 mg， $n=764$ ；glimepiride， $n=779$

圖 4 每個時間點（完成者）及第52週時（mITT族群）的調整後平均HbA1c變化 - LOCF法



第52週時，收縮壓相較於基準點的調整後平均變化為-3.6 mmHg，而glimepiride組則為2.2 mmHg。兩組的收縮壓變化達到統計顯著差異（ p 值 <0.0001 ）。

第104週時，HbA1c相較於基準點的調整後平均變化在JARDIANCE 25 mg組內為-0.75%，在glimepiride組內為-0.66%。調整後平均治療差異為-0.09%，97.5%信賴區間為（-0.32%，0.15%）（不含預設的不劣性邊界0.3%）。Glimepiride平均每日劑量為2.7 mg，而美國的最大核准劑量為每日8 mg。第104週的分析納入了含及不含併用血糖救援藥物的數據，以及非治療期間的數據。在回診中未提供任何資訊的病人，其缺失數據係以觀察到的非治療期間數據推估而得。在此項多重推估分析中，JARDIANCE 25 mg組有13.9%的數據是由推估而得，而glimepiride組則為12.9%。

第104週時，觀察體重前後的變化(相較於基準點)，在JARDIANCE 25 mg/日，與glimepiride組比較，呈現統計顯著的差異（JARDIANCE 25 mg組為-3.1 kg，而glimepiride組為+1.3 kg；ANCOVA-LOCF， p 值 <0.0001 ）。

併用至Pioglitazone的合併療法（有或無Metformin）

總計有 498 名第二型糖尿病病人參與一項評估JARDIANCE 併用pioglitazone（有或無metformin）時之療效與安全性的雙盲安慰劑對照試驗。

接受每日劑量1500 mg以上的metformin與每日劑量30 mg以上的pioglitazone 治療後，仍無法妥善控制病情的第二型糖尿病病人先進入開放標示的安慰劑導入期治療2週，導入期後血糖控制仍不佳且HbA1c介於7%和10%之間的病人會隨機分入安慰劑組、JARDIANCE 10 mg組或JARDIANCE 25 mg組進行治療。

相較於安慰劑，每日JARDIANCE 10 mg或25 mg之治療可使HbA1c（p值<0.0001）、FPG和體重產生統計上顯著的下降（見表11）。

表 11 JARDIANCE併用Pioglitazone之安慰劑對照試驗結果

	JARDIANCE 10 mg + Pioglitazone N=165	JARDIANCE 25 mg + Pioglitazone N=168	安慰劑 + Pio glitazone N=165
HbA1c (%)^a			
基準點（平均值）	8.1	8.1	8.2
自基準點起之變化（調整後平均值）	-0.6	-0.7	-0.1
與安慰劑之差異+ pioglitazone （調整後平均值）（95% CI）	-0.5 ^b (-0.7, -0.3)	-0.6 ^b (-0.8, -0.4)	--
達成HbA1c <7%之病人人數（%）	36 (24%)	48 (30%)	12 (8%)
FPG (mg/dL)^c			
基準點（平均值）	152	152	152
自基準點起之變化（調整後平均值）	-17	-22	7
與安慰劑之差異+ pioglitazone（ 調整後平均值）（97.5% CI）	-23 ^b (-31.8, -15.2)	-28 ^b (-36.7, -20.2)	--
體重			
基準點平均值（kg）	78	79	78
自基準點起之變化百分比（	-2.0	-1.8	0.6

調整後平均值)			
與安慰劑之差異(調整後平均值) (95% CI)	-2.6 ^b (-3.4, -1.8)	-2.4 ^b (-3.2, -1.6)	--

^a修訂版意圖治療族群。插補第24週時缺失的數據時，係採用試驗期間的最後觀察值（LOCF法）。第24週時，被隨機分配至JARDIANCE 10 mg、JARDIANCE 25 mg和安慰劑組的病人中，分別有10.9%、8.3%和20.6%的數據是以插補而得。

^b由ANCOVA法得到的p值<0.0001（HbA1c：ANCOVA模型包含基準點HbA1c、治療、腎功能和背景用藥。體重和FPG：模型與HbA1c相同，但分別額外包含基準點體重/基準點FPG。）

^cFPG（mg/dL）：JARDIANCE 10 mg組，n=163

併用胰島素之併用療法（有或無Metformin及/或磺醯尿素類藥物）

總計有 494 名經胰島素或胰島素併用口服藥物治療後，無法妥善控制病情的第二型糖尿病病人參與一項評估JARDIANCE 在78週期間作為胰島素併用治療藥物所得療效的雙盲安慰劑對照試驗。

病人先進入開放標示的安慰劑導入期接受基礎胰島素（例如insulin glargine、insulin detemir或NPH insulin）治療2週（有或無Metformin及/或磺醯尿素類藥物作為背景治療），安慰劑調整期後血糖未妥善控制的病人則另行隨機分入JARDIANCE 10 mg組、JARDIANCE 25 mg組或安慰劑組進行治療；病人於招募、安慰劑調整期或治療的最初18週持續接受固定劑量的胰島素治療；在其餘的60週，可調整胰島素劑量。JARDIANCE 10 mg、25 mg和安慰劑組的平均每日胰島素總劑量分別為45 IU、48 IU和48 IU。

相較於安慰劑，JARDIANCE併用胰島素（有或無Metformin及/或磺醯尿素類藥物作為背景治療）在治療18週和78週後，可使HbA1c與FPG產生統計上顯著的降幅（見表12）。相較於安慰劑，JARDIANCE 10 mg或25 mg每日一次也會產生統計上顯著較大的體重下降百分比。

表 12 JARDIANCE併用胰島素之安慰劑對照試驗於第18和第78週時的結果

	18 週 (固定胰島素劑量)			78 週 (第18週後可調整胰島素劑量)		
	JARDIANCE 10 mg + 胰 島素 N=169	JARDIANCE 25 mg + 胰 島素 N=155	安慰劑 + 胰島 素 N=170	JARDIANCE 10 mg + 胰 島素 N=169	JARDIANCE 25 mg + 胰 島素 N=155	安慰劑 + 胰島 素 N=170
HbA1c (%)^a						
基準點 (平均值)	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	8.2
自基準點起之變化 (調整後平均值)	-0.6	-0.7	0	-0.4	-0.6	0.1
與安慰劑之差異 (調整後平均值, 97.5% CI)	-0.6 ^b (-0.8, -0.4)	-0.7 ^b (-0.9, -0.5)	--	-0.5 ^b (-0.7, -0.3)	-0.7 ^b (-0.9, -0.5)	--
達成HbA1c <7%	18.0	19.5	5.5	12.0	17.5	6.7

之病人 (%)						
FPG (mg/dL)						
基準點 (平均值)	138	146	142	138	146	142
自基準點起之變化 (調整後平均值, S E)	-17.9 (3.2)	-19.1 (3.3)	10.4 (3. 1)	-10.1 (3.2)	-15.2 (3.4)	2.8 (3.2)
與安慰劑之差異 (調整後平均值, 9 5% CI)	-28.2 ^b (-37. 0, -19.5)	-29.5 ^b (-38. 4, -20.6)	--	-12.9 ^c (-21. 9, 3.9)	-17.9 ^b (-27. 0, -8.8)	--
體重						
基準點平均值 (k g)	92	95	90	92	95	90
自基準點起之變化 百分比 (調整後平 均值)	-1.8	-1.4	-0.1	-2.4	-2.4	0.7
與安慰劑之差異 (調整後平均值) (9 5% CI)	-1.7 ^d (-3.0, - 0.5)	-1.3 ^e (-2.5, - 0.0)	--	-3.0 ^b (-4.4, - 1.7)	-3.0 ^b (-4.4, - 1.6)	--

^a修訂版意圖治療族群。插補第18和第78週時缺失的數據時，係採用試驗期間的最後觀察值 (LOCF法)。第18週時，被隨機分配至JARDIANCE 10 mg、JARDIANCE 25 mg和安慰劑組的病人中，分別有21.3%、30.3%和21.8%的數據是以推估而得。第78週時，被隨機分配至JARDIANCE 10 mg、JARDIANCE 25 mg和安慰劑組的病人中，分別有32.5%、38.1%和42.4%的數據是以插補而得。

^b由ANCOVA法得到的p值<0.0001 (HbA1c：ANCOVA模型包含基準點HbA1c、治療和地區；FPG：MMRM模型包含基準點FPG、基準點HbA1c、治療、地區、回診，以及回診和治療的交互作用。體重：MMRM模型包含基準點體重、基準點HbA1c、治療、地區、回診，以及回診和治療的交互作用。)

^c p值=0.0049

^d p值=0.0052

^e p值=0.0463

作為MDI胰島素 (有或無Metformin) 的輔助療法與之併用

共有563名使用每日多針型 (MDI) 胰島素 (每日總劑量 >60 IU；單用或併用metformin) 時無法妥善控制血糖的第二型糖尿病病人，曾參加一項雙盲、安慰劑對照試驗，以評估JARDIANCE作為MDI胰島素之輔助療法時於18週期間的療效。

病人在使用MDI胰島素 (有或無metformin背景療法) 時進入一段為期2週的安慰劑導入期。導入期結束後，血糖控制仍然不佳的病人被隨機分配到加上JARDIANCE 10 mg、JARDIANCE 25 mg或安慰劑的療法。病人在進入試驗前、導入期間及最初18週治療期間，都持續使用穩定劑量的胰島素。JARDIANCE 10 mg、JARDIANCE 25 mg和安慰劑組內，基準點時的平均胰島素每日總劑量分別為

88.6 IU、90.4 IU和89.9 IU。

JARDIANCE 10 mg/日或25 mg/日併用MDI胰島素（有或無metformin）的療法，在治療18週後可使HbA1c在統計上顯著低於安慰劑組（參見表13）。

表13 JARDIANCE併用胰島素（有或無Metformin）之安慰劑對照試驗於第18週時的結果

	JARDIANCE 10 m g + 胰島素 +/- Metformin N=186	JARDIANCE 25 m g + 胰島素 +/- Metformin N=189	安慰劑 + 胰島素 +/- Metformin N=188
HbA1c (%) ^a			
基準點 (平均)	8.4	8.3	8.3
自基準點起之變化 (調整後平均值)	-0.9	-1.0	-0.5
與安慰劑之差異 (調整後平均值) (95% CI)	-0.4 ^b (-0.6, -0.3)	-0.5 ^b (-0.7, -0.4)	--

^a修訂版意圖治療族群。推估第18週時缺失的數據時，係採用試驗期間的最後觀察值（LOCF法）。第18週時，被隨機分配至JARDIANCE 10 mg、JARDIANCE 25 mg和安慰劑組的病人中，分別有23.7%、22.8%和23.4%的數據是以插補而得。

^b由ANCOVA法得到的p值<0.0001（HbA1c：ANCOVA模型包含基準點HbA1c、治療、腎功能、地區和背景用藥）。

在一段長達52週的延伸治療期中，可以調整胰島素劑量以達到特定血糖目標濃度。在JARDIANCE 10 mg組和25 mg組內，HbA1c自基準點起之變化從18週到52週均可維持一致。52週後，JARDIANCE 10 mg/日或25 mg/日可使體重的下降百分比在統計上顯著大於安慰劑（p值<0.0001）。體重自基準點起之平均變化在JARDIANCE 10 mg組內為-1.95 kg，在JARDIANCE 25 mg組內為-2.04 kg。

腎功能不全

總計有 738 名基準點eGFR低於90 mL/min/1.73 m²的第二型糖尿病病人參與雙盲安慰劑對照平行組臨床試驗，此試驗評估JARDIANCE用於患有第二型糖尿病與腎功能不全病人的療效與安全性。試驗族群包含290名輕度腎功能不全（eGFR 60到低於90 mL/min/1.73 m²）、374名中度腎功能不全（eGFR 30到低於60 mL/min/1.73 m²）以及74名重度腎功能不全（eGFR低於30 mL/min/1.73 m²）病人。總共194名病人具有30到低於45 mL/min/1.73 m²的基準點eGFR，而180名病人具有45到低於60 mL/min/1.73 m²的基準點eGFR。

第24週時，在JARDIANCE 25 mg治療後，輕至中度腎功能不全病人的HbA1c出現統計上顯著的下降（見表14）。與安慰劑相較下，JARDIANCE 25 mg 產生的統計上顯著下降現象亦可於輕度[-0.7 (95% CI：-0.9, -0.5)]或中度[-0.4 (95% CI：-0.6, -0.3)]腎功能不全病人中觀察到，而JARDIANCE 10 mg產生的統計上顯著下降現象則可於輕度[-0.5 (95% CI：-0.7, -0.3)]腎功能不全病人中觀察到。

當腎功能為輕至中度不全時，JARDIANCE 25 mg的降血糖療效會隨著腎功能下降而降低。第24週時，最小平方平均HbA1c變化在基準點eGFR為60到低於90 mL/min/1.73 m²、45到低於60 mL/min/1.73 m²以及30到低於45 mL/min/1.73 m²的病人中，分別為-0.6%、-0.5%以及-0.2% [請

參閱用法用量 (3) 以及特殊族群注意事項 (6.7)]。安慰劑方面，第24週時的最小平方平均HbA1c變化在基準點eGFR為60到低於90 mL/min/1.73 m²、45到低於60 mL/min/1.73 m²以及30到低於45 mL/min/1.73 m²的病人中，分別為0.1%、-0.1%以及0.2%。

表14患有腎功能不全的第二型糖尿病病人中進行的安慰劑對照試驗，於第24週時 (LOCF) 的結果

	輕度和中度腎功能不全 ^b
	JARDIANCE 25 mg
HbA1c	
病人人數	n=284
與安慰劑的比較 (調整後平均值) (95% CI)	-0.5 ^a (-0.6, -0.4)

^ap值 <0.0001 (HbA1c : ANCOVA模型包含基準點HbA1c、治療、腎功能以及背景用藥)

^beGFR為30到低於90 mL/min/1.73 m²- 修訂版意圖治療族群。插補第24週時缺失的數據時，係採用試驗期間的最後觀察值 (LOCF法)。第24週時，被隨機分配至JARDIANCE 25 mg和安慰劑組的病人中，分別有24.6%和26.2%的數據是以插補而得。

在重度腎功能不全病人方面，HbA1c和FPG的變化分析顯示JARDIANCE 25 mg的治療效果與安慰劑之間並無差異 [請參閱適應症(2)、用法及用量 (3)以及特殊族群注意事項 (6.7)]。

小兒族群

曾在一項為期 26 週的雙盲、隨機分配、安慰劑對照、平行分組試驗 (DINAMO) 中，以及最長 52 週的雙盲活性治療安全性延伸期期間，對於 10 至 17 歲的第二型糖尿病小兒和青少年，研究 empagliflozin 10 mg (可能將劑量增加至 25 mg) 或 linagliptin 5 mg 每天一次的臨床療效和安全性。

共有 157 位病人接受 empagliflozin (10 mg 或 25 mg ; N = 52)、linagliptin (N = 52) 或安慰劑 (N = 53) 的治療。作為飲食和運動輔助的背景療法包括 metformin (51%)、metformin 加上胰島素 (40.1%)、胰島素 (3.2%) 或無 (5.7%)。基準期時的平均糖化血色素 (HbA1c) 為 8.03%。試驗族群包含 38.2% 的男性和 61.8% 的女性病人，平均年齡為 14.5 歲 (範圍：10 至 17 歲)；51.6% 為 15 歲或以上。49.7% 的試驗族群為白人、5.7% 為亞洲人和 31.2% 為黑人 / 非裔美國人。平均身體質量指數 (BMI) 為 36.04 kg/m²，平均體重為 99.92 kg。DINAMO 試驗僅納入 eGFR ≥ 60 mL/min/1.73 m² 的病人。

在降低自基準期至 26 週結束期間 HbA1c 變化的主要指標方面，Empagliflozin 表現優於安慰劑，不論是否使用救援療法或治療中止。此外，JARDIANCE 治療也表現出具有臨床意義的空腹血漿葡萄糖 (FPG) 降低 (表15)。

表15 一項有關 empagliflozin 用於第 2 型糖尿病小兒病人之 26 週安慰劑對照試驗的結果 (修正後意向治療集)

	安慰劑	Empagliflozin (10 和 25 mg · 合計)
--	-----	--------------------------------------



N	53	52
HbA1c (%) ¹		
基準期 (平均值)	8.05	8.00
自基準期以來的變化 ²	0.68	-0.17
與安慰劑的差異 ² (95% 信賴區間 (CI))		-0.84 (-1.50, -0.19)
優越性 p 值		0.0116
N	52	48
FPG (mg/dl) [mmol/l] ^{3,4}		
基準期 (平均值)	158.6 [8.80]	154.4 [8.57]
自基準期以來的變化 ²	15.7 [0.87]	-19.5 [-1.08]
與安慰劑的差異 ² (95% CI)		-35.2 (-58.6, -11.7) [-1.95 (-3.25, -0.65)]
名義 p 值		0.0035

¹ 為遺失資料多重插補 500 次疊代

² 依據基準期值和分層調整的平均值

³ 最後觀察值推估 (LOCF)，包括基準期值

⁴ 未評估統計顯著性；不屬於序列檢定程序的一部分

針對具有動脈粥樣硬化性心血管疾病之第二型糖尿病成人病人之心血管試驗結果

EMPA-REG OUTCOME試驗為一項多中心、多國、隨機分組、雙盲及平行組別試驗，旨在針對具動脈粥樣硬化性心血管疾病的第二型糖尿病病人，比較當empagliflozin與安慰劑添加於糖尿病及動脈粥樣硬化性心血管疾病的標準照護療法，與其併用時的重大不良心血管事件 (MACE) 發生風險。在試驗的前12週期間，併用的抗糖尿病藥物應維持穩定。之後，即可依據試驗主持人的判斷，對於抗糖尿病及抗動脈粥樣硬化的療法進行調整，以確保能夠依照這些疾病的標準照護療法來治療受試者。

本試驗共有7020名病人接受治療(empagliflozin 10 mg = 2345; empagliflozin 25 mg = 2342; 安慰劑 = 2333) 並接受中位數為3.1年的追蹤。大約72%受試族群為白種人、22%為亞洲人、5%為黑人。平均年齡為63歲，男性約佔72%。

試驗基準點時所有受試者的第二型糖尿病皆未獲有效控制 (HbA1c ≥ 7%)。基準點時的HbA1c平均值為8.1%，而且57%的受試者已罹患糖尿病超過10年。在此項試驗中，分別約有31%、22%與20%的受試者向試驗主持人報告曾有神經病變、視網膜病變與腎病變史，eGFR平均值為74 mL/min/1.73 m²。基準點時，病人接受一種 (~30%)或更多種 (~70%)的抗糖尿病藥物治療，包括metformin (74%)、胰島素 (48%)、磺醯尿素類藥物 (43%)。

基準點時所有病人皆有確診的動脈粥樣硬化性心血管疾病，包括一種 (82%) 或多種 (18%) 以下疾病：經證實的冠狀動脈疾病 (76%)、中風 (23%)或周邊動脈疾病(21%)。在基準點時收縮壓平均值為136 mmHg、舒張壓平均值為76 mmHg、低密度脂蛋白 (LDL) 平均值為86 mg/dL、高密度脂蛋白 (HDL) 平均值為44 mg/dL，而尿液中白蛋白-肌酸酐比值 (UACR) 平均值為175 mg/g。在基準點時

約有81%病人接受腎素-血管收縮素系統抑制劑，65%接受乙型交感神經阻斷劑、43%接受利尿劑、77%接受司他汀類藥物，86%接受抗血小板劑(大部分為阿斯匹靈)治療。

EMPA-REG OUTCOME試驗的主要評估指標為至首次發生重大不良心臟事件 (MACE) 的時間。重大不良心臟事件的定義為發生心血管原因死亡或發生非致命性心肌梗塞 (MI) 或非致命性中風。統計分析計畫已預先指明將10與25 mg劑量合併分析。針對預先指明的風險邊際值1.3，使用Cox比例風險模型來檢定在重大不良心臟事件之風險比 (hazard ratio) 上的不劣性，以及若證明不劣性，則檢定在重大不良心臟事件上的優越性。使用分層檢定策略來控制多重檢定的第一型錯誤。

JARDIANCE可顯著降低首次發生心血管原因死亡、非致命心肌梗塞或非致命性中風之主要綜合評估指標的風險 (HR : 0.86 ; 95%CI : 0.74, 0.99)。此治療效果係由隨機分配至empagliflozin組之受試者的心血管死亡風險顯著降低所致(HR : 0.62 ; 95%CI : 0.49, 0.77)，而非致命性心肌梗塞和非致命性中風的風險則無變化 (參見表16以及圖5和圖6)。10 mg和25 mg empagliflozin劑量組個別的結果與兩劑量組合併的結果一致。

表16 主要綜合評估指標與個別成分指標的治療效果^a

	安慰劑 N=2333	empagliflozin N=4687	相對於安慰劑的 風險比 (95% CI)
心血管原因死亡、非致命心肌梗塞或非致命中風之綜合指標 (至首次發生的時間) ^b	282 (12.1%)	490 (10.5%)	0.86 (0.74, 0.99)
非致命性心肌梗塞 ^c	121 (5.2%)	213 (4.5%)	0.87 (0.70, 1.09)
非致命性中風 ^c	60 (2.6%)	150 (3.2%)	1.24 (0.92, 1.67)
心血管原因死亡 ^c	137 (5.9%)	172 (3.7%)	0.62 (0.49, 0.77)

^a接受治療者資料收集 (接受至少一劑試驗藥物的受試者)

^b優越性p值 (雙尾) 為0.04

^c事件總數

圖5 首次重大不良心血管事件的累積發生率估計值





圖6 心血管原因死亡的累積發生率估計值



就心血管原因死亡而言，empagliflozin對於各個主要人口統計與疾病子群的療效一致，包括eGFR為30到低於45 mL/min/1.73 m²的病人 (Jardiance治療組381名，安慰劑189名)。

在此試驗中，99.2%的受試者皆有存活狀態資料。在EMPA-REG OUTCOME試驗期間，總共記錄463例死亡個例。這些死亡個例大部分被歸於心血管原因死亡，非心血管原因死亡僅佔少部分，且治療組之間的狀況相近 (接受empagliflozin 治療者為2.1%，接受安慰劑治療者為2.4%)。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

2-1000錠ALU-PVC鋁箔盒裝。

13.2 效期

請參見外盒。

13.3 儲存條件

請儲存於30°C以下。

13.4 儲存注意事項

請存放於兒童無法取得的安全處所。

14 病人使用須知

酮酸中毒

- 請告知病人酮酸中毒是一種嚴重危及生命的情況。曾有使用JARDIANCE出現酮酸中毒的通報案例，有時與疾病或手術相關的其他風險因子有關。
- 請指示病人如果出現符合酮酸中毒的症狀，即使血糖並未上升，請檢測酮酸 (如果可行的話)。如果出現酮酸中毒的症狀(包括噁心、嘔吐、腹痛、疲累及呼吸困難)，請指示病人停用JARDIANCE並立即就醫 [請參閱警語及注意事項 (5.1.1)]。

體液容量減少

- 告知病人服用JARDIANCE可能會發生帶有症狀的低血壓，若病人出現上述症狀，請與開立處方之醫師聯繫[請參閱警語及注意事項 (5.1.2)]。告知病人脫水可能會增加發生低血壓的風險，請維持足夠的水分攝取。

嚴重泌尿道感染

- 請告知病人可能發生泌尿道感染 (可能為嚴重感染)。請向病人提供關於泌尿道感染症狀的資訊。
- 請建議病人於出現泌尿道症狀時就醫 [請參閱警語及注意事項 (5.1.3)]。

併用胰島素與胰島素促分泌物質時發生的低血糖

- 請告知病人 JARDIANCE與胰島素促分泌物質(例如磺醯尿素類藥物)或胰島素併用時，會增加低血糖症的發生風險，因此可能須降低胰島素促分泌物質或胰島素的劑量，以減少低血糖症的風險 [請參閱警語及注意事項(5.1.4)]。

會陰部壞死性筋膜炎(弗尼爾氏壞疽)

- 請告知病人，曾有使用恩排糖時出現會陰部壞死性筋膜炎(弗尼爾氏壞疽)的病例。建議病人，如果生殖器或其後至直腸區域出現疼痛或壓痛、發紅或腫脹並伴隨發燒超過38°C或身體不適，應立即就醫[請參閱警語及注意事項(5.1.5)]。

女性的生殖器黴菌感染 (如外陰陰道炎)

- 請告知女性病人可能發生陰道的真菌感染，並針對陰道真菌感染的症狀和徵象提供相關資訊。
- 請向病人建議治療選項以及就醫時機 [請參閱警語及注意事項 (5.1.6)]。

男性的生殖器黴菌感染 (如龜頭炎或龜頭包皮灸)

- 請告知男性病人可能發生陰莖的真菌感染 (如龜頭炎或龜頭包皮灸)，尤其是未割包皮的男性以及慢性和反覆感染者。
- 請針對龜頭炎和龜頭包皮灸的徵象和症狀 (陰莖的龜頭或包皮發紅或出現皮疹) 向病人提供相關資訊。
- 請向病人建議治療選項以及就醫時機 [請參閱警語及注意事項 (5.1.6)]。

過敏反應

請告知病人曾有使用JARDIANCE時出現嚴重過敏反應包括蕁麻疹及血管性水腫的通報案例。請告知病人出現皮膚反應或血管性水腫時應立即通報，並且在諮詢醫生前先停用藥物 [請參閱警語及注意事項 (5.1.7)]。

實驗室檢測

- 請告知病人服用JARDIANCE時尿液分析中的尿糖升高為正常現象。



- 請告知懷孕病人和具有生育能力的病人，以JARDIANCE治療可能對胎兒造成風險 [詳見特殊族群注意事項 (6.1)]。請指示病人應在懷孕時儘快告知醫師。
- 請告知病人，不建議在接受JARDIANCE治療期間餵哺母乳 [詳見特殊族群注意事項 (6.2)]。
- 請病人務必依照處方服用JARDIANCE。應提醒病人，若錯過一劑藥物，請儘速於記起時立刻服用，請勿於下一劑時服用雙倍劑量。

15 其他

修正日期:2023年10月

核定日期:2024年03月

製造廠

國外許可證持有者 Boehringer Ingelheim International GmbH	Ingelheim am Rhein, Germany
製造廠 ROTTENDORF PHARMA GMBH	OSTENFELDER STRASSE 51-61, 59320 ENNIGERLOH, GERMANY
分包裝廠 Rottendorf Pharma GmbH	Am Fleigendahl 3, 59320 Ennigerloh, Germany

藥商

台灣百靈佳殷格翰股份有限公司	台北市中山區民生東路三段2號12樓
----------------	-------------------