



抗脹氣劑

GCT4-006  
衛署藥製字第029828號  
中華民國發明第126915號

# 加斯克兒®

(聚二甲矽烷)

# Kascoal®

(Dimethylpolysiloxane)

錠 40毫克

Tablets 40mg



Dimethylpolysiloxane一般名為"Silicone"係以矽及氧為直鏈而附加"甲基"之半有機化合物，其具消泡作用而能緩解脹氣等相關症狀。

**【成 分】** 每錠中含：

Dimethylpolysiloxane.....40mg

**【賦形劑】**

Microcrystalline Cellulose、Colloidal Silicon Dioxide、Talc、Magnesium Stearate、Lactose。

**【作用】**

本藥具消泡作用；於胃腸內能藉由降低氣泡之表面張力，而使原來埋附於胃腸黏膜上之氣泡因張力的改變，進而破裂，並易於以打嗝或排氣方式將氣體排出體外。

**【適應症】**

解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

**【用法用量】**

一天3至4次，或需要時服用。

成人每次2錠，3歲以上（含），適用成人劑量。

3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

**【注意事項】**

1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3. 除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4. 勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

**【副作用】**

本藥耐受性良好，針對某些患者偶有軟便、胃部不快感、下痢、腹痛、嘔吐、嘔氣、胃部重壓感及食慾不振等現象。

**【保存上之注意】**

1. 本藥應置於小兒伸手不及處。

2. 於25°C以下、避光儲存。

3. 請在有效期限內使用。

**【給胃腸脹氣患者的治療建議】**

1. 少吃發酵性食物，如麵包等。
2. 避免做一切能引起吞嚥空氣的動作，如進食時交談、喝汽水等。
3. 喝飲料等液體時應慢慢啜飲，避免大口吞嚥。
4. 進餐時應保持心境平和並且細嚼慢嚥。
5. 需以藥物治療時，應遵從醫師藥師藥劑生指示，按時正確服藥。

**【包裝】**

12~1000錠塑膠瓶、玻璃瓶、鋁箔盒裝。

**【中華民國專利號碼】**

發明第126915號

★如果您對本產品在使用上有任何的疑問，請逕洽服務專線0800-012-679，本公司專業藥師將竭誠為您服務。



永信藥品工業股份有限公司

YUNG SHIN PHARMACEUTICAL INDUSTRIAL CO., LTD.

公司地址：台中市大甲區中山路1段1191號

電話：(04)26875100

台中幼獅廠：台中市大甲區日南里工九路27號

3.98cm