

“景德”**抗憂佳**膠囊20毫克（富魯歐西汀）
KINXETIN Capsules 20mg（Fluoxetine）
“Kingdom”

【主成分】

每膠囊含：
Fluoxetine (Hydrochloride).....20mg

【藥理作用】

- 1.本品是一種合成的抗憂鬱藥品，能有效治療憂鬱患者。
- 2.本品能抑制腦中前突觸神經（Presynaptic neuron）對Serotonin（5HT-1）這種神經傳導物質的回收（Uptake of serotonin neurotransmitter），而使腦中Serotonin濃度增加，而Serotonin濃度的增加具有抗憂鬱作用。所以本品具有抗憂鬱的作用。

【適應症】

抑鬱症、暴食症、強迫症。

【用法用量】

- 1.起始劑量為一天20mg，早上一次給予。
 - 2.若服用本品數星期後仍沒有療效或產生抗藥性，則可考慮增加劑量，但一天最大劑量不得超過80mg。
 - 3.若給予劑量超過20mg時，則建議應分為二次給予，一次為早上給予，一次為中午給予。
 - 4.腎功能不全患者，肝功能不全患者，老年患者或正服用多種藥品患者，則應視實際需要而減低劑量。
- 本藥須由醫師處方使用。

【過量處理】

- 1.由於本品並無有效之解毒劑，故僅能給予支持性療法或儘量加速本品由體內排出。
- 2.維持呼吸道的通暢，並給予充足的氧氣。
- 3.給予活性碳（Activated Carbon可並用Sorbital）吸收本品，其解毒效能有時比催吐劑或洗胃更有效。
- 4.監測心臟功能並注意維持維生系統。
- 5.進行尿析（diuresis）、透析（dialysis）、血液透析（hemoper fusion）及交換性透析（exchange transfusion），以加速本品排出。
- 6.服用本品時發生中毒症狀時，有時有亦和服用其他藥品（例如併服TCA藥品）而導致有關，故應合併處理其他藥品所產生的中毒症狀。

【禁忌】

- 1.對本品過敏者，應避免服用本品。
- 2.本品和單氧化，抑制劑（Monoamine oxidase inhibitor,MAOI）會互相加重副作用而導致致死現象。故本品和單氧化，抑制劑不得併用，服用單氧化抑制劑後14天內不得服用本品，服用本品5星期內不得使用單氧化抑制劑。

【警告】

由於本品時會引起過敏反應或類似過敏反應（如發疹、搔癢、發燒、白血球過多症、關節痛、水腫、呼吸困難等），一但出現此等反應，則應立即停藥。

【注意事項】

- 1.使用本品時會有焦慮失眠（Anxiety and Insomnia）、胃口改變及體重減輕（Altered Appetite and Weight）、輕躁狂症及躁狂症（Activation of Mania/Hypomania）、竊（Seizuers）及自殺傾向（Succide），故若有以上傾向者，應減低服用劑量。
- 2.由於本品及其代謝物的排泄半衰期長（The Long Elimination Half-Lives of Fluoxetine and It's Metabolites），故有時在使用本品後數星期後，其血中濃度仍不能反應真正的所需濃度，故切勿因血中濃度不夠而任意加大劑量，而應視真正需要而增減劑量。
- 3.若患有下列疾病者，應小心調整劑量。
 - (1)心臟疾病患者，應在醫師指示下才可服用本品。
 - (2)肝功能不全患者，服用本品時其血中濃度會較正常人為高，故應減低劑量且小心服用。
 - (3)腎功能不全患者，服用本品時其血中濃度會較正常人為高，故應減低劑量且小心服用。
 - (4)服用本品時，會減低血中血糖濃度。故糖尿患者在服用本品時，應注意服用本品時所造成的血糖過低及停藥時所造成的血糖過高。
- 4.本品會影響認知力及操作能力（Interference With Cognition and Motor Performance），所以需操作機器或開車者，應小心使用本品。
- 5.藥物交互作用

藥 物	交互作用
Fleccainidine Viblastine, Card Bamazepine. Trrcyclic Antipressent	由於右列藥物會減低肝藏P-450之代謝而增加本品之血中濃度而增加毒性,故在一開始使用本品時應減低劑量。
Trptophan	Trptophan會加強本品之副作用。
MAOI	MAOI不可和本品併服。
其他抗憂鬱藥物	會加重本品之作用及毒性。
鋁製劑	會影響本品之血中濃度。
Diazepam. Phenytoin	本品會加重diazepam, phenytoin的血中濃度。
和血中蛋白結合力強之藥物（如Coumdin, Digitoxin）	會將血中蛋白結合之本品置換出來，而增加本品之血中濃度。
中樞神經刺激劑	會加強本品之作用。

- 6.懷孕婦女或欲懷孕婦女、哺乳婦女應避免服用本品。
- 7.老年人及小孩服用本品時，應減低劑量服用。

【副作用】

- 1.中樞神經系統：頭痛（headache）、緊張（nervousness）、失眠（insomnia）、嗜眠（drowniss）、焦慮（anxienty）、顫抖（tremor）、暈眩（dizziness）、疲勞（fatigue）、鎮靜（sedated）、感覺受擾（sensationdis-urbance）、性慾減少（libodo decrease）、遇光頭痛（ligntheadedness）、注意力減退（concentration decrease）等。
- 2.胃腸道系統：噁心（nausea）、腹瀉（diarrhea）、口乾（mouth dryness）、厭食（anorexia）、消化不良（dyspepsia）、便秘（constipation）、腹痛（abdominal pain）、口覺改變（taste change）、嘔吐（vomiting）、胃脹氣（flatulence）、胃腸炎（gastroenteritis）等。
- 3.皮膚及四肢：流汗過多（sweating）、發疹（rash）、搔癢（pruritis）等。
- 4.全身部位：衰弱（asthenia）、病毒感染（viral infection）、肢體疼痛（limb pain）、胸痛（chest pain）、過敏（allergy）、感冒（influenza）等。
- 5.呼吸系統：上呼吸道感染（upper respiratory infection）、Flu-like症候群（Flu-like syndrome）、咽炎（pharyngitis）、鼻塞（nasal congestion）、竇炎（sinus sinusitis）、咳（cocugh）、呼吸困難（dyspnea）等。
- 6.心血管系統：發紅發熱（hot flushes）、心悸（palpitation）等。
- 7.骨骼肌肉系統：背痛（back pain）、關節痛（joint pain）、肌肉痛（muscular pain）。
- 8.生殖系統：經痛（menstration pain）、性功能失常（sexuxal dysfuction）、陽萎（sexual importance）、頻尿（frequent micturition）、泌尿道感染（urinary infection）等。
- 9.感覺異常：視覺障礙（vision dirturbance）等。
- 10.血液淋巴系統：淋巴腺病（lymphadenopathy）等。
- 11.營養代謝系統：體重減輕（weightloss）等。

【賦形劑】

Corn Starch、Aerosil、HPMC 615

【膠囊殼成分】

Gelatin、Purified Water、Titanium Dioxide、Sodium Lauryl、Sulfate Tartrazine、Brilliant Blue FCF、Glycerine、New Coccine、Sunset Yellow FCF。

【貯存】

本品應於15～30℃以下避光貯存。

【包裝】

2～1000粒塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

衛署藥製字第041280號



委託者：景德製藥股份有限公司
地 址：台北市中山區中山北路二段113號8樓
製造廠：健康化學製藥股份有限公司
廠 址：台中市大甲區幼獅工業區幼四路12號