

“強生”樂安錠

L.A. TABLETS “JOHNSON”

內衛藥製字第 003667 號

- 【成分】每錠含有：Diphenylhydantoin..... 50mg
Phenobarbital..... 20mg
- 【適應症】真性癲癇（尤其是癲癇大發作）、症候性癲癇、乍克森氏（Jackson's）癲癇、精神分裂的發作、其他痙攣性的發作。
- 【用法·用量】通常成人及 10 歲以上之兒童 1 次 1 錠，一日 3 次，於飯後服用之，視症狀之需要一日量可增至 6 錠；5~10 歲一日劑量為 1~2 錠，最大增量至 3~4 錠。本藥須由醫師處方使用。

- 【副作用】(1)過敏症：有時會引起猩紅熱樣、麻疹樣及中毒疹樣發疹等，如有發生應即停藥。
(2)皮膚：罕有引起 Stevens-Johnson 症候群，中毒性表皮壞死症及 SLE 樣症狀，應注意觀察，如有發生應即停藥。
(3)血液：無顆粒球症、血小板減少、巨赤芽球形貧血、又罕有引起再生不良性貧血，單球性白血病及溶血性貧血等，如有發生應作減量等適當的處置。
(4)肝臟：罕有引起黃疸等。
(5)腎臟：連用時可能引起蛋白尿等。
(6)精神神經系：眩暈、運動失調、注意力、集中力及反射運動能力等之降低、睡意、Asterixis，有時有頭痛、譫妄、昏迷、笨拙、構音障礙、知覺異常、精神機能降低，又罕有引起神經過敏及不眠等。
(7)眼睛：罕有引起複視、視覺障礙、眼振及白內障等，須定期作視力檢查。
(8)消化器：有時有食慾不振，罕有噁心、嘔吐及便秘等。
(9)呼吸器：罕有引起間質性肺炎，如有發生應即停藥。
(10)齒肉增殖：連用時可能引起齒肉增殖。
(11)骨、齒：有時會引起低鈣血症，連用時可能引起佝僂病，骨軟化症及牙齒形成不全，應注意觀察，如有異常發生應減量並投與 Vitamin D 等適當之處置。
(12)其他：有時有發熱，罕有多毛、淋巴節腫脹及甲狀腺機能檢查值（血清 T₃、T₄ 等）之異常，連用時可能引起 Hematoporphyrin 尿。
- 【相互作用】(1)飲酒及與下列藥劑併用時會增強相互的作用，應減量慎重投與：Phenothiazine 誘導體，Barbituric Acid 誘導體及 Tranquilizer 等中樞神經抑制劑，三環系抗鬱劑，Monoamine 氧化酵素抑制劑，Sultiamine，Methylphenidate，Disulfiram，Isoniazid，p-Aminosalicylic Acid，Antihistamine，Thiazide 系降壓利尿劑。
(2)本劑會影響 Coumarin 系抗凝血劑的作用，Coumarin 系抗凝血劑治療中的患者如服用本劑時應時常測定血液凝固時間而調整 Coumarin 系抗凝血劑之劑量。
(3)與下列藥劑併用時，本劑中所含 Diphenylhydantoin 的血中濃度會變動（上昇或降低），又下列藥劑的血中濃度也會降低，故併用時應慎重投與：Carbamazepine，Sodium Valproate。
(4)Phenobarbital 與 Sodium Valproate 併用時血中濃度會上昇，應慎重投與。
(5)與 Acetazolamide 併用時易引起佝僂病及骨軟化症，應慎重投與。
(6)會促進副腎皮質荷爾蒙之代謝，曾有減弱作用的報告，併用時應注意。
(7)曾有下列藥劑的血中濃度會降低的報告，併用時應注意：Griseofulvin，Theophylline。
(8)與下列藥劑併用時會增強本劑的作用，應減量而慎重投與：Ethosuximide，Tegafur 製劑，Fluconazole，Miconazole。
(9)會減弱甲狀腺荷爾蒙劑的作用，併用時應增量而慎重投與。
- 【禁忌】對 Hydantoin 系化合物或 Barbituric Acid 系化合物有過敏症之患者，嚴重心臟障礙，肝臟障礙，腎臟障礙及肺障礙之患者以及急性間歇性 Porphyria 患者均禁忌使用。
- 【注意事項】(1)連用中如急速停藥或用量劇減可能發生癲癇重現狀態，如要停藥應慎重而徐徐減量，尤其高齡者及虛弱者應特別注意。
(2)眼振、構音障礙、運動失調、眼筋麻痺等症狀係 Diphenylhydantoin 過量投與的徵候，如有上述症狀發生應徐徐減量至最適有效劑量。
(3)連用中須定期作肝臟功能、腎臟功能及血液檢查。
(4)會引起睡意、注意力、集中力及反射運動能力等之降低，服用中的患者請勿開車及從事危險機械的操作。
(5)高齡者、虛弱者、頭部外傷後遺症及進行性動脈硬化症患者、心臟障礙、腎臟障礙及血液障礙患者、呼吸機能降低患者、甲狀腺機能低下症患者以及藥物過敏症患者均應慎重投與。
(6)妊娠中投與本劑有很多畸型發展報告，故妊婦及可能懷孕之婦女應確認其有益性大於危險性始得使用，本劑於母乳中會移行，可能引起乳兒過度睡意。

- 【儲存】本藥應儲存於 25℃ 以下緊密容器。
【包裝】6 ~ 1,000 錠 塑膠瓶裝及鋁箔盒裝。



Code No. : B-14

強生化學製藥廠股份有限公司

JOHNSON CHEMICAL PHARMACEUTICAL WORKS CO., LTD.

台北縣 241 三重市三和路四段 77 號

訂貨專線：(02)29894756 FAX：(02)29712579

工廠電話：(02)22878405