

立達賜康口嚼錠

制酸



衛署藥製字第 00998 號

醫師藥師藥劑生指示藥品

組 成

每錠內含：

乾燥氫氧化鋁凝膠.....334毫克

氫氧化鎂.....166毫克

抗泡沫乳膠劑.....36.7毫克

概 論

立達賜康為制酸之優良配合製劑，能消除因胃酸過多所導致之胃腸不適症狀。Aluminum Hydroxide可中和過多胃酸，無收斂性，通常不引起腸機能之變化。

Magnesium Hydroxide亦為胃酸中和劑，等制酸劑不被吸收故無引起鹼血症或牛乳—鹼性症候群(milk-alkali syndrome)。

立達賜康含有木蜜醇(Mannitol)，可嚼碎服用，並調配有薄荷之香味。

作 用

立達賜康對健康人可緩解因胃酸過多引起之胃腸不適症狀。如溢酸、胃灼熱。單次劑量(1錠)之酸中和能力為10.0mEq以上，鎂含量為5.7mEq。

適 應 症

緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多。

用法用量

一天4次，每餐後及睡前或需要時服用。應嚼碎後吞服。成人每次1錠，12歲以上適用成人劑量。

醫師藥師藥劑生指示藥品。

注意事項

- 一、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三、除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
- 五、腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症(Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變(Dialysis encephalopathy)及低磷血症，應謹慎小心使用。

警 語

- 一、除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
 - (一)對於牛奶或乳製品耐受度低者，每日服用藥品中之乳糖含量不得超過5g。
 - (二)未滿3個月之嬰兒不得服用。
 - (三)一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
 - (四)本藥不得併用其他藥品。
- 二、如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。
- 三、消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
- 四、本藥含鋁之制酸成分可能會引起便秘，偶有噁心、嘔吐。
- 五、本藥含鎂之制酸成分可能會引起腹瀉。

包 裝

8-1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

儲藏條件

25°C以下。

Wyeth®

台灣惠氏股份有限公司新竹廠

廠址：新竹縣新豐鄉中崙村中崙 290-1 號

17322013