



# "國嘉"寧痛膜衣錠 10 毫克 ( 東莨菪生僉 )

## LINTON F.C. TABLETS 10MG "KOJAR" (HYOSCINE BUTYLBROMIDE)

衛署藥製字 第 036237 號

須由醫師處方使用

版本日期 2024-01-16

### 1 性狀

#### 1.1 有效成分及含量

Each F. C. Tablet Contains :  
Hyoscine Butylbromide.....10mg

#### 1.2 賦形劑

Calcium Phosphate Dibasic、Cellulose Microcrystalline、Sodium Starch Glycolate、Povidone、Magnesium Stearate、Croscarmellose Sodium、Magnesium Aluminum Silicate、Hydroxypropyl Methylcellulos、Titanium Dioxide、Polyethylene Glycol 6000、Carnauba Wax

#### 1.3 劑型

膜衣劑

#### 1.4 藥品外觀

白色圓形膜衣劑。

### 2 適應症

胃、十二指腸潰瘍、食道痙攣、幽門痙攣、胃炎、腸炎、膽管炎、膽結石、尿路結石、痙攣性月經困難等痙攣性疼痛。

### 3 用法及用量

#### 3.1 用法用量


一次 10~20mg (1~2錠) 1 日 3~5 次增減。

### 4 禁忌

- 4.1 綠內障的患者。
- 4.2 前列腺肥大造成排尿障礙的患者。
- 4.3 重症的心臟病患者。
- 4.4 麻痺性。
- 4.5 對本品有過敏的病歷者。

### 5 警語及注意事項

#### 5.1 警語/注意事項



有眼的調節障礙、思眠、眩暈等副作用開車前及從事機械操作的病人切勿投與。

## 6 特殊族群注意事項

### 6.1 懷孕

妊娠婦投藥的安全性尚未確立。妊娠婦及有懷孕可能的婦人，投藥的安全性及有益性判定尚未對病人有益時不宜投藥。

### 6.4 小兒

小兒投藥的安全性尚未確立。

### 6.8 其他族群

#### 6.8.1 下列族群慎重投與

6.8.1.1 有前列腺肥大的患者。

6.8.1.2 有鬱血性心不全的患者。

6.8.1.3 不整脈的患者。

6.8.1.4 潰瘍性大腸炎的患者。

6.8.1.5 甲狀腺機能高進症的患者。

## 7 交互作用

7.1 下列各藥劑會增強本品的作用：

7.1.1 三環系抗鬱劑。

7.1.2 Phenodiamine 劑。

7.1.3 Antihistamine 劑。

7.1.4 Monoamino Acid 酵素阻斷劑。

## 8 副作用/不良反應

### 8.1 臨床重要副作用/不良反應

8.1.1 噁心、嘔吐、噁寒、皮膚蒼白、低血壓等現象出現時需終止給藥並適當的處理。

8.1.2 眼：有時會有調節障礙等現象出現。

8.1.3 消化器：口渴有時有腹部膨滿感、鼓腸、便秘等現象出現。

8.1.4 泌尿器：有時有排尿障害的現象。

8.1.5 精神神經系：有時有頭痛、頭重感。

8.1.6 循環系：有時有心悸高進等現象。

8.1.7 過敏症：有時有發疹現象發生此時需終止給藥。

## 9 過量


目前尚無資訊。

## 10 藥理特性

### 10.1 作用機轉

本品在內臟壁之副交感神經節，具有特殊作用，因此對胃腸、膽及尿道之平滑肌產生特殊的抗痙攣作用。

### 10.2 藥效藥理特性



目前尚無資訊。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

6~1000 錠瓶、鋁箔盒裝。

13.2 效期

如外包裝所示。

13.3 儲存條件

室溫避光保存(25°C)。

#### 製造廠

國嘉製藥工業股份有限公司幼獅三廠 臺中市大甲區日南里工十路2號

#### 藥商

國嘉製藥工業股份有限公司幼獅三廠 臺中市大甲區日南里工十路2號