

樂息伴 膠囊 30 毫克

Lozepam Capsules 30 mg

【性 能】

在動物實驗中，flurazepam hydrochloride可提高對扁桃體和視丘刺激的覺醒閾，並且減低電刺激下視丘的感度反應。對於人體，flurazepam hydrochloride可縮短睡眠潛伏期，減少覺醒週期，因而增加睡眠時間。通常病人服藥後20分鐘內即可入睡，並能維持睡眠7-8小時。

【成 份】

Each capsule contains:

Flurazepam hydrochloride (2HCl)..... 30 mg

【賦 形 劑】

Lactose (Super-Tab)、Starch (Dried)、Triethanolamine、Lactose、Magnesium Stearate

【膠囊成份】

Gelatin、Sunset Yellow FCF、Indigo Carmine、New Coccine、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、Titanium Dioxide、Tartrazine

【適 應 症】

失眠。

【劑 量】

本藥須由醫師處方使用。

因flurazepam hydrochloride可治療各種型態之不眠症，劑量可依個別之症狀而調整，通常劑量是在15-60 mg之間。一般成人劑量是睡前服用30 mg，老年人及體弱者，開始劑量是15 mg，再視其個別反應酌量遞加。

【使用限制】

依賴性(dependence)及禁斷症狀(withdrawal)

在使用benzodiazepine類藥物之治療期時可能會產生依賴性，尤以下列患者較明顯如高劑量長期使用，患者先前有酒精中毒、藥物濫用、嚴重精神或人格異常等情形。為了減低依賴性的產生，投與flurazepam hydrochloride時必須審慎確認症狀並避免長期投與，如需長期投與時

必須評估其治療利益及風險並做定期之治療監測。

禁斷症狀的產生因人而異，可能從幾個小時到一週或更久，常見之症狀輕微者有戰慄、不安、失眠、焦慮、頭痛或精神不集中，有時盜汗，肌肉或下腹的痙攣、認知的異常等亦可能發生，精神錯亂或痙攣則較罕見。

當禁斷症狀發生時，病人需進一步的醫療控制及治療，避免突然斷藥應逐漸減少劑量。

使用flurazepam hydrochloride時併服葡萄柚或葡萄柚汁時應注意可能產生的藥品相互作用。

【注意事項】

Flurazepam hydrochloride跟其他安眠藥一樣，因個人的反應無法預測，服用期間必需避免喝酒。因劑量之改變和病人之敏感性而定，**flurazepam hydrochloride**可能影響病人之某種反應，如駕駛行為能力等。**Flurazepam hydrochloride**與中樞神經藥物併用時例如：神經治療劑、鎮靜劑、抗憂鬱劑、止痛劑和麻醉劑等合併使用，則應注意該藥可增強鎮靜效果。

【警 語】

服用**flurazepam hydrochloride**可能出現夢遊行為，例如：開車、打電話及準備與食用食物。

【儲存條件】

請儲存於 25°C 以下。

【包 裝】

2~1000粒PE塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。

委託者：

新瑞生物科技股份有限公司
台南市中西區民權路 2 段 158 號 2 樓

製造廠：

瑞士藥廠股份有限公司新市廠
台南市新市區中山路 182 號