




鎮咳劑
滅咳康[®]錠 15毫克
MEDICON[®] TABLETS 15mg

【成分】

1. 組成

商品名	Medicon tablets 15mg
有效成分及含量	Dextromethorphan HBr 15mg
其他成分 (賦形劑)	Lactose、Talc、Wheat Starch、Potato Starch、Magnesium Stearate、Hydroxypropyl Cellulose、Microcrystalline Cellulose

2. 性狀

商品名	Medicon tablets 15mg
性狀·劑型	白色圓形之膜衣錠
外形	正面  背面  側面 
大小	直徑約 8.0mm 厚度約 3.4mm
重量	約 0.184g
識別碼	15

【用途(適應症)】

鎮咳。

【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用：
 - (1) 曾因本藥成分引起過敏的人。
 - (2) 服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)或血清素回收抑制劑的抗憂鬱劑(SSRI)的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - (1) 3歲以下。
 - (2) 吸煙、氣喘、慢性阻塞性肺炎患(包括如慢性支氣管炎、肺氣腫)所引起之咳嗽、及伴有濃痰之咳嗽的人。
 - (3) 65歲以上之高齡者。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - (1) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - (2) 同時服用抑制藥物代謝酵素(CYP2D6)之藥物：Quinidine、Amiodarone、Terbinafine。
- 其他使用上注意事項：
 - (1) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
 - (2) 為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (3) 避免陽光直射。
 - (4) 勿超過建議使用量。
 - (5) 不得與含酒精飲料併用。

(6) 調劑時：與藥水一同使用時，會與碘化鉀、碘化鈉等生成難溶性之氫碘酸鹽。另外，如與碳酸氫鈉、氨、茴香精等配合時，會析出游離鹽基，故要避免與上述物質配合使用。

【用法用量】

年齡	每次服用量	一日服用次數
12歲以上	1錠	3~4次
6歲以上未滿12歲	1/2錠	
3歲以上未滿6歲	1/4錠	
3歲以下	請洽醫師診治	

【警語】

● 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：


身體部位	副作用
皮膚	發疹
神經系統	嗜睡、頭痛、眩暈、不適、失眠等
消化道	噁心、嘔吐、食慾不振、便秘、腹痛、口渴、打嗝

● 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (1) 若有任何不適情況產生。
- (2) 有高燒、出疹、持續性頭痛、及持續達一星期以上之咳嗽、或有復發現象的人。
- (3) 呼吸抑制、過敏性反應症狀(呼吸困難、蕁麻疹、血管浮腫等)，如有此症狀出現時，請中止給藥。
- (4) 過量投與後發生嘔氣、嘔吐、尿滯留、運動失調、精神混亂、興奮、神經過敏、幻覺、呼吸抑制、嗜睡等症狀。

【有效成分及其物理化學資料】

一般名：Dextromethorphan Hydrobromide Hydrate
化學名：(9S, 13S, 14S)-3-Methoxy-17-methylmorphinan monohydrobromide monohydrate
分子式：C₁₇H₂₃NO · HBr · H₂O
分子量：370.32
化學結構式：



性狀：白色結晶或結晶性粉末。極易溶於甲醇，易溶於乙醇(95)
及冰醋酸(100)，難溶於水。
熔點：約126℃。
分配係數：16.98 [pH=7，1-Octanol/緩衝液]。

【包裝】

6~1000錠塑膠瓶裝。

【儲存條件】

請儲存於30℃以下。

【類別】

醫師藥師藥劑生指示藥品。

委託者：台灣塩野義製藥股份有限公司
台北市南京東路二段2號4樓
電話：(02)25516336(代表號)
製造廠：台灣東洋藥品工業股份有限公司六堵廠
基隆市七堵區工建西路5號
電話：(02)24512466(代表號)

