

“台裕” 美托拉麥 注射液

Metoclopramide Injection “Tai Yu”

使用含 metoclopramide 成分藥品可能造成遲發性運動障礙(tardive dyskinesia)，此為出現於臉部、舌頭及四肢非自主性的運動障礙，具有潛在的不可逆性與嚴重性。遲發性運動障礙發生之風險與使用本品治療期間與總累積劑量(total cumulative dose)有正相關性，且分析本品之使用型態，約 20%病人使用超過 12 週，故不建議長期(超過 12 週)使用本品治療，除非個案是經過評估，其治療效益高於發生 tardive dyskinesia 之風險者。

【成分】

Each 2ml contains:

Metoclopramide10mg

【適應症】

預防嘔吐、逆流性消化性食道炎、糖尿病引起之胃腸蠕動異常。

【用法用量】

- 1.成人：每日 1 次，每次 10mg 肌肉或靜脈注射。
- 2.小兒：每日 1 次，肌肉或靜脈注射其使用年齡與劑量如下：
- 3.本藥限由醫師使用。

年 齡	6~12 個月	1 歲~3 歲	4 歲~6 歲	7 歲~10 歲	11 歲~15 歲
劑 量	2.5mg	3mg~ 3.5mg	3.5mg~ 5mg	5mg~ 6mg	7mg~ 8mg
每公斤體重 用 量	0.3 mg/kg	0.25 mg/kg	0.25 mg/kg	0.2 mg/kg	0.2 mg/kg

【注意事項】

- 1.孕婦禁用。
- 2.高齡及小兒患者使用時宜慎重之。
- 3.本劑不可與鹼性注射液混合使用，因其可能生成沉澱或混濁。

【警語】

投予新生兒時應特別小心，因新生兒的清除時間較長，可能會造成血中濃度過高。且成人安全性資料不能外推至新生兒族群，使用 metoclopramide 藥品相關的不良反應如肌張力失調(dystonias)及錐體外路徑反應(extrapyramidal reactions)，於小兒族群比起成人更容易發生。

【賦形劑】

Sodium Chloride、Sodium Bisulfite、Benzyl Alcohol、Water for Injection。

【貯藏條件】

25°C 以下避光貯存。

【包 裝】

2mlx10 Amp、2mlx50 Amp。



台裕化學製藥廠股份有限公司
TAI YU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.
新竹縣竹東鎮員山路 11 巷 13 弄 1 號
TEL : (03)5826655 FAX : (03)5822389