

“生達”

美舒咳錠

(鹽酸氨布索)

MUSCO


Tab. 30mg
“Standard”
(Ambroxol Hydrochloride)

本品為臨床上使用祛痰劑。能刺激呼吸道界面活性劑的形成及調節漿液性與黏液性的分泌，可同時改進呼吸道纖毛區與無纖毛區的清除作用，降低痰液及纖毛的黏著力，進一步使痰容易咳出，且減輕咳嗽的現象。由於本品耐受性良好，可長期服用。

成分：每錠含

Ambroxol Hydrochloride30mg

作用機轉：



作用特點：

1. 具有獨特的作用機轉：刺激界面活性劑形成與分泌。
2. 作用範圍廣：由肺泡（無纖毛區）到氣管皆可作用。
3. 胃腸吸收良好：效果確實。
4. 持續作用時間長達9-10小時。
5. 口服投與72小時後，可完全由尿中排除。

適應症：祛痰。

用法用量：

飯後吞服。

成人及10歲以上的小孩：每日3次，每次1錠。

5-10歲的小孩：每日3次，每次1/2錠。

長期治療劑量可減低為每日2次。

本藥須由醫師處方使用。

禁忌症：尚未知。

警語及注意事項：

1. 懷孕時：誠如任何製劑，於懷孕的前三個月並不推薦使用。
2. 交互作用：Musco可與其他藥物併用，尤其是可與抗生素、皮質類固醇及支氣管擴張劑等藥品併用。
3. 過量：目前在人類尚無過量的症狀被報導。如果發生時，應使用對症療法。
4. 有極少數的報告指出，發生如：多形性紅斑（erythema multiforme）、史蒂文斯-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症（Stevens-Johnson syndrome <SJS> / toxic epidermal necrolysis <TEN>）、急性廣泛性發疹性膿疱症（acute generalised exanthematous pustulosis <AGEP>）等嚴重皮膚損害，與使用祛痰劑，如含 ambroxol 或 bromhexine 成分藥品有時間關聯性，但這些案例通常與患者的潛在疾病及/或併用藥物有關。此外，在該等嚴重皮膚不良反應的早期階段，患者可能先出現類似流感的非專一性前兆症狀（如：發燒、身體感覺疼痛、鼻炎、咳嗽及喉嚨痛）。若受這些類似流感之非專一性前兆症狀的誤導，一開始可能會使用咳嗽及感冒藥來作症狀治療。因此，如果皮膚或黏膜出現新的傷口，須立刻尋求醫療諮詢並停藥。

不良反應：

免疫系統疾患：

罕見：過敏反應（hypersensitivity reactions）

頻率未知：過敏性反應（anaphylactic reactions）（包括：過敏性休克、血管性水腫、瘙癢症）

皮膚及皮下組織疾患：

罕見：皮疹、蕁麻疹

頻率未知：嚴重皮膚不良反應（包括：多形性紅斑、史蒂文斯-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症、急性廣泛性發疹性膿疱症）

副作用：Musco通常有良好的耐受性。只有少數患者有輕微的胃腸不適及過敏反應。

貯存條件：25°C以下儲存。

賦形劑：Cellulose Microcrystalline, Pregelatinized Starch, Potato Starch, Sodium Saccharin, Water Purified, Aerosil, Powdered Cellulose, Magnesium Stearate, Alcohol 95%, Menthol

包裝：6-1000錠鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

衛署藥製字第031896號 G-1459 Code No. TM-05 2211890



PIC/S GMP藥廠

生達化學製藥股份有限公司
STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.
台南市新營區土庫里土庫6之20號

20170401