

納靜膜衣錠 5 毫克

Nargin F.C. Tablets 5 mg

衛署藥製字第 055108 號

G-11034

【成分】 Each tablet contains : Nordazepam 5 mg。

【適應症】 焦慮、緊張所引起的精神障礙。

【用法用量】 依文獻記載

本藥須由醫師處方使用。

成人每天服用 2~3 次，每次 1 錠。

【注意事項】 依文獻記載

1. 重症肌無力，懷孕及哺乳期禁用本藥。
2. 服藥過量可能有運動失調及呆滯步伐的現象。
3. 本藥可能導致肺活量降低，尤其是母親在分娩前剛服用此藥後所生產之新生兒最易發生。
4. 酒精會增加本藥之效力，故應避免喝酒。
5. 與其他抗焦慮藥或安眠藥(Narcotics, Barbiturates and Phenothiazines)合用時需小心。
6. 白天服用本藥可能會降低反社運動。
7. 長期使用可能導致心理上的依賴。
8. Benzodiazepine 類藥品與 opioid 類藥品併用，可能導致重度鎮靜(profound sedation)、呼吸抑制、昏迷及死亡之風險，固僅限於其他療方式均無法達到預期效果時，方可考慮併用，且應使用最低有效劑量及最短治療時間，並嚴密監測病人是否有呼吸抑制及鎮靜等相關症狀。

【警語】 依文獻記載

依據隨機分派，有對照組的臨床試驗(Randomized controlled trial, RCT)臨床試驗及回溯性世代研究(Retrospective cohort study)發現，抗精神病藥品，包括傳統(Conventional)與非典型(Atypical)之抗精神病藥品用於治療老年失智症病患(dementia-related psychosis)的死亡率與安慰劑組比較，其死亡之相對危險性較高。

【賦形劑】

Lactose, Microcrystalline Cellulose, Sodium Starch Glycolate, Talc, Magnesium Stearate, Hydroxypropyl Methylcellulose, Polyethylene Glycol 6000, Propylene Glycol, Titanium Dioxide, Tartrazine Aluminum Lake, Sunset Yellow No.5 Aluminum Lake.

【包裝】 4-1000 錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

【儲藏】 25°C 以下儲存。

製造廠：十全實業股份有限公司

地址：南投縣南投市南崗工業區仁和路 27 號

委託者：萬宇康有限公司

地址：台北市忠孝東路 3 段 199 之 4 號(4F)

電話：(02)27764851