

【成分】 Each F.C.Tablet contains:

Flupentixol 3mg (as Dihydrochloride)

【賦形劑】 Cellactose、Primojel、Mg. stearate、Sepifilm 3024、Polishing wax-103、Alcohol (95%)、Sepisperse Dry 3214、Purified Water.

【臨床藥理】 Flupentixol 為 Thioxanthene 類之強效、無鎮靜作用之抗精神病藥，能迅速改善精神病症狀，也能改善焦慮，使精神較活潑。後項療效使本藥適合於退縮、情緒淡漠、缺少精力或合併憂鬱症狀的病人，或容易因具強鎮靜作用而顯得疲倦或思睡的病人。

【適應症】 精神病狀態。

【用法·用量】 本藥須由醫師處方使用。

1.精神分裂症及類似精神病：

每天 3-15mg，分 2 至 3 次給藥，需要時可提高到每天 30mg。

2.妄想症：

初劑量每天二次，每次 0.5mg，然後繼續增加劑量至每天 2-3 次，每次 1mg。維持劑量：每天 1-1.5mg。

3.智能不足及癲癇合併精神病：

初劑量每天 1-2mg，然後依病人之反應酌量增減，每日最高劑量為 4mg。

【注意事項】

1. 痙攣疾病、嚴重肝腎及心血管疾病應審慎投予。
2. 本藥可能影響駕駛及操作機器
3. 極度激動病人，急性巴比妥酸鹽、酒精和鴉片中毒的病人應禁用，孕婦禁止使用本藥。
4. 過量時，針對所出現之症狀做必要的治療。維持呼吸暢通及血壓正常，但不可用 Epinephrine。

【交互作用】

1. Flupentixol 會加強酒精、巴比妥鹽及其他中樞神經抑制劑之作用。Flupentixol 與 Phenobarbital 及 Carbamazepine 併用時之血中濃度會降低。
2. 與鋰鹽併用會加強神經毒性。

【副作用】

1. 中樞神經系統：錐體外症狀可能於治療初期產生，可藉降低劑量及抗巴金森氏症藥物的投與來改善，其他偶有失眠、無力、過動、激動等現象。
2. 自主神經系統：口乾、視力模糊、便秘、唾液增加。
3. 內分泌系統和代謝：體重改變、女樣化男乳、陽痿、月經週期改變、乳漏。
4. 過敏中毒：高膽紅素血症、黃疸、全身性紅斑狼瘡、溶血性尿毒症。
5. 皮膚：紅斑、紅疹、禿髮。

【警語】

依據隨機分派，有對照組的臨床試驗(Randomized controlled trial, RCT)臨床試驗及回溯性世代研究(Retrospective cohort study)發現，抗精神病藥品，包括傳統(Conventional)與非典型(Atypical)之抗精神病藥品用於治療老年失智症病患(dementia-related psychosis)的死亡率與安慰劑組比較，其死亡之相對危險性較高。

【儲存】本藥應儲存於 25°C 以下緊密容器，置於兒童不及之處。

【包裝】2~1,000 錠 塑膠瓶裝及鋁箔盒裝

製造廠：皇佳化學製藥股份有限公司

ROYAL CHEM. & PHARM. CO.LTD.

高雄市鳥松區埤埔里埔安街 1 號

電話：(07)7310537

委託者：意欣國際有限公司

高雄市三民區懷安街 119 號

電話：(07)3863323