



"瑞士"

瑞平 膠囊25毫克(慮平)

Rosup Capsules 25mg "Swiss"(Loxapine)

本品為 Dibenzoxazepine 類抗精神病藥物，適用於妄想型精神分裂之治療，可改善精神病狀態引起的諸症狀，如：精神分裂症產生的：疑慮、抑鬱、敵對、罪惡感；或精神遲滯表現的：焦慮、緊張、興奮、乖張、不合作。

【成份】

Each capsule contains :

Loxapine Succinate 34mg

eq. to Loxapine25mg

【賦形劑】

Lactose、Magnesium Stearate

【膠囊成份】

Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Titanium Dioxide、Brilliant Blue FCF、Tartrazine

【藥理作用】

1. Dibenzoxazepine 此類藥物，可抑制腦中 Dopamine receptor 而改善精神病症狀，但本品作用機轉尚未很清楚，據目前動物研究發現：本品使大腦皮質下抑制區的興奮度改變，此具有抑制攻擊性行為之鎮靜作用，亦與安定作用有關連。
2. 用於治療急、慢性精神分裂，由臨床試驗顯示：以本品治療4-12週後則 Loxapine之療效與 Chlorpromazine, Haloperidol, Trifluoperazine 或 Thiothixene 相類似。

【適應症】

精神病狀態。

【用法用量】

初劑量：1天2次，一次口服10mg，重症患者初劑量可達1日50mg，於7-10天內增加至理想劑量，通常治療劑量及維持劑量為1日60-100mg，劑量視病情可酌量增減，1日最大劑量250mg。本藥須由醫師處方使用。

【副作用】

1. 中樞神經系統：開始服用之早期或增加劑量時，可能有輕度昏沉感，通常於繼續服藥後消失。
2. 錐體外反應：服藥期間可能引起類帕金森氏症如：震顫、僵硬、流涎及假面狀面容、靜坐不能。若有此類反應，則應降低本品劑量或停藥。
3. 遲發性運動困難：常見於老年、大劑量使用之病患，若發生亦應停藥。
4. 偶有抗膽鹼作用：口乾、鼻塞、便秘、視力模糊等症狀。其他副作用：噁心、嘔吐、體重增加、顏面潮紅。

【注意事項】

1. 下列患者禁用本品：已昏迷之患者、或嚴重藥物引起之憂鬱情況(酒精、巴比妥類、麻醉劑等)；已知對 Dibenzoxazepines 過敏之患者、癲癇患者。
2. 孕婦及授乳婦要審慎使用，16歲以下兒童勿用。
3. 長期使用須注意本品可能引起之眼毒性。

【警語】

1. 本品為一種非典型抗精神病藥品，使用非典型抗精神病藥物會出現高血糖及增加罹患葡萄糖耐受性不良或糖尿病風險。少數嚴重之案例有可能出現酮酸血症 (ketoacidosis) 和高血糖高滲透壓非酮體性症候群 (Hyperglycemic Hyperosmolar Nonketotic Coma) 等急症導致昏迷甚至死亡。
2. 所有接受非典型抗精神病藥品之病人，應密切留意高血糖症狀 (如：多食、劇渴、多尿或無力)，若出現高血糖症狀時，應立刻測量血糖值。有糖尿病或糖尿病危險因子 (如：肥胖、有糖尿病家族史等) 之病人，用藥前應監測血糖，用藥中也應定期監測血糖。對於出現明顯需要緊急治療高血糖的病患，應考慮停藥，有些病患停藥後仍須使用抗糖尿病藥品治療。
3. 碳水化合物代謝平衡可能會受到改變而造成葡萄糖恆定狀況受損，因此可能會讓糖尿病前期徵狀顯現，或是造成既有的糖尿病病情惡化。
4. 依據隨機分派，有對照組的臨床試驗(Randomized controlled trial, RCT) 臨床試驗及回溯性世代研究(Retrospective cohort study) 發現，抗精神病藥品，包括傳統(Conventional)與非典型(Atypical)之抗精神病藥品用於治療老年失智症病患(dementia-related psychosis)的死亡率與安慰劑組比較，其死亡之相對危險性較高。

【儲存條件】

請儲存於25°C以下。

【包裝】

2-1000 顆塑膠罐裝、鋁箔盒裝。

瑞士藥廠股份有限公司

SWISS PHARMACEUTICAL CO.,LTD.

新市廠：台南市新市區中山路182號