

## “台裕” 氯化鈉 點滴注射液 0.9%

**Sodium Chloride Injection 0.9% “Tai Yu”****【成分】**

Each ml contains:

Sodium Chloride.....9.0mg

電解質組成(mEq/L)：Na<sup>+</sup>154, Cl<sup>-</sup>154。

滲透壓比：約 1(等張)。

**【作用】**

1. 補充外科手術等水或電解質之缺乏，以維持有效細胞外液量，安定循環機能；但僅用於輸血間血漿量之維持。
2. 對細胞外液之等張性有妨礙之藥品，可用本品當溶劑。

**【適應症】**

手術或其他疾患之水分及電解質之補給。

**【用法用量】**

本藥限由醫師使用。

1. 成人每次 250~1000ml 靜脈點滴注射，投藥速度以每小時 300~500ml 為宜(即每分鐘約 80~130 滴為度)。
2. 皮下、肌肉或靜脈注射時，由醫師視症狀酌予增減使用。

**【注意事項】**

- (一) 1. 心臟、循環系統機能障礙患者及腎疾患者，宜慎重投藥。  
2. 大量急速投藥，其副作用有：血清電解質異常、鬱血性心不全、浮腫或酸中毒等現象。  
3. 用前應詳予檢視，如溶液為澄清透明方可使用；輸液玻璃瓶裝者應再拍打瓶底，如有反彈之中空清脆聲(真空)，方可使用。
- (二) 取用時：  
1. 運輸過程中，容器可能因受重擊、震動，而致產生破裂、縫隙或瓶塞鬆動；若發現有上述情形時，請勿使用。  
2. 若藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。
- (三) 輸液套選用及插入法：  
1. 請依輸液套使用方法正確使用。  
2. 請使用附有過濾裝置之輸液套，導入針應以垂直方式插入橡皮塞；插入後請勿扭轉，以免因針割(Coring)產生碎片。  
3. 使用前請再檢視，確定無異物後，方可使用。
- (四) 軟袋包裝：  
1. 軟袋內外袋皆經高壓蒸氣滅菌，為保持產品之無菌性，請在使用前始將外袋撕棄。  
2. 為確保內袋密封之完整性，去除外袋後請用力緊壓內袋，如發現有漏液，請勿使用。  
3. 外袋內存留之水氣，係於產品滅菌時形成之無菌冷凝水，為正常現象與漏液無關。  
4. 軟袋內外袋為透明包裝，易於檢視內袋包裝及內容物，若發現藥液有不澄清、變色、異物或其它異常現象時，請勿使用。  
5. 請在使用前先以酒精棉球擦拭輸液頭及加藥頭之橡塞後，方可使用。  
6. 軟袋內外袋皆採非 PVC 包裝材質，無污染性、無毒性、敬請安心使用。  
7. 使用前請詳閱內袋上說明。

**【賦形劑】**

Water for Injection。

**【貯藏方法】**

室溫避光貯存。

**【包裝】**

20 毫升安瓿，100 支以下盒裝。

100、250、500、1000 毫升玻璃瓶，100 支以下盒裝。

100、250、500、1000 毫升塑膠瓶，100 支以下盒裝。

50、100、250、500、1000、1500、1600、1750、2000、3000 毫升塑膠軟袋，100 袋以下盒裝。



台裕化學製藥廠股份有限公司  
 TAI YU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.  
 新竹縣竹東鎮員山路 11 巷 13 弄 1 號  
 TEL：(03)5826655 FAX：(03)5822389