



"永勝"

舒胃錠

Suwell Tablets "EVEREST"

由於日常生活之緊張或因暴飲暴食而致引起胃酸過多、脹氣之現象。本品為制酸、抗脹氣之配合劑，以制酸劑 Aluminum Hydroxide, Magnesium Hydroxide 配合消泡劑 Simethicone，不但具有制酸力，亦有消泡作用，使胃腸內氣體排出，對於緩解脹氣有功效，因此本劑為胃酸過多、及腸胃氣脹之緩解劑。

【成分】：每錠內含

Dried Aluminum Hydroxide Gel200mg
Magnesium Hydroxide200mg
Simethicone25mg
單次劑量 (2錠) 之酸中和能力為 17.6mEq，鎂含量為 13.72mEq，鈉含量為 7.2mEq。

【藥理作用】：

1. Aluminum hydroxide as dried gel 是一種制酸劑，能中和過多之胃酸。
2. Magnesium hydroxide 亦為胃酸中和劑，具有制酸力。
3. Simethicone 為消泡劑，在胃腸道內能消除脹氣，其作用在於改變胃腸內小氣泡之表面張力，使聚合成大氣泡，自胃腸粘膜游離，而易於嗝氣或腸道排出。

【適應症】：緩解胃部不適或灼熱感、或經診斷為胃及十二指腸潰瘍、胃炎、食道炎所伴隨之胃酸過多，解除脹氣、緩解氣脹相關症狀。

【用法、用量】：

一天3次，或需要時服用。應嚼碎後吞服。成人每次2錠，12歲以上適用成人劑量；6歲以上未滿12歲，每次1錠；3歲以上未滿6歲，每次1/2錠；3歲以下之嬰幼兒，請洽醫師診治，不宜自行使用。
醫師藥師藥劑生指示藥品。

【注意事項】：

- 一、為防止兒童誤食請妥善保管。
- 二、避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- 三、除非醫師藥師藥劑生指示，孕婦及授乳婦不建議自行使用。
- 四、勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。

【警語】：

- 一、除非有醫師藥師藥劑生指示，請遵循下列情況服用：
 - (一) 未滿3個月之嬰兒不得服用。
 - (二) 本藥每日最大建議劑量之含鈉量超過5mEq (0.115g)，須限鹽飲食之患者不要服用。
 - (三) 一天內不可服用超過一日最大劑量，也不可連續服用一日最大劑量兩週以上。
 - (四) 不得併用其他藥品。
- 二、如有慢性胃痛、胃部不適或灼熱感，應先就醫確定診斷後再行服用。
- 三、消化道潰瘍患者應先就醫，不要自行服藥。
- 四、本藥含鋁之制酸成分可能會引起便秘，偶有噁心、嘔吐。
- 五、腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症 (Dialysis Osteomalacia)、透析性腦病變 (Dialysis encephalopathy) 及低磷血症，應謹慎小心使用。
- 六、本藥含鎂之制酸成分可能會引起腹瀉。

【賦形劑】Corn Starch、Sucrose、Strawberry Essence、Sodium Starch Glycolate、Talc、Magnesium Stearate、Sodium Saccharin、Erythrosin、Menthol。

【貯藏】：25℃以下、防濕、遮光保存。

【包裝】：12~1000錠塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝，2000錠塑膠瓶裝。

衛署藥製字第034886號



嘉義頭橋工業區工業三路6-3號
諮詢電話:05-2218686 (代表號)