

比洛達錠

Syntocriptine Tablets

衛署藥輸字第 019879 號

【組 成】

Bromocriptine mesylate 2.87mg (相當於 Bromocriptine 2.5mg)

【賦形劑】

Lactose monohydrate
Sodium starch glycolate
Microcrystalline cellulose
Maleic acid
Disodium edetate
Magnesium stearate

【適應症】

激乳素分泌腺瘤、激乳素引致之月經不規則、帕金森氏症、限用於因不得已之醫學理由須預防或抑制產後生理性泌乳之情形，例如：死胎、新生兒死亡或 HIV 感染之母親...等。本品不建議用於常規性抑制泌乳或緩解產後乳房疼痛及腫脹之症狀，此類症狀以非藥物方式(例如：支撐乳房、冰敷)及/或簡單之止痛藥即可充分緩解。

【用法及用量】

本藥須由醫師處方使用。本劑須用餐時一起服用，不論最終劑量為何，須依照下列指示則會產生最大藥效與最小副作用。初劑量為半錠，2~3 天後於睡前服用一錠，可每 2~3 天增加半錠至每次服用一粒，每天二次。若須再加大劑量，須依照上述增加劑量之方法。

·抑制泌乳：分娩日服用一錠，第 2~14 天，每天 2 次，每次一錠。

·壓制泌乳：第一天一錠，第 2~14 天，每天 2 次，每次一錠。

·生殖腺功能不足、激乳素分泌腺瘤、乳溢、不孕：最終劑量為每天三錠，分次服用。但最多曾使用至每天 12 錠。沒有激乳素過多之病人每天二次，每天一錠。

·周期性良性乳房疾病、周期性乳腺痛、周期性月經障礙：最終劑量為每天二次，每次一錠。

·先端肥大症：最終劑量每天 8~24 錠。

·帕金森氏症：每天 4~32 錠，分次服用。

【注意事項】

1. 雖然 Syntocriptine 可能降低因腦垂體腫瘤所導致之激乳素升高現象，但不應影響該腫瘤本身或需接受其它放射線或手術治療之考量。
2. 懷孕婦女仍建議使用 Syntocriptine。但由於 Syntocriptine 不會導致畸胎或對胎兒有其他作用之證據日漸增加，對於腫瘤較大或較有擴大疑慮之懷孕病患，可以考慮繼續 Syntocriptine 之治療。
3. 使用 Syntocriptine 治療時，欲避孕之病人應不要使用口服避孕藥，而改用其他避孕措施。在生育年齡但卻沒有激乳素過多現象。
4. 使用 Syntocriptine 之婦女，應長期接受包括子宮頸及子宮內膜細胞診斷在內之婦科追蹤檢查。停經後之婦女應每 6 個月進行一次評估，行經期中之婦女則應每年進行一次評估。
5. 肢端肥大病人應先做消化性潰瘍方面之評估，再進行 Syntocriptine 治療，且應提示病人隨時報告胃腸方面之副作用。
6. 有精神錯亂或嚴重心血管病史之病人使用高劑量 Syntocriptine 時應特別慎重。
7. 噁心是最常見之副作用，另亦有姿勢性低血壓、眩暈、頭痛、嘔吐及便秘等報告。當 Syntocriptine 於用餐時服用及採用漸進式劑量則副作用可望減少。
8. 高劑量之治療時，偶有於寒冷狀況下引起手指或腳趾血管痙攣之報告。
9. 用高劑量治療巴金森氏症時，曾有思睡、迷亂、精神運動性興奮、迷幻、運動困難、口乾、及下肢痙攣之報告。
10. 使用含 Bromocriptine 成分藥品抑制泌乳之產後婦女中，曾有罕見之通報案例發生嚴重不良事件，包括：高血壓、心肌梗塞、癲癇發作、中風或精神疾病。有些病患於癲癇發作或中風發生前會有嚴重之頭痛及/或短暫之視覺障礙。服藥期間須小心監測患者之血壓，特別是開始治療時之最初幾天。若病人出現高血壓、胸痛、嚴重、惡化或無法緩解之頭痛(不論是否伴隨視覺障礙)或中樞神經系統中毒之症狀，應立即停藥並評估病人之狀況。
11. 長期高劑量治療之帕金森氏症患者，偶有胸膜與肺纖維化，以及腹膜纖維化之報告，應特別注意相關症狀(胸肺不適、下肢浮腫、腎功能不良等等)必要時應立即停藥。

【禁忌】

對 Bromocriptine 或其他麥角鹼過敏者，本品禁用於未控制之高血壓、懷孕期高血壓、(包括：子癇-Eclampsia、妊娠毒血症-Pre-eclampsia、妊娠-高血壓 pregnancy-induced hypertension)，分娩後及產褥期高血壓患者。具冠狀動脈疾病或其他嚴重心血管疾病病史，或具嚴重精神疾病之症狀或病史者，禁用本品於抑制泌乳或其他非危及生命之適應症。

【包 裝】

4~1000 粒盒裝。

許可證持有者：Codal Synto Ltd.

地 址：6TH FLOOR, DOROTHEA BLDG, THEKLAS LYSIOTI STR., 3030 LIMASSOL-CYPRUS

委託製造廠：Medochemie Ltd.

地 址：1-10 CONSTANTINOPOLEOS STREET, 3011, LIMASSOL, CYPRUS

藥 商：吉富貿易有限公司

地 址：台北市內湖區行愛路 77 巷 69 號 7 樓