

"瑞安" 定樂平 (阿廷諾) 膜衣錠 100 公絲

"PURZER" TENOLOL (Atenolol) F.C. Tablet 100mg

衛署藥製字第 032322 號 G-1682 號

本劑 Atenolol 是一種合成乙型腎感受體阻斷劑，具選擇性的作用在心臟的乙型感受體上，沒有 ISA 及 MSA 的作用。本劑由於每天只需服用一次，且可維持 24 小時，故於治療上可得病患之充份合作。本劑由於劑量範圍狹窄及迅速的反應，很快的便可看出藥物在病人身上的效果，而且本劑可和其他的利尿劑、抗高血壓製劑及狹心症治療劑配合使用。本劑因僅作用於心臟的乙型感受體上，故可用於不能服用無選擇性的乙型阻斷劑的呼吸道疾病的患者身上。

「成分」：每錠含

Atenolol 100mg

「適應症」：

高血壓、狹心症。

「用法與用量」：

1. 高血壓：本劑每天口服 50mg 至 100mg，每日服用一次，其藥效在服用後一或二星期即可呈現。
2. 狹心症：大部份狹心症患者每日口服 100mg，一次或分數次服用即有良好的反應，增加劑量不能相對增加療效。

「禁忌」：

本劑禁服用於有二度或三度心臟傳導阻斷之病，本劑亦禁服用於心臟休克之病人。

「注意事項」：

對心臟衰竭的病人要特別注意，乙型阻斷劑禁止使用於明顯的心臟衰竭，然而可使用於心臟衰竭已控制住的病人。

本劑藥理效果之一是降低心跳率，極少出現心跳緩慢現象，此時可減少藥量。

本劑會掩飾低血糖症所導致的心搏過速。本劑可小心地使用於患有慢性呼吸道阻礙的病人，然而也可能會增加氣喘病人的呼吸阻礙，但與其他非選擇性乙型阻斷劑不同的是這種支氣管痙攣可用一般的支氣管擴

張劑來加以緩和，如 Salbutamol 或 Isoprenaline。

患有缺血性心臟病的患者，如同其他乙型阻斷劑，治療不可突然中斷，於處方乙型阻斷劑和第一類抗心律不整劑，例如 Disopyramide 共用時，要加以注意。

當乙型阻斷劑和 Verapamil 同時使用於心室機能不全的病人時，要加以注意，並且不可同時將此二藥給予心臟傳導機能不正常者，而且任一種藥需在另一種停用 48 小時後才可使用。

當病人從服用 Clonidine 轉移至乙型阻斷劑時，要加以注意，而且當 Clonidine 與乙型阻斷劑同時使用時，必須於乙型阻斷劑停藥數日後才可停用

Clonidine(請參考 Clonidine 處方資料)。

麻醉：對大多數病人，手術前並不建議停用乙型阻斷劑。然而，使用麻醉劑如乙醚、Cyclopropane 和 Trichloroethylene 宜特別注意，若發生 Vagal dominance 時，以 Atropine(1-2mg, IV) 解除。

腎衰竭：

因為本劑經由腎臟排泄，所以對嚴重腎臟機能失常的病人應隨情況調整劑量。迄今本劑即使在 GFR 之量大於 35ml/min/m² 時，並無明顯的積蓄現象(正常標準為

100-150ml/min/1.73m²)。患者若其 Creatinine clearance 為 15-35ml/min/1.73m² (相當於血清 Creatinine 大於 300-600micromole/litre) 時則服用劑量應為每日 50 毫克或每隔一天服用 100 毫克一次;若患者之 Creatinine clearance 小於 15ml/min/1.73m² (相當於血清 Creatinine 大於 600micromole/litre) 時則劑量為每隔一天服用 50 毫克或每第四天服用 100 毫克。患者於每次血液透析後宜服用 50 毫克，且必須由醫護人員加以監視觀察，因可

能發生顯著之血壓下降。

妊娠：在嚴密的監視下，本劑可用於治療孕婦之高血壓，即使給予懷孕 20 週之婦女時，並未曾有使嬰兒不正常的報告。

本劑會穿透胎盤及出現於臍帶之血液中，乳汁中之濃度約可達三倍，但是對嬰兒之出生或餵乳並無明顯的影響。但不排除其對新生兒之傷害的可能性，故對懷孕將懷孕或正在對新生兒哺乳之婦女，必須先加以衡量其可能的危險性。

副作用：根據臨床研究，副作用係由於其本身藥理作用之故，包括四肢冰冷、肌肉疲勞、和心跳徐緩；至於其他乙型阻斷劑常見的睡眠不寧，本劑無此報告。曾有因服用乙型阻斷劑而發生皮膚疹及乾眼的報告，但此副作用很少發生，停藥後可消除此症狀；如果此副作用無法解除則需考慮停止用藥，而乙型阻斷劑之停止使用是要採取漸進方式。

過量之處理：過度心跳徐緩可用靜脈注射 Atropine 1-2mg。假如需要，可追加靜脈注射 Glucagon 10mg，必要時可重複使用，或視病

人反應以靜脈點滴注射 Glucagon

1-10mg/hour。若對 Glucagon 無反應或無法取得，則投與乙型感受器興奮劑，如靜脈注射 Prenalterol 5mg，必要時再投與 Prenalterol 5mg/小時或靜脈點滴注射 Dobutamine 2.5-10mg/kg/分鐘。

使用乙型感受器協同劑(Agonist)時會有低血壓現象，能以較具選擇性之 Prenalterol 和 Dobutamine 減輕之。

本藥須由醫師處方使用

「貯藏」：

室溫避光貯存

「包裝」：

1000 錠以下鋁箔盒裝、瓶裝

製造商：瑞安大藥廠股份有限公司

PURZER PHARMACEUTICAL CO., LTD.

桃園縣觀音鄉觀音工業區大同一路 26 號

電話：(03)483-9641~3

服務電話：0800-221308