



“杏輝”

PIC/S GMP 藥品

悠力素[®] 乳膏

ULEX Cream “Sinphar”

—— Antipruritic and Anti-inflammatory agent ——

—— 鎮癢、消炎、治療劑 ——

本藥成分為Crotamiton、Hydrocortisone，並具有以下作用

- (1)止癢
- (2)緩解紅斑的症狀
- (3)改善皮疹
- (4)治療寄生蟲體感染症

【成分】

有效成分及含量：每gm含有

Crotamiton.....100mg

Hydrocortisone.....2.5mg

其他成分(賦形劑)

Stearyl Alcohol、White Petrolatum、Polyoxy 40 Stearate、
Propylparaben、Methylparaben、Propylene Glycol、
Perfume (Ireine)、Water Purified.

【用途(適應症)】濕疹、皮膚炎群(包括進行性指掌角皮症、單純性苔癬、放射線皮膚炎、日光皮膚炎)、皮膚搔癢症、凍傷、乾癬、寄生性蟲體感染症(疥瘡)及昆蟲刺傷。

【使用上注意事項】

1、有下列情形者，請勿使用：

- (1)曾因本藥成分引起過敏的人。
- (2)有皮膚結核、單純皰疹、水痘、帶狀皰疹、種痘疹；真菌症；潰瘍，第二度深在性以上的燙傷、凍傷的人。

2、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

- (1)3歲以下。
- (2)有深部皮膚組織感染。

3、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

- (1)兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- (2)要使用於臉部。

4、其他使用上注意事項：

- (1)為防止兒童誤食請妥善保管。
- (2)避免陽光直射。
- (3)勿超過建議使用量或使用次數。
- (4)使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
- (5)本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)，潰爛、龜裂或嚴重外傷的患部。
- (6)本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
- (7)使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
- (8)本藥不可連續使用超過7天。
- (9)皮膚的黴菌或細菌性皮膚感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。
- (10)小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。
- (11)臉部、腋部及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。
- (12)癬類或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。
- (13)請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立刻前往眼科就醫。
- (14)使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。
- (15)請勿使用在患部以外，也勿當作預防使用。

【用法用量】適量塗擦於患處，一天數次。

【警語】

1.使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、瘡子、毛細管擴張。
全身性	庫欣氏症候群(如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)。繼發性腎上腺功能不足(如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等)。

2. 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (1) 若有上述外之其他不適情況產生。
- (2) 使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包裝】1000公克以下鋁管裝、積層鋁管裝、塑膠瓶裝。

【儲存】25℃以下保存，避免日光直射，並置放於兒童不易取得之處。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。衛署藥製字第026636號



® 杏輝藥品工業股份有限公司

SINPHAR PHARMACEUTICAL CO., LTD.

台灣宜蘭縣冬山鄉中山村中山路84號

84, CHUNG SHAN ROAD, CHUNG SHAN VILLAGE, TUNG - SHAN SHINE, I - LAN, TAIWAN

消費者服務專線：(0800)015151

website：http://www.sinphar.com