

抗組織胺劑

# 柏那膜衣錠 10毫克

VENA F.C.TABLETS 10mg

(內衛藥製字第05124號) ㊟

## 【成分】

有效成分及含量

每一錠含有Diphenhydramine Hydrochloride.....10mg

其他成分(賦形劑)

Corn Starch、Lactose、Calcium Phosphate Dibasic、Dextrin、Magnesium Stearate、Polyvinyl Acetate、Talc、Aluminum Silicate、Silicon Resin

## 【用途(適應症)】

緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。

## 【使用上注意事項】

- 有下列情形者，請勿使用
  - 曾因本藥成分引起過敏的人。
  - 哺乳婦。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治
  - 嚴重代謝性肝腎疾病的人。
  - 三歲以下。
  - 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生
  - 孕婦、可能懷孕婦女。
  - 65歲以上。
  - 服用鎮靜藥或安眠藥的人。
  - 服用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮痛藥、鼻炎藥或抗過敏藥等的人。
- 其他使用上注意事項：
  - 為防止兒童誤食請妥善保管。
  - 避免陽光直射。
  - 勿超過建議使用量。
  - 不得與酒精性飲料併用。
  - 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。

## 【用法用量】

成人及12歲以上	每次3錠，一日3至4次，每次間隔4小時以上服用。
6歲以上未滿12歲	適用成人劑量之1/2。
3歲以上未滿6歲	適用成人劑量之1/4。
3歲以下之嬰幼兒	請洽醫師診治。

## 【警語】

- 服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
神經系統	倦怠感、興奮。
其他	口乾、視覺上之困擾。

- 服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
  - (一) 若有任何不適情況產生。
  - (二) 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

## 【包裝】

18~1,000錠玻璃瓶裝。

## 【類別】

醫師藥師藥劑生指示藥品。

## 【儲存條件】

請存放於25°C以下、避光密閉容器中儲存。



製造廠：台灣田邊製藥股份有限公司新竹廠

廠址：新竹縣湖口鄉光復北路97號

藥商：台灣田邊製藥股份有限公司

地址：台北市南港區市民大道七段8號14樓之1