

活性持續型維生素“無臭性”
“富郁” **美康利** 糖衣錠
Vitamin B Complex S. C. Tablets "F.Y."

衛部藥製字第 058060 號
GMP G-12074

本劑以無臭性持續型維生素B1為主劑，配以對肌肉及神經之機能之維持，以及圓滑作用有重要關係之維生素B6、B12加上維生素B2。

- 【作用優點】
- 1.吸收性佳：服用後迅速被消化管吸收，保持高血中濃度，且持續長時間。
 - 2.脂易溶性：本劑具有脂易溶特性，對組織之親和性佳，高濃度移行於神經組織、血球、骨髓液以及臟器中，且長時間貯留於體內。
 - 3.迅速脂化：服用後在體內迅速被酯化，生成多量之結合型B1(co-carboxylase)提高效力。
 - 4.不被維生素B1分解酵素(aneurinase)分解，比例服用劑量迅速被吸收。
 - 5.主要效果：恢復肌肉之疲勞，防止體力之消耗。圓滑神經機能能發揮優良鎮痛作用，旺盛心肌代謝，促進腸管之蠕動，改善便秘等症狀。

【成分】每粒糖衣錠中含有：

Thiamine disulfide (T. D. S.).....	50 mg
Riboflavin.....	5 mg
Pyridoxine HCl.....	5 mg
Vitamine B12	0.005 mg

【適應症】腳氣、多發性神經炎、維生素B1缺乏症。

【用法用量】本劑之用法用量，服用期間，視症狀之種類、輕重而異，通常成人參照下列適應症各別之服用劑量，分1~3次服用，孩童依年齡遞減。

1.神經性疾患

神經炎、多發性神經炎、維生素B1時之代謝障礙，每日服2~3錠。

神經手術後之神經麻痺，每日服3錠。

2.內科疾患

腳氣及腳氣樣狀(倦怠感、心悸、浮腫)消耗性疾患之補助療法，每日服2~3錠。

3.婦產科疾患

妊娠性多發神經炎，每日服2~3錠。

4.眼科疾患

視神經炎、球後視神經炎，每日服2~3錠。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】服用本劑後尿會呈黃色係由本劑中含有維生素B2所引起，請勿掛慮。

【賦形劑】Pregelatinized starch、Cellulose microcrystalline、Cellactose、Silicon dioxide hydrated、Magnesium stearate、Talc、Sepifilm LP 770、Sepifilm 752 white、Sucrose、Wax、Dibasic calcium phosphate hydrate、Gelatin、Acacia、Tartrazine。

【儲存條件】本藥品應包裝於緊密容器，貯存於陰涼(25℃以下)乾燥避光且兒童不易取得處所。

【包裝】4-1000錠，鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

委託者：富郁生物科技有限公司
台北市士林區德行東路223號2樓
TEL: (02) 28767899

製造廠：元宙化學製藥股份有限公司
YUAN CHOU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD
南投市南崗工業區南崗三路272號
TEL: (049) 2253190