

“華盛頓”氧化鋅軟膏

Zinc Oxide Ointment “WST”

外用

【主成分】：Each gm ointment contains：

Zinc Oxide.....200 mg

【其他成分(賦形劑)】：White Petrolatum、Liquid Paraffin(EQ to liquid Petrolatum)
(EQ to Mineral oil)、Tefose 63(Mono & Di-stearic esters of
Ethyleneg1)、Cetyl Palmitate、DC 200/100。

【用途(適應症)】：緩解皮膚刺激及尿布疹。

【使用上注意事項】

- ◆有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。
- ◆有下列情形者，使用前請洽醫師診治：有深部皮膚組織感染。
- ◆有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- ◆其他使用上注意事項：
 1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
 2. 兒童須於監護者的指導與監督下使用。
 3. 避免陽光直射。
 4. 勿超過建議使用量或使用次數。
 5. 使用部位或周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。
 6. 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
 7. 本品限於外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)。
 8. 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
 9. 本藥勿使用於大面積之體表(以使用者的雙手掌面積為參考)。
 10. 使用後請保持塗抹部分透氣，勿密封，以免增加副作用。
 11. 易燃性外用液劑之外部容器或外部包裝需刊載：勿接近火源。
 12. 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
 13. 患有下狀況者，建議不要使用。
- ◆有傷口或紅腫。
- ◆傷口流膿或潰爛。

【用法用量】：

需要時使用

適量塗抹部位，每日二至三次。

【警語】

- ◆使用本藥後，若發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

關係部位

症狀

皮膚

發疹、發紅、發癢、刺激感、脫皮

- ◆使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
 1. 若有上述外之其他不適情況產生。
 2. 連續使用7天後症狀未改善或更惡化。

【包裝】：1000公克以下鋁軟管裝、塑膠罐裝。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲存條件】：請儲存於 25℃以下乾燥處避光。

PIC/S GMP 華盛頓製藥廠股份有限公司

高雄市仁武區工業二路12號

電話：07-3711471

