

"信東" 樂比克膜衣錠7.5公絲
Zolon Film Coated Tablets 7.5mg (Zopiclone)

【成分】

每膜衣錠中含Zopiclone.....7.5mg

【適應症】

失眠症。

【用法與用量】

本藥須由醫師處方使用。

成人每次服用一粒。老年人開始時每次半粒，若需要可漸增至一粒。

肝功能不良者每次服用半粒；睡前服用。

為達良好之治療品質，請切實遵守醫師之建議。

【注意事項】

- (1)長期高劑量使用，突然停藥會產生戒斷症狀，因此最好逐漸減量。
- (2)未經醫師指示，不可長期使用。
- (3)本品屬新藥，雖然至今尚無致癌及胚胎毒性的報告，為安全起見，請勿給與懷孕婦女。
- (4)Zopiclone滲入母乳的機會很小，但仍不建議給泌乳中婦女使用。
- (5)若過量時會產生深沉或昏迷樣睡眠，必需給予症狀療法。
- (6)由於本藥可能增加肌肉疲勞，肌無力的患者必須特別注意。
- (7)對呼吸功能不全者或嚴重肝功能不全者，必須調整劑量。

(8)請勿與酒同時使用。

(9)對操作機器或開車的人必須特別注意，因為可能會出現晝間嗜眠現象。

(10)服用本藥於夜間勿驟然起床，以免未完全清醒而跌倒。

(11)服用本品可能出現夢遊行為，例如開車、打電話及準備與食用食物。

【藥品交互作用】

- (1)本藥與神經肌肉抑制劑(Curare-like compounds或其他肌肉鬆弛劑)有相乘作用。
- (2)本藥與中樞作用抑制劑（特別是Neuroleptics）併用時會增加鎮靜作用。
- (3)當與Benzodiazepines共用時，一旦停藥會增加戒斷症狀的危險。

【配合禁忌】

- (1)已知對Zopiclone過敏者。
- (2)代償作用失調之呼吸功能不全者。
- (3)15歲以下的幼兒。

【保存】

室溫(25°C以下)保存。
須置於小孩接觸不到之處。

【包裝】

2~1,000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

衛署藥製字第046013號



信東生技股份有限公司

桃園市介壽路22號

TZ009②